

coll. q. 21, 82 8r-

772 mm. Bel.

(48-08)

88. 88 = wup

110

Chicago Botanic Garden
Library

VOCABVLA REI NVMARIAE

PONDERVM ET MENSVRARVM
Græca, Latîna, Ebraica, quorum in-
tellectus omnibus necessarius est:

Collecta ex Budæi, Ioachimi Ca-
merarij & Philip. Me-
lanth. Annotationi-
bus.

ADDITÆ SVNT APPELLATIO-
nes *Quadrupedum, Insectorum, Volucrum, Pi-
scium, Frugum, Leguminum, Olerum & Fru-
ctuum communium, collectæ à Paulo
Ebero, & Casparo Peucero,*

Recognitæ & auctæ.

VVITEBERGAE.

EXCVDEBAT VITVS
CREVTZER.

ANNO M. DLXIII.

SVPPVTATIO GALLI
corum numorum, ad Crucia-
tos Germanicos.

Q Vinç denarioli Turonici, ua-
lent uno cruciato Athesino.

Caroleus numus, ualet duobus cruciatis.

Coronatus aureus ualet quatuor capitibus,
quos testones uulgu appellat, hoc est, octoginta
Cruciatis uel paulo plus, præsertim si sit solus.

Grossus Parisiensis ualet sex Cruciatis.

Tantidem ualet Grossus Argemoratensis,
uulgo ein schilling groß.

Solidus Turonicus, hoc est, duodenarius,
quem uulgu Gallorum Duffenum uocat, ualet
duobus Cruciatibus ad supputationem Basiliensem.
Ad Lundunensem uero duobus denariolis am-
plius.

Caroleus ualet decem denariolis Turonicis.

Solidus Turonicus ualet duodecim denariolis
Turonicis, hoc est, duobus cruciatibus.

Solidus Sterlinorum ualet tredecim denario-
lis Turonicis.

GVILELMI BVDAEI
PARISIENSIS, SECRETARII
REGII BREVIARIVM
DE ASSE.

AS QVI ET ASSIS DICITVR,
induodecim uncias distribuitur. As qua-
ternos denariolos nostros ualuit, & pauxillo
plus. Sic fit, ut duo asses, & semis, sestertium
faciant, id est, Caroleum nostrum & semissem
denarioli.

Duo asses, sextans dicebantur, quod nomisma
paruum fuit, cuius meminit Plinius & Liuius.

Quadrans etiam numulus erat, & ualebat
assis quartam partem, & Triens tertiam. Semis
autem duos quadranteis ualebat.

Apud Græcos drachma in sex obolos diuisa
est, & trienteis, quadrantesq; Sesquiobolus Athe-
nis, erat Romæ sestertius.

Sestertius, & numus idem erant apud Ro-
manos.

Sestertius, æstimatione nostra, decem Turoni-
cis denariolis, & semisse denarioli ualuit.

Denarius, quaternos sestertios numos uale-
bat, hoc est, quaternos Caroleos nostros, & binos
denariolos Turonicos, ex eo dictus denarius,
quod

quod pro decem assibus locaretur æreis, & cederet in solutum.

Sestertius ex eo dictus est, quod duos asses & semissem ualeret. Qua ratione quaterni sestertij denarium Romanum ualebant. Et sestertius dictus, quasi sesquitertius, sunt enim duo solidi asses & semis, hic etiam numus dicebatur & argenteus erat.

Libra Romana, quæ & mina, & pondo dicitur, centenos denarios, seu quod idem est, centenas drachmas habebat. Cum igitur denarius quaternos sestertios æquaret pondere & estimatione, liquet in libra Romana quadringentos fuisse sestertios, & in duabus libris & selibra mille sestertios, qua ratione fit, ut sestertia singula numero plurali millenos sestertios ualeant, hoc est, duas libras & semissem. Vt enim sestertius numus dicitur, ex eo quod duos asses & semissem ualebat, hoc est, duas libras æris grauis & selibram. Ita sestertia numero plurali & genere neutro ideo dicuntur, quod singula duas libras & selibram argenti ualerent, hoc est, ducentos & quinquaginta denarios, siue mille sestertios, quod idem est. Sic fit, ut decem sestertia, & decem millia sestertium numerorum pro eodem ab antiquis dicantur.

Mille sestertij estimatione nostra uiginti

A 3

quing;

quinq; coronatos ualent, dicitur autem mille se-
stertij & mille numi, uel mille sestertium & mille
numum, uel copulate, mille sestertium numum.

Cum autem mille sestertij, id est, ducenti quin-
quaginta denarij, duas libras argenti & semissem
ualeant, sequitur, ut libra Romana, quæ & mina
dicitur & pondo, decem aureos coronatos ualue-
rit. Coronatos autem ita intelligi uolo ut singuli
triginta qinq; solidos ualeant, quod est legiti-
mum precium.

Igitur decem millia numum, uel decem millia
sestertium, quod idem est, ducentos, & quinquaginta aureos coronatos ualebant, Hæc etiam de-
cem sestertia dicuntur, cum singula sestertia, sin-
gula millia significant.

Decies sestertium, idem est, quod decies cen-
tena millia sestertium, quæ summa centies maior
est decem sestertijs. Idem est enim decies sester-
tium, quod mille sestertia. Cum enim singula se-
stertia millenos numos sestertios ualeant, si mille
sestertia millies multiplices, fient decies centena
millia, quæ lingua uernacula millionem uocant.

Decies igitur sestertium, centies ducentos &
quinquaginta aureos ualet, hoc est, uiginti qinq;
millia. Sic fiet, ut millio Romanus uiginti qinq;
millia coronatorum ualeat.

Hoc igitur tenere oportet, quod quemadmodum cum à numis sestertijs, ad sestertia genere neutro sit transitus, numerus millies multiplicatur. Ita cum ad eam loquutionem uentum est, quæ per aduerbia numeralia enunciat, sestertia singula centuplicata crescunt, ut uerbi gratia. Si centum sestertia dicam, centum millia sestertium intelligere debeas. Quod si centies sestertium dicam, non iam centum sestertia, sed centies centena sestertia, seu centies centena millia sestertium intelligendum sit.

Vt autem facilis, & obuia sit unicuique earum summarum intelligentia, quæ apud Autores identidem leguntur, hoc meminisse oportet, quod sequitur: ut quæuis summa etiam in digitos deduci possit, sine calculis aut abaco.

Decem sestertia, ducenti quinquaginta aurei,
Viginti sestertia, quingenti aurei.

Triginta sestertia, septingenti & quinquaginta.

Quadraginta sestertia, mille aurei.

Quinquaginta sestertia, mille ducenti & quinquaginta.

Sexaginta sestertia, mille & quingenti.

Centum sestertia, duo millia & quingenti.

Ducenta sestertia, quinque millia.

Quadraginta sestertia decem millia coronatorum. Census equestris sub Iulio Cesare.

Quingenta sestertia, duodecim millia & quingenti.

Sexcenta sestertia, quindecim millia.

Octoginta sestertia, uiginti millia. Census senatorius ante Augustum.

Mille sestertia, uiginti quinque millia.

Mille ac ducenta sestertia, triginta millia coronatorum. Tantus erat Census senatorius sub Augusto.

Notandum quod supra mille sestertia Romani fere semper per aduerbia loquebantur, infra mille nunquam per aduerbia locuti sunt hoc modo, Decies sestertium, id est, mille sestertia, uiginti quinque millia. Duodecies sestertium, triginta millia aureorum Census senatorius sub Augusto.

Quindicies sestertium, triginta septem millia & quingenti.

Vicies sestertium, quinquaginta millia.

Tricies sestertium, centum septuaginta quinque millia aureorum.

Quadrages sestertium, centum millia aureorum.

Quinquages sestertium, centum uiginti quinque millia aureorum.

Sexages sestertium, centum quinquaginta millia aureorum.

Centies

Centies sestertium, ducenta quinquaginta millia aureorum, Tanti aestimatus est unio Cleopatrae.

Quadringenties sestertium, decies centena millia, id est. Millies mille, id est, millio. Tanti aestimatus est à Plinio ornatus Lolie.

Millies sestertium, uicies quinquies centena millia, id est, duo milliones, & quingenta millia.

Bis millies sestertium, quinquagies centena millia. Census Lentuli auguris sub Augusto.

Quater millies sestertium, decem milliones dicuntur, hoc est, centies centena millia.

Decies millies sestertium, uiginti quinque milliones.

Quadrages millies sestertium, centum milliones.

Vicies septies millies sestertium coëgisse Tiberius dicitur, id est, sexaginta sex milliones, & quinquaginta millia aureorum coronatorum, ut nostro sermone loquar.

Libra Romana in duodecim uncias & semis unciam diuiditur, & uncia in octonas drachmas. Sic fit, ut centene drachmæ libram, & minam seu pondo faciant.

Drachma in terna scrupula diuiditur. Sic fit, ut sint uicena quaterna scrupula in uncia. Parisienses drachmam grossum appellant, & scrupulum

lum appellant denarium, & binæ drachmæ sterlingi quinq; dicuntur, id est, quadrans uncia?

Hec de pondere dicta sufficiant.

GRÆCORM SVPPVTATIO.

Mina apud Græcos idem est quod libra et pondo apud Romanos, hæc centum drachmas continebat, hoc est, circiter centum denarios Romanos, seu quadringentos sester tios.

Mina igitur decem aureos coronatos ualuit, Et drachma tres solidos turonicos & semissem quanti scilicet denarius Romanus æstimatus est à nobis, hoc est, quaterni numi.

Talentum multiplex fuit, ut in libro nostro latissime enarratum est, sed talentum Atticum, quod plurimum celebratur ab historicis, sexaginta libras ualuit, seu minas, hoc est, sex millia denariorum uel drachmarum, quæ sexagies denos coronatos ualent, hoc est, sexcentos.

Talentum sexcenti aurei.

Decem talenta sex millia aureorum.

Quindecim talenta nouem milia aureorum.

Viginti talenta duodecim milia.

Quin

Quinquaginta talenta triginta milia aureorum.

Centum talenta sexaginta milia.

Ducenta talenta centum milia & uiginti.

Quadringenta talenta, ducenta et quadringenta.
milia aureorum.

Mille talenta sexcenta milia.

Duo milia talentum mille & ducenta milia.

Decem milia talentum sexagies centena milia.

Tanti funerasse Alexander Ephestionem
dicitur.

Breuiarij Budaici de Asse finis.

SVPPVTATIO ASSIS ET PARTIVM EIVS AD MONETAM BASILI- ENSEM.

AS uel Asis, res quæuis in parteis
duodecim diuisa. Est autem liquidorum, ut
asis uini. Ponderum ut libra, Monete, ut alibi
solidus, alibi Plapardus, alibi duodenus. Hæredi-
tas etiam Asis dicitur, ut sepe apud Historicos et
iurisperitos. Item zodiacus, et omnino (ut diximus)
res, quam in parteis duodecim partimur. Exem-
plum de Moneta Basiliensi.

I. Vncia

1	Vncia	ein helbling.
2	Sextans	ein rapp, alias ein angster.
3	Quadrans	drey helbling.
4	Triens	ein fierer.
5	Quincunx	ein creutzer, alias ein fünffer.
6	Semis uel Semissis	ein halber plappert, alias ein sechser.
7	Sextunx	sieben helbling.
8	Bes uel besis	ein doppel fierer.
9	Dodrans	ein halber schwitzer batz.
10	Dextans	ein halber Constentzer batz.
11	Deunx	ein liff helbling.
12	As uel assis	ein plappert, alias ein schilling.
	Centum denarij	mina.
	Mille denarij	
	Centum coronati.	
	Mille asses	centum denarij
	Decem mine.	

VOCABVLA MENSV-
RARVM ET REINVMARIÆ, AV-
TORE PHILIPPO ME-
LANTHONE.

NOMI-

NOMINA MEN- SVRARVM.

Sextarius in myropolijs adhuc in
usu est. Conuenit autem cum ea mensura, quæ
Vuitebergæ dicitur ein Nössel: sed continet mi-
nus quarta fere parte eimes Nössels.

Sextarius duas heminas continet seu cotu-
las,

Hemina.

Cotula.

Acetabulum, eadem.

Sextarius duodecim cyathos continet, in
quos eum Romani, tanquam assem in uncias di-
stribuerunt. Sic accipiendum est illud, Neula sex
cyathis, septem iustina bibatur. Nam tot Cyathos
bibebant in conuiuijs, quot literæ erant in ama-
sia nomine. Et Suetonius scribit, Augustum soli-
tum senos sextantes bibere, id est, sextarium. Nam
sextans duos cyathos continet, tanquam duas
uncias.

Congius sex sextarios continet, seu duodecim
heminas.

Congius, fere drey Zwittemberger kannen,

Chus octo heminas, quibusdam etiam congius
est, 4. sextarios, 2. kannen.

Metres

Metreta.

Cadus, idem, X, Congij.

Metretamini^{us} aliquanto quàm 30. kannen.

Modius 16 sextarios continet.

Amphora 3 modios Græce dicitur ἀμφόριον.

Medimnus, sex modios, ein malter.

Choenix, quatuor cotulas seu duos sextarios.

Christus nuptias in Cana non tenui munere
ornauit, cum uinum fecit. Nam sex hydræ, con-
tinebant fere sex eymen. Si singulæ capiebant
binas metretas. Nam duæ metretæ conficiunt fe-
re 60. kannen. Si exactè mensures, quarta pars
ut supra significauimus, detrahenda erit.

VOCABVLA REI NUMARIÆ.

DRachma ponderis nomen est
ein quint. Et mansit ea appellatio hacten-
us in myropolijs, ubi si quis uolet appendere par-
tes libræ, drachmæ pondus inueniet. Cum autem
drachmæ nomen solum ponitur, Attici semper in-
telligunt argenteum numum eo pondere. Quan-
tum ualeat, ipsum pondus indicat, ein quint sil-
ber. Nos non tradimus exactissimam rationem
precij,

precij, nam de hac consulendi sunt Aurifabri. Et
precia auri atq; argenti uariant aliquantum tem-
poribus. Potest autem inde drachmæ precium
æstimari.

Decem drachmæ ualent uno coronato.

Octo drachmæ ualent fere aurco Rhenano.

Due igitur drachmæ ualent fere quarta au-
rei parte.

Denarius, teste Plinio, fere drachmæ Atticæ
pondus habet. Proinde in historia ueteri scias
drachmam & denarium idem significare, & tan-
tundem ualere, Altera Romana appellatio fuit,
altera Græca.

Dicitur autem Denarius, quia ualebat decem
assibus.

Decem denarij ualent uno coronato

Octo denarij ualent fere aurco Rhenano.

Duo denarij ualent fere quarta aurei Rhe-
nani parte.

As quondam æneus fuit, & significat libram
æris. Quantum ualeat æstimari potest, cum de-
narium in decem asses partimur. Valebit enim
as fere tribus numulis Mysorum, cum denarius
ualeat circiter triginta numulis Mysorum, Nam
ut nunc sunt precia auri, aliquanto plus ualeat
aureus Rhenanus, quam octo denarij.

As

As in duodecim uncias distribuitur.

Sextans unciae duae, id est, sexta pars assis.

Quadrans unciae tres, id est, quarta pars assis.

Fuit usitatissimus nummus aeneus Romae, qui a tribus uncijs etiam dicebatur Teruncius. Marcialis sportulam, hoc est, pecuniam, quam diuites clientibus suis, qui eos sectabantur, quotidie dabant. dicit fuisse centum quadrantes.

Quadrans, circiter ander halben heller Myssorum.

Triens quatuor unciae.

Quicunx, quinque unciae.

Semissex sex unciae, circiter drey heller.

Septunx, septem unciae.

Bes, octo unciae.

Dodrans, nouem unciae.

Dextans, decem unciae,

Deunx, undecim unciae,

As, duodecim unciae

Ceterum nomen assis ad alia transfertur, et significat in omnibus rebus mensurandis uel numerandis, totum.

Usurae centesimae dicuntur, quae centesimo mense aequant sortem. Quondam enim singulis mensibus soluebantur usurae. Et uocant Iurisconsulti

fulti *assem* usurarum *Centessimam*, hanc deinde
partiumur. C. de usuris, Fit *Centessimæ* mentio
etiam alibi in Canonibus, & lib. 2. Esdræ cap. 5.

As & pondo æris, æneam libram significant.
Inde dupondus, id est, duo asses.

Dupondius circiter sex pſennig Mysorum.

Sestertius quasi sesquitercius, significat enim
duos asses, & semissem, quare & his notis pin-
gitur II S, Duæ lineæ priores significant duo,
& S significat semissem.

Erat autem sestertius genere masculino nu-
mus argenteus, qui ualebat quarta denarij Ro-
mani parte, quatuor enim sestertij decem asses
efficiunt, ualet enim denarius decem assibus, ua-
lebatq; ita sestertius circiter 7. pſennig Mysorum,
aut fere grosso Marchico.

Mille sestertij ualent 25. coronatis.

Cum nomen numus solum ponitur, significat
sestertium numum.

Mille sestertij.

Mille sestertium numum.

Mille numum.

Mille sestertium.

} eadem
25. cor-
rona-
ti.

Ex illo genitiuo plurali facimus nomen gene-
ris neutri sestertium, propter breuitatem abie-

B

Et

Ad uoce mille. Proinde sestertium genere neutro significat 25 coronatos.

Idem igitur significant mille sestertium, & sestertium genere neutro. Decem millia sestertia, & decem sestertia. Sic & de similibus iudicabis, Idq; obseruare in autoribus ualde prodest.

Decem sestertia, 250. coronati.

Est & alia figura, decies sestertium. Scias igitur quoties hoc modo addimus aduerbium numerale uoci sestertium, oportere subintelligi centum

Decies sestertium, id est, decies centum sestertia, 25. millia coronatorum.

Decies sestertium.

Decies mille sestertium, eadem.

Nam mille alias repetitur, alias omittitur sine discrimine, ut supra admonui.

Hæc æstimatio rei numariæ testes habet certissimos Plinium & Plutarchum, ut de ea lector nihil dubitare debeat.

Minæ Græca μνᾶ, Latine libram significat, quæ continet decem drachmas. Valet igitur coronatis decem. Nam de argento usurpatur

Obolus, numis Mysorum fere quinq;. Nam drachma continebat sex obolos.

Octo Chalci ualent obolo Attico. Ita q; Chala

us apud Mysos plus aliquanto est, quàm ein hel-
ler, $\lambda\epsilon\pi\tau\acute{o}$ septem efficiunt unum Chalcum.

Talentum, sexcenti Coronati, continet eni-
minas seu libras sexaginta.

Stater pondus est quatuor drachmarum. Et
cum de argento usurpatur, significat unum tes-
tradrachmum. Nam hoc genus numorum in ma-
ximo usu fuit. Et adhuc extant multi. Valet qua-
tuor drachmis, hoc est, fere dimidio Rhenani
aurei.

Erant et Stateres aurei, qui mina ualebant
hoc est, decem ducatis, quales hodie sunt Portu-
galenses quidam aurci.

Siclus, autore Iosepho, pondus est quatuor
drachmarum Atticarum, id est, ein lot

STVDIOSIS BONA
RVM LITERARVM. IO-
ACHIMVS. S. D.

SI, QVAE PVLCHR A
Sunt, ueteri uerbo saepe iterari iubentur,
quo magis de ijs fieri hoc conuenit, quæ et sunt
pulcræ et utilitatem simul præcipuam comple-
ctuntur. Quare cum autore Philippo Melanthon

ne subductio numariae rationis, itemq; mensura-
rarum ad nostrorum temporum, nostriq; moris
consuetudinem accommodatio, descriptæ in pa-
tenta charta prodissent, uisum est eandem in com-
plicata etiam emittere. Cæterum si quis forte
hoc requirit, numus Mysius plane is est, quod
quidem ad usum attinet, qui & in Francis in usum
est. Neq; magnum inter mensuras est discrimen.
Nam Sextarius mensuram attingit Seidellæ,
quam Norimbergæ uocant, cuius dimidium κο-
τύλη, seu hemina est. Tunc inquam, cum ad pris-
cum Romanorum usum hæc exiguntur, ducente
Cyatho drachmas 10. & Sextario uncias 15. Fuit
autem alicubi quondam μυῖα unciarum 18. hoc
est, λίτρα μία ἡμισύ, quam quidem Italicam
dixere & ad eam Sextarium expenderunt, cuius
dimidium est hemina seu κοτύλη, ut diximus.
Itaq; inuenio huius etymon ridicule quidam ex-
tortum: sed rem tamen explicans κοτύλη κεκλη-
ται ὅτι τὸ εἶναι εἰς δύο κοπτεσθῆναι. Atq; ita
in Myropolij Sextario utuntur, hoc est, cotylis
duabus. Nam priscum sextarij nomen & usum
amiserunt, secundum quam rationem appendet
Cyathus unciam unam & dimidiam. Etsi nostris
mensuris metiri uelis, inuenies duodecimum Cya-
thum Seidellam exuperare, qui antea sane com-
plebat. In uniuersum autem tenendum, non esse
omnium

omnium liquorum unum pondus. Omnino sunt
hæ res inter se confusæ, quod necesse fuit fieri, ut
preclare nobiscum actum uideatur, qui ad hanc
quantulamcunq; certitudinem peruenimus,
qua maior teneri uix queat.

Nunc de Chœnice aliquid, neq; ingratum, ut
spero neq; inutile uobis futurum annotabo. Chœ-
nix, de quo quidem satis constat, sextarios con-
tinet duos. Quod cum sit compertum, non dubi-
um mihi sit, quin legi debeat in illis Rhemnij uer-
sibus. Quis quater assumptis sit Graio nomine
Chœnix, ut de heminis intelligatur. Atq; hoc lo-
co sciendum Chœnica fuisse diurnum cibum ser-
uorum Græcorum, quemadmodum fuit demen-
sum Romanorum cibus menstruus, quod quidem
continuerit Modios quaternos. Qui si fuerint
ad Chœnicas comminuti, computatis in singulos
Modios Chœnicibus octo, conficientur dies 3 2.
hoc est, mensis unus. Nam quod duo dies abun-
dare uideri queant, de eo non est, quod labore-
tur. Neq; enim possunt, neq; debent omnes minu-
tie coequari talibus in supputationibus.

Cum autem nullas habeat charta Vuitteber-
gensis mensuras γερμανικας, quod alijs men-
suris, & re numaria expleta fuerit, uisum est in
uestram gratiam, etiam illarum aliquot precipu-
as subijcere.

Pes digitos habet 16. Palmus digitos habet
quatuor. Hic Græcis dicitur Θ ὁ παλαισῆς Θ
 η παλαισῆς Θ δ' ὠγορ Θ δοχμή. Palmus itaq;
pars quarta pedis est,

Σπιθαμή, dodrans. Nam Θ in pollices
diuiditur per duodecim, ut As in uncias, Palmi
tres nostra lingua Spannam uocamus:

VLNA quatuor cubiti, nos Claphteram no-
minamus, Græci ὀγγυάρι, Nam quod de Pyrami-
de dixit Herodotus τετραρακοτὸ ὄγυος, Plinius
uertit quadragenarum ulnarum.

Cubitus sesquipedalis. palmi sex.

πλέθορ, sexta pars stadij, hoc est, pedes
centum.

Stadium pedes sexcenti. Hoc loco uarietas
obseruanda. Plinius habere Stadium scribit pas-
sus 125. Pedes sexcentos 23. Gellius Græca sta-
dia facit pedum 1100, Item mille passus, conti-
nent octo stadia, Græci autem lexicis sic tradidere
ἑπτὰ κοῦ ἡμισὺ σάβια ποιεῖσι μίλιον ἐν τῷ
δε δέκα μίλια ἔχουσι σάβια π. Sunt qui δ' μί-
λιον metiantur stadijs 7. hoc est, pedibus quater
mille ducentis. Itaq; ait Hesychius: μίλιον με-
τροῦ ὁ δ' ἑξάβια ἑπτὰ, ὁ δ' ἐπὶ ἄ ἡ ἡμισέ Θ
ποδῶν δέ, sed in exemplaribus locus corruptus
est. Fuere harum rerum apud Græcos Θ alia
uocabula πύγων pollice breuior quàm πύχυνε,
Item

Item ὁ γῆς ὁ πορ recta manus, λιχῆς spacium ma-
nus distense ab indice extremo usq; ad pollicem,
nos Furspannam dicimus, δίαυλῶ stadiorum
duum, δόλιχῶ 12. apud Suidam legitur καὶ
Cursuum spacia σαθμῶς omnium longissimum
Miliaria 28. Semis ἄρσεν, inquit Suidas ποδῶν
ῥ. Sed Herodotus apud Ægyptios ἄρσεν cen-
tum cubitorum. Cubitum autem Ægyptium cun-
dem cum Samio fuisse scripsit

At ACTVM 120 pedum Plinius & dupli-
catum in longitudinem fecisse iugerum.

παρασαγγης Persica mensura ualuit sta-
dia 30.

Σχοῖνος Ægyptiaca, 60.

Inter hæc uobis inquirendum relinquo quod
Gellius dixit, Septem cubita facere pedes 12. &
quadrantem.

Hanc autem nostram properatam, atq; im-
maturam sane operam: sed datam tamen com-
moditatibus uestris, & gratis amplectemini ani-
mis, & bonarum literarum studia coletis digna
sedulitate & cura.

Exodi 30. scribitur, singulos Israëlitos taber-
naculo pensionem annuam dedisse dimidium Si-
cli, id est, didrachmum. Nam certum est Siclum
continere quatuor drachmas, ein lot, ut Germa-

nice nominamus. Ergo dimidium Sicli erat didrachmam. Hanc pensionem quam Lex templo stratibuit, Romani ademptam templo, suis Magistratibus solui iusserunt. Cum autem ea collatio tuotannis ingentem acervum cumularet (Virittim enim pendebantur didrachma, ut si capita erant quinques centum millia, iam summa erat centum millia coronatorum. Et tamen longe maiorem numerum fuisse puberum Israëlitarum nihil dubium est) dolebant Iudæi, tantam pecuniam templo eripi. Et plausibilis disputatio erat. Etiam si toleranda essent damna priuatarum saculatatam in seruitute: tamen templi iura defendenda esse, & Deum defensoribus adfuturum esse. Ideo Christo proponitur questio: an pium sit, hæc didrachma adempta templo, Romanis pendere? Christus respondens. significat eos debere seruitutem tolerare in damnis pecuniarijs, ut cum nunc Christiani opprimuntur seruitute à Turcis. Et soluit ipse Christus Mat. 17. Vbi adparet, exaetores peculiariter intentos fuisse in Christi exemplum. Intelligas igitur & coloco didrachmam argenteum, ein ort aurei Rhenani. Stater uero argenteus erat tetradrachmus.

Hoc exemplum me norabile propter multas causas adscripsi. Primum ut studiosi considerent, Deum uelle com muni collatione iuuari Ecclesias,

ut

ut Euangelij ministerium conseruetur. Econtra
uero sepe accidere, ut Ecclesiæ opprimantur ser-
uitute, & eripiantur stipendia doctoribus & dis-
scientibus, propter peccata eorum, qui doctri-
nam negligunt.

Facta est supra mentio aureorum quoq; Sta-
terum, qui unciales erant, & à Regum nomini-
bus appellabantur $\kappa\omicron\iota\sigma\tau\epsilon\omicron\iota$ $\delta\acute{\omicron}\rho\epsilon\kappa\omicron\iota$, $\phi\iota\lambda\iota\pi\pi\epsilon\omicron\iota$ $\alpha\lambda\epsilon\gamma\acute{\omicron}\nu\delta\epsilon\omicron\iota$. Valebant autem mina, seu
centum drachmis, hoc est, coronatis decem.

Sed alij præter hos grandes aureos, fuerunt
in uulgari usu, qui pondus habebant duarum
drachmarum auri, ualde usitati similes ueteri-
bus Romanis aureis, & ualebant duobus aureis
Hungaricis. Vidimus tales ueteres aureos Græ-
cos & Romanos aliquot, quorum pondus certò
& sine ambiguitate iudicare potest. Prudenter
autem considerandum est, ubi fiat mentio Argen-
tei Stateris, ubi de grandi aureo simili Portuga-
lensibus, ubi de uulgari aureo dicatur, ut apud
Thucydidem, Lysiam, & Demosthenem Stater
est aureus didrachmalis, id est, ualens duobus au-
reis Hungaricis. Et talem Staterem existimo Pe-
trum in ore piscis inuenisse, ut recitatur Matth.
cap. 17. Plus igitur inuenit, quàm quantum pro
duobus soluendum erat Romanis, quia singuli
pendebant tantum duas drachmas argenti, id est,

fere quadrantem nostri aurei. Sed uoluit aliquid
superesse Christus eius beneficij autor.

Matth. 18. conferuntur duo serui quorum
prior debet decem millia talentorum, id est, sexa-
gies centum millia coronatorum, seu ut usitate
loquimur sexaginta tonnas auri, quantam nunc
summam dicunt esse annui redditus Regni Turci-
ci. Nominat autem Christus tantam summam, ut
commonefaciat nos simul de magnitudine pecca-
torum nostrorum, & de bonitate Dei, qui tam
grande debitum nobis clementer remittit. Deim-
de nostram duriciem taxat, qui paruas offensio-
nes remittere nolumus, quia alter seruus debebat
huic nequam homini centum denarios, id est, tan-
tum decem coronatos. Hæc debita conferre cru-
dite possunt cum summarum magnitudo intelli-
gitur,

Chœnix demensum diurnum cuius cognitio
utilis est, non modo propter lucem historiarum,
sed etiam propter exempla diligentie in œcono-
mia, frugalitatis & temperantie, Norant uete-
res modum suorum sumptuum, quantum singulis
quotidie dandum esset, ut quid sustinere possent,
animaduertent. Prodest igitur planius ostendi
quantum frumenti sit Chœnix,

Modius continebat octo Chœnicas. Ait autem
Cicero in octaua oratione in Verrem, Modium
trivici

tritici in Sicilia lege aestimatum fuisse ternis sestertijs aut quaternis, si erat Imperatum frumentum. Iam si quatuor sestertij erant precium unus modij, Chœnix erit frumentum pro quatuor mysnicis numulis. Panis ergo diurnus seruuli erat quatuor nostrorum numulorum, & addebatur uni unus Sextarius, pene eim Nossel.

Quod igitur in sexto capite Apocalypsis in comminatione calamitatis publicæ, famis, uidelicet, dicitur. Chœnix tritici aestimabitur denario, significata est magna difficultas annonæ, uidelicet, panem diurnum, qui alioqui emebatur quatuor numulis Mysnicis, emendum esse triginta numulis. Tantum difficultatem Dei beneficio, Germania longo tempore non uidit.

DE MENSVRIS EBRAE-
CIS, RECENTIVM EBREOR-
VM INTERPRÆ-
TATIO.

LOG seu Sextarius, Est uicesima
quarta pars Sati.
Satum tertia pars Eph.
Decem mensuræ Eph, faciunt unum Corum.
Log

Log ergo est minima mensura continens sex
oua, quæ si multiplices per 24 habebis mensuram
Sati. nempe centum quadraginta quatuor oua,
eijer schalen voll.

Mensura Ephī habet tria sata.

Satum continet sex Cabos.

In Cabo sunt quatuor Login.

Log habet sex oua.

Hec si iuste multiplices à Log incipiendo, quæ
in aridis et liquidis minima est mensura, sex con-
tinens gallinacea oua, inuenies Cabum continere
oua 24. Satum uero 144. oua, & Ephī, quæ &
Epha uocatur, continere 432. oua.

Scribunt præterea, quod decem Ephī faciant
unum Homer, quæ mensura Corus dicitur Luca
16. Et hæc continet 4320. oua, estq; maxima
apud Ebreos mensura.

Batus liquidorum mensura, decima pars Ho-
mer, continet oua 432. ut Ephī in aridis. Sexta-
rios uero 72. ut testatur Iosephus libro octauo
capite secundo.

Idem Iosephus lib. 15. cap. 11. dicit, Corum
continere medimnos Atticos decem. Quod magis
conuenit, quàm quod idem autor dicit lib. 3. circa
finem, Corum habere medimnos Atticos 41. quem
locum mendosum esse arbitror.

Medimnus

Medimus Atticus autem continet septuaginta duos sextarios, Ergo æquatur fere Mensura Ephii.

MENSVRÆ LIQVIDO-
RVM I V X T A E B R E O S , I V X T A
G E O R G I V M A G R I C V L A M
E T G L A R E A N V M .

L O G Sextarius fere ein Nöffel,
Him duodecim Log. id est, Sextarij duo-
decim, seu duo Congij Attici, seu duo Choes At-
tici.

Batus Sextarij Attici septuaginta duo, æqua-
lis mensura est Amphoræ Atticæ. Ein halber
Lipsicher Eymmer.

MENSVRÆ ARIDO-
R V M .

Cabus quatuor Logi. id est, Sextarij quatuor.
Fit mentio cabi in quartolibro Regum capite
sexto, ubi inquit, Quarta pars cabi stercoris co-
lumarum, id est, Sextarius, stercoris columba-
rum uendebatur quinque argenteis.

Gomer minus de quo dicitur Exodi 16, ubi
singula

271
singuli colligunt Gomor Mannam, Sextarij sunt septem, & pars quinta Sextarij. Expresse enim ibi dicitur, Gomor est decima pars Ephæ. Fuit igitur liberale demensum quotidianum in collecti-
one manne. Nam Gomor tres Choenicas continet.

Iosephus mensuram parvam, Gomor nominat Assarion. Ait in fame emptum esse tritici Assario-
on, id est, Gomor quatuor drachmis.


Satum, Sextarij quatuor & uiginti, uidelicet eabi sex.

Epha, Medimnus Atticus seu tria sata, circi-
ter ein Lipsicher scheffel.

Corus sine ulla dubitatione Medimnos Atti-
cos decem continet, Medimnus uero Atticus con-
tinet septuaginta duos Sextarios, & fere con-
gruit cum Ephæ.

Est igitur Corus, circiter zehn Lipsicher
scheffel, pro appellatione Cori in Ezechiele us-
surpatur nomen Homer, & literis differt à Go-
mor.

Lelech. dimidium Cori, id est, Me-
dimni Attici quinq.





CASPARVS PEVCE
RVS MICHAELI MEYENBURG
ornatissimi & prudentissimi uiri Mi-
chaelis Meyenburg Senioris, Consu-
lis Northusani Pia memoriae
filio amico suo ca-
rissimo.
S. D.

EDIDIMVS ANTE AN-
nos aliquot rerum appellationes Paulus
Eberus & ego, quas ueterum Graecorum & La-
tinorum historijs diligenter peruestigatis ac con-
sideratis, & rebus ipsis quam fieri potuit ac-
curatissime conquisitis inspectisq; aut explora-
tis annotaram in meos usus, pertaesum tum pe-
regrinarum & barbararum uocum, quae ex re-
centiorum scriptis in Scholas inuectae omnium
aures personabant, tum penuriae uocum, quae
Scholae laborabant. Idq; fecimus eo potissimum
consilio, ut doctos excitaremus ad hanc quoq;
partem doctrinae eruditioris ac politioris, quae
maxima & difficillima est restituendam & illu-
strandam, & reuocaremus paulatim in Scholas
ueterum et eruditorum uocabulorum usum, sum

C mota

77
mota explosaq; barbarie, qua oppressa illa penē
obsoluerant. Cum itaq; multi hactenus uiri
præstantes & res ipsas & rerum genuinas ap-
pellationes alij alias sceleriter explicarint ma-
gnis uoluminibus, hunc nostrum breuem & mu-
tilum ἑλεγχον, quod parum scholis profuturum
existimarem, abolere decreueramus. Sed cum
amicorum nostrorum multi ne interire eum
pateremur hortarentur, & retinere in Scholis
harum terrarum quod notis res nominibus indi-
carent, utiliter posse censerent, refragari uolun-
tatis ipsorum nolimus. Utantur ergo his uo-
cabulis qui uolent non aliena certe à rebus ipsis
coniectura accommodatis. Eruditos uero roga-
mus ut eo candore & ea beneuolentia de his con-
iecturis nostris iudicent, quam humilitas, litera-
tis digna ab ipsis & rerum difficultas atq; ob-
scuritas, quibus suas, id est, nativas & ueteres
reddere appellationes studuimus requirit. Ad
te uero hunc denuo editum & locupletatum vo-
cabulorum ἑλεγχον mitto Carissime Michael, ut
sit testimonium meæ erga te beneuolentiæ per-
petuum. Magna extant patris tui integerrimi
& præstantissimi uiri merita in familiam no-
stram. Ea nos perpetuo memore gratitudine
celebrare decet. Nec occasiones ullas unquam
declarande gratitudinis negligemus. Atq; ut

inter

ter nos sit amicitia talis qualis patri tuo fuit
cum Socero meo opto precorq;. Bene et foeli-

citer uale. Vuitebergæ die 17. Martij. Anno
MDLVI. Quo die ante annos 1374. An-
tonius Philosophus Imperator, uir doctrina, sapi-
entia, iusticia, integritate, & militari uirtute ac
laude excellens, qui concussas & labefactatas
Imperij Romani uires restituit aliquantulum &
erexit rursus, diem suum obiit annos natus 59.

Eius præclarissimum extat apud Dionem elo-
gium. ὁμοιοῦ διὰ πάντων ἐγχετο, καὶ οὐδὲν

δένι ἡλλοιῶν. οὕτως ὡς ἁλκιδῶς

ἄγαθὸς ἀνὴρ ἢ καὶ οὐδὲν προ-

σποιοῦν εἶχε.



CA

APPEL

APPELLATIONES

QUADRVPELVMETRE
PTILIVM QVORVN
DAM.

ALce, *Elend* / Alberto Equicera
uus, Colorem habet ex coesio nigricantem
pilos oblongos & duros. Mares cornuti sunt: fœ-
mine his carent. Ex cornibus globuli, cochlearia
& alia id generis candore nitido insignia, torno
parantur. Ungulæ pedum miranda vi paroxys-
mis medentur epilepticis.

Asinus, esell. ὄνος ὁ ἄν.

Asini sylvestres ὄνοι ἄγριοι uel ὄναγροι.

Swildefell.

Aper. ὁ κᾶπρος Swildschwein. Animal se-
uum, quod petatum aut ictum iaculis, si non le-
thaliter uulneretur, irruit in Venatorem, arre-
ptumq; prosternit, & dentibus quos exertos
habet dissecat, nisi aut prolapsus in faciem Ve-
nator pronus terræ incumbat, aut arbore conscen-
sa euadat. Prostratum enim & humi iacentem
ab imo ferire nequit.

Bisontes, Sissoweg. Iubarum prolixitate equis
similes, cetera bobus. Magnæ pernicitatis &
truculentie sunt. Colore asinimo, Swildefell &
Swildesferde.

Bos

Bos, Βόξ καὶ ἡ ἀρρεῖα, Ochs

Βόξ θιάρα Vacca, Ku.

Buccula δαμαλῆς iunge halbe. iuuenca.

Vitulus. μόσχος Kelbelein.

Vitula πορτίς Kalbe.

Taurus. ταῦρος. Bos non castratus. ein stier,
ein farr.

Tauri sylvestres. Ταῦροι ἄγριοι, Bubali. Puffel
ochsen. Grandi sunt corpore, cruribus breuibus,
nigra pelle, cornibus longis et nigris, capite pro-
portione paruo. Cauda breui, pilo minuto & ni-
gro. Sunt et alij uelocitate insignes, colore fuluo,
pilo in contrarium uerso, rictu patulo. Tergori
duricies silicis omne uulnus respuens. Aurochsen.
aliqui Vros hoc uocant.

Bonafus ὁ βόνασος ἢ μόναπος. Magnitudine
bouis est, sed corpore latiore, colore flauo, iubata
cervice, cuius color ex cinereo & ruffo mixtus.
Ein wifontart oder wildpuffel.

Camelus, κάμηλος. Kammelthier. Animal
grande, longo & gracili collo, capite exili, altis
cruribus, amplo pectore & uiloso, tuberibus in
dorso binis ut ephippia eminentibus, colore fusco
uergente ad flauedinem, pelle dura inimicum &
insensum equis, alienissimum ab incestu coitu.
Pullus matrem non attingit, ne quidem si com-
pellatur

pellatur. Refert Aristoteles Camelum pultum,
cum admissarius, (quem ὀχῆορ Greci uocant)
desideraretur, ad matrem uelatam & instratam
operimentis à curatore adductum primo cam
conscendisse, moxq; cum stragulis delapsis cam
agnouisset ceu furore percitum in καμυδίτῳ
irruisse & mordicus correptum interemisse. In
hoc genere qui dromedarij uocantur cursu ual-
lent.

Cercopithecus. κερκοπίθηκος. Meerkaatz.
Disimilis est cæteris simijs uoce, pilo asinino, ni-
gro capite, proluxa cauda.

Crocodilus, κροκόδειλος uel ἀπὸ τοῦ δειλῶ
κροκόειος. Refugit enim terrenus Crocodilus
Crocimidorem: uel ἀπὸ τοῦ δειλῶντος δυνεγο-
κόειος, Reformidat enim Aquaticus littora, ti-
midissimus natura. Est autem alius ποτάμιος, id
est, fluuiialis, Alius χερσαῖος, id est, terrestris.
Hic ἀμφίβιος est, terra pariter ac flumine in-
festus. Solus animalium lingue usu caret. Supe-
rior ei maxilla mobilis inferior immobilis. Fugit
insequentem, fugientem prosequitur. Crocodill.
Nilo & Ægypto proprius.

Chamæleon χαμαιλέων. Colorem subinde
mutat. atq; cum adsciscit & induit, quem proximo
me attingit cauda & corpore, præter rubrum
& candidum. Figura lacertæ est, cauda longa.

Caper

Capre τράγος, Bock

Hircus τράγος, rnuerschnittener bock.

Capra, αἶξ, χίμαρα, quæ peperit. Ein zige
geyß.

Capella, χίμαρα, quæ nondum peperit.

Hoedi, ἑρίφοι, zigelein, geyslein.

Capræa, δορκάδες Reech.

Capreoli, Reebocklein. Cerui speciem hi præ
se ferunt corporis cornuumq; figura, sed minores
multo sunt. Valent acumine uisus. Vocem edunt
sonoram & debilem, quas dum inflatis arborum
folijs imitantur Venatores, latitantes euocant
atq; alliciunt, ac procurreres uel iaculis con
figunt uel uiuos capiunt, Cornua eodem tem
pore abijciunt quo Cerui, sed frè in loca auiæ
condunt, Quapropter non frequenter reperiun
tur.

Damæ, πέρκες. Gemsen mit hornern sur sich
gebogen. Magnitudine, figura & pilis à Ca
preolis non multum differunt. Cornibus uariant,
quæ his non sunt ramosa, sed longa, plana, et acu
ta, & antrorsum incuruata.

Rupicapræ à Damis differunt Cornibus re
tro inflexis, & in gyros ἐλικοειδῆς contortis.
Σεπτικέσωτες. Gemsen mit hornern hinter sich
gebogen.

Capricornus, Ibex ἀρυοκίς, Steinbock. In

alpihus frequens est, maior hirco, colore fuluo,
cornibus grandibus, quibus cum ex altis desilit
rupibus, sese excipit & fulcit, ne terre allidatur
aut saxi, mirande uelocitatis. Vbi effugia &
euadendi occasiones omnes interclusas, esse sen-
tit, uertens sese concitatisimo impetu fertur in
Venatorem, ut eo præcipitato euadat.

Cervus ο'λαφ Θ'. ein Hirsch.

Cervus, η' ο'λαφ Θ'. ein Hinde. Hæc cornibus
caret, quibus armatur Cervus. Estq; cornuum
maximus usus in medicinis, ut & ossis Carthila-
ginci, quod in sinistra basi cordis ad orificia ara-
terie magnæ & arteriæ uenalis duorum semi-
circularum penè figura, se mutuo extremo ama-
bitu contingentium consistit, & pellis & penis.
Cornua omnibus annis statò tempore Cerui de-
mittunt, & tunc maxime inuia petunt. Viuaces
sunt, & ætatis indicium certissimum est ra-
ritas & scabricies dentium aut frequentia, non
ramorum in cornibus numerus. Vidimus ipsi cor-
nua plurima in plures quam uicenos, quedam in
tricenos binos, nonnulla etiam in quadragenos
brachiata ramos. Tempore coitus, quod in Ara-
cturi ortum incidit, ferè toto mense aut abstinere
ab omni cibo, aut parcissime eo utuntur. Neq; fe-
rè in captorum tunc uentriculis aliud quidquam
præter har enulas reperitur. Capiuntur mirifice
cantio

cantu uel humane uocis uel fistularum. Est &
aliud Ceruorum genus cornibus ima parte tan-
tum & in rariore ramos sparsis, superiore ob-
longis simplicibus & acuminatis. Spishirsch.

Canis, κύων, ein Hund.

Catellus, κυνίδιον, ein hundelein.

Catuli, κυλάκια, iunge hundelein.

Canes Vestigatores, quorum in uenatu so-
lertia & sagacitas plurima. Odore enim serua-
tantur & explorant, & uel produnt indicio,
uel de latebris peruestigatas exturbant feras.
κύνες ἰχθυόωντες, spurhunde.

Canes Venatici, qui latebris eiectas & fuga-
tas persequuntur feras, & uel mordicus compre-
hensas retinent aut necant, uel in expansa com-
pellunt retia κύνες θηρευτικοί iaghunde.

Canes domestici, κύνες ἐπίφυλακῇ uel ὄϊ-
κῆροι, qui custodie & excubiarum causa alun-
tur. Haushunde,

Molossi, μολόσσοι uel μολοῖτοι, κύνες ποι-
μνικοί. Schaffruden, qui gregibus presidij &
defensionis causa adiunguntur.

Catelli, μελιτῶν κυνίδια uel μελιτῆροι
κύνες, lusthundlein, qui in delitijs habentur, &
exercentur atq; assuescunt ad ludos saltusq;. Com-
mune omni canum generi Cecos gignere, qui eo

tardius uisum accipiunt, quo plures uno partu
eduntur. Ante septimum tamen diem nunquam
cernunt. Aiunt si unus gignatur, nono ei die a par-
tu oculos dehiscere atq; aperiri: si duo, decimo:
atq; in totidem dies prorogari cecitatem supra
nonum, quotus est Catulorum simul editorum nu-
merus. Inter hos uero prestare illum, qui postre-
mus uisum adipiscitur, & quem canicula mater
præ ceteris fouens primum ad cubile deportat,
Fidelissima animalium quæ nobiscum degunt, sunt
homini canes. & equi.

Erinaceus ἐχινός ὁ χερσίοζ, ein Igell. No-
tum animal pelle uestitum aculeata undiq; præter
quam ima parte, cui lanugo mollis rara & inno-
xia. Alimenta conquirat & in hyemem futuram
preparat ac comportat magna solertia. Contra-
ctis enim ore pedibus ac tota parte inferiore sese
in rotunde pile formam orbiculatim conuoluit
ac complicat, & sese uolutans supra poma humi
sparsa exertos in ea aculeos adigit donec adha-
rescant. Tandem onustus præda se rursus explicat
unoq; ore arrepto ad cubile properat. Duo Eri-
naceorum genera sunt, Porcini & Canini. Saw-
igell & Hundsigell.

Equus, ὁ ἵππος, ein roß, Pferd, hengst,
Equis, ἡ ἵππος ἢ ἵππος θήλη, ein feldyn,
stut, gurr.

Pullus

Pullus equi πῶλος, Fulchen, Equorum alij
bellatores, alij itinerarij, alij Vectarij. Ex itinera-
rarijs sunt qui austurcones & gradarij uocantur
quos in Hispania Thieldones gignunt. Zelter. Gea-
neter. Et ueredi Postrofs.

Cantherini, equi Castrati. Zwallachen.

Marones. λευκό-ζαγοι. Plassen. Tales Thra-
cios fuisse equos apud Vergilium legimus.

Thracius Albis.

Portat equus bicolor maculis, uestigia primi.

Alba pedis, frontemq; ostentans arduus albam.

Ex itinerarijs sunt & κέλατες. Rensferde.
Fuerunt enim in usu ueteribus duo genera eque-
strium certaminum σινογίς & κέλας. In Syno-
ride agitabantur bigæ. κέλας erat agitatio μὲν
νίππος.

Elephas. Elephant. Animal grande uix ante
(ut opinor) in Germania usum, quam à maximia-
liano Rege Bohemie Ferdinandi filio ex Hispani-
nijs Viennam adductum est. ab ore πρὸς κίθα-
demittit longitudine decem cubitorum. Carthia-
lagineam, mobilem, in cuius extremo duo sunt pa-
tula foramina narium instar, & supra ea acuta
lingula, qua arripit res minutiores. Maiores enim
tota proboscide exerta reflexaq; apprehendit &
attrahit. Cutis ei cinericei coloris, scabra

Et aspera, de pilis, qualis est equorum attrito-
rum funibus. Dicitur extimescere mures, ipsq;
terreri ac fugari, Et cohorrescere ad grunitum
porcorum.

Fiber, κασος, Biber. Animal ἀμφίποδον, pedi-
bus prioribus caninis, Posterioribus anserinis,
quibus cum natat in aquis remigat, pelle cinerea
declinante ad nigredinem, cauda oblonga lata et
chartilaginea, qua fluitans uice gubernaculi uti-
tur, horrendi morsus, adeo ut Et arbores iuxta
flumina dentibus ceu ferro cedat, Et hominis
parte comprehensa non antequam fracta con-
crepuerint ossa morsus resoluat. Testes eius Me-
dici κασώποδες uocant Bibergeel.

Felis. γαλιότις. Katz Catus. ὁ ἀλγος
Katter. Notum Et domesticum animal, Specie
Leoni non absimile præsertim faciei dentium Et
unguium. Est Et ferarum ac syluestrium felium
genus, domestico maius, pilo fuluescente, sed ua-
riato nigricie undulatum intermixta. Wildeka-
tzen.

Glis ὁ ἄλγος Fech, Schönberg. Animal est de
genere murium, ut placet Alberto, Et breuibus
pilis ac tenera pelle uestitur. Colore uarium est,
in dorso caesium, inferne album, breui pilo molli
Et tenero, semiferum. Genitorem senecta fessum
in signi pietate alit. Incunte hyeme abdit sese in
cava

caua arborum & tota bruma delitescit ac pinguescit. Æstate rursus prodit ac uelut inuenescit. Versatur ac degit in syluis.

Hystrix. ὕστριξ, Vulgus porcus spinosus, Stachelschwein, Ex genere Erinaceorum est seu Erieyorum, Longis circumquaq; armatur aculeis, et cum intendit cutem missilibus, colore per intervalla uarijs partim nigro, partim albicante. Ora his urgentum pungit & sauciat canum, & longius etiam eiaculatur in prosequentes. Latet æstate, hyberno tempore de cauernis prodit.

Hyæna, ὕæνα. ignota. In mortuorum sese abdit sepulchra, & noctu auium adit stabula, reditissq; quas audit uocibus perfecta imitatione pastores euocat, egressos laniat ac deuorat.

Leo λέων, Lat. Leona λέοννα. Hæc iuba caret, qua leo decoratur. Pelle tegitur fulua, antèrius uillosa, posterius breuib; & confertis in-texta pilis. Oculi ei χαρόποιοι. Species oris feli similis. Refugit & abhorret scorpiones, & ad conspectum albi coloris præfulgidi, atq; Galli cantum expauescit ac contremiscit.

Lupus. λύκος. ♂. wolff. Ferox bestia, fraudulenta, crudelis & uoracissima, sed amans sobolis sue. Insecta ouibus naturaliter. Figura Canibus non absimilis. Septentrionales regiones gignunt
etiam

etiam aluntq; lupos nigricantes, maxime uero Moscouia & Lituania, minores uulgaribus, non absimiles uulpibus ceruleis, de quibus infra, sed asperiore pilo.

Lupus ceruarius Δῶγ. Luchs. Acerrimi morus animal, oblongum, breuibus cruribus, pelle indutum infra albicante, supra ex fuluo suppura purascente, sed maculis notisq; uariis, quæ speculorum instar radiant, pilis mollibus confertis longisq; obsita, qui in Ventre longiores sunt & pulciores, sed rariores. Est autem tam ferum & seuum animal ut lupum etiam inuadat atq; interficiat.

Lepus, λαγώς & λεγιος. in Hæc. Alium est θαλαττιος.

Cuniculus λαοῦπιδες uel κύνιδες. Minor est lepore colore albo, aut uarío, aut leporino. Cetera lepori non absimilis. Antra querit & excavat in montibus, earq; equat puluere, ne peruestigentur. Mane & uesperti prorepat, atq; in uestibulo antri sedens circumspicit. Foetus horum, quos uel uberibus ablatis uel uentre excisos Romani in delitijs habuerunt, latini Lauriæes uocant. Kuniglein.

Lynces plurimos alit Succia circa Helsingiam, oculis perspicaces, toto corpore sed in collo maxime uarios & maculosos, linguis serpentinis,

nis, quas exerunt & exporrigunt in longum, ungulibus magnis, oculis prominentibus, collo flexibili, quod mirifice circumagunt. Sueci uocant Kattluchs.

Lutra & Lutris, ὤνδρις, Otter, Natter, ἄμφοτεπίς: ut fiber, longior latiorq; Catto, colore fusco, nitente, cruribus breuibus, longa cauda, pilo pluma molliore, acutissimi morsus, Nam hominis parte correpta, à morsu non desinit, nisi fracta & comminuta crepent ossa.

Latax, λάταξ: ex aquis lutræ modo uictum petit. Vulgo Noerza, Nurz. Lutræ cognatus Ichneumon Ægyptius, ein Ægyptischer Otter.

Lacerta, ἑρπετὸν. Lacerta uiridis. Grunciadex.

Lacerta chalcidica σήν ἑρπετὸν χαλκιδίς καὶ kupffereidex.

Lacerta aquatica, Wassermolch, Wassereidex, qua pro Scinco hactenus multi usi sunt.

Μονοκέρως Unicornis, Einhorn. Animal munitu horridum, equino corpore, capite ceruino, pedibus Elephantinis, cauda suilla, uno cornu duos cubitos longo media fronte prominente, foris ob corticem quo tegitur rasilem nigro, intus candido & splendente, ex ampla basi sensim fastigiato in acutissimum apicem & ceu ἑλικοειδῶς intorto, circa extrema duro ac solido, ucris
sua

sus basim caua & medulla candida referta.

Mustela. γάλη. γάλη κατοικίδιος. Id est, mustela domestica. zwiesel, bilchen, milchmeuslein. Minor est mustela sylvestri saterio similior quam muri, inferne alba fulua superne.

Mustela rustica uel sylvestris, ἰκλὺς ἢ γάλη ἀγρία, Iltiß. Domestica mustela maior est. Mutat sedem quotidie, & catulos transfert. Odit & persequitur serpentes acerrime, quibus cum congressura munit sese ruta. Vtraq; ὀφθαλμοφάγος est & infesta muribus.

Mus. μῦς. Maus. Mus domesticus minor in domibus degit & horreis, corpore paruo, colore nigricante. Mus domesticus Maior, ein Ratt.

Mus agrestis maior uel mus subterraneus. zißmaus, erdmaus, ackermaus. Fuscum est nigris in facie maculis.

Mus sylvestris minor uel corylinus. Haselmaus. Rubet cauda pilosa, delectatur auellanis.

Mus araneus, μυγάλη. Spitzmaus, zißmaus. Venenatus est. Mus noricus grosse zißmaus. Pile,

Sorex genus murium subrubens, longa cauda acuta uoce, uenenosam. Spitzmaus.

Mus Ponticus. μῦς ὁ πόντος ὁ λευκός. Alberto Ariminus & Erebinus. Hermlein, Solus hic ex muribus albus, paruus mustelarum figura, quada

ra qua propter ad mustelarum genera aliqui re-
ferunt. Hyeme candet instar niuis æstate flau-
scit, inferre tamen semper albicat. Extrema cau-
da nigerrima est.

Mus aquatilis uel testudo lutaria, ὠμὺς uel
ἡμῦς ἢ ὄξιδος ἐκ τοῦ ὄστος Wassfermaus.

Mus marinus.

Mus Alpinus & montanus. Alberto Emptra
Murmeltier. Magnitudine melium in Alpibus
reperitur, quiescens aut comedens residet in clu-
nes. Pedibus binis posterioribus ingreditur, prio-
ribus uice manuum utitur, grunitum edit. Huic
simile specie animalculum, quod cuniculum Indi-
cum uocant, colore uarium, aut album, aut fla-
uum, aut nigrum, aut mixtum, grunniens ut por-
cellus, sed alpino mure minus est, & habetur in
delitijs, Indianisch kuniglein.

Meles & Melis. Vulgo Dachsus. Dachs. Ani-
mal pingue, dorso latiore, mordax admodum, pi-
lis superne ad nigredinem uergentibus, inferne
candicantibus, uerumtamen & nigris superius
candidos & candidis infra nigricantes pilos
asperfos habet, cruribus breuiusculis, capite in
summo nigro, laterotenus albo. In metu suffla-
te cutis distentu ictus hominum & canum mor-
sus arceat. Duo meliam genera. Vnum caninum

D

πολύς

πολυχιδής pedibus. Alterum Suillum Σιχί-
δης.

Martes & Martarus uulgo, ab Aristotele ut
conijcio Γαέριον nominatur. Animal est figura
mustele, magnitudine Catti, longius tamen &
breuioribus cruribus, superne fuluum cum qua-
dam fuscedine, inferne album aut flauum. Duo
eius genera. Vnum Faginum quod in sagis nidi-
ficet cognominatum, deterius est. Buchmarder
Dachmarder. Steinmarder. Alterum Abietinum
quod abietes amat & incolit, præstat. Thannen-
marder. Fichtenmarder. Baummarder. Satherio
cognata, quæ uulgo Zobela uocatur. Aristoteli ut
diuino Γάριον. Sed præstat pilorum mollicie,
densitate, colore ex fuscedine superficietenus ni-
tente, subtus uergente ad cæsum, pellis soliditas
te. Cetera satherio similis.

Machlis alci similis, nullo propaginum flexu,
celerrima. Quietura non in terram procumbit.
sed inclinato aliquantulum corpore stans arbori
annititur. Frequens in Moscouia est, Incole
Elend uocant, ut alcen ueram. Est in terris se-
ptentrionalibus & animal, quod ab insigni uo-
racitate Gulonem & πολυφάγον nominare
possumus. Sueci Ieuer uocant ut conijcio uiel-
fræ. Non multo maius est uulpe: coloris mustel-
lini.

lini, nigricantis, & pulchre nitentis, undulati-
obscurè variati ut in serico damasceno, pilis lon-
gis, non ita mollibus: cruribus breuib. Conscen-
dit arbores indeq; in prætereuntia desilit peco-
ra & homines etiam. Ventrem onustum disten-
tumq; & turgentem cibo angustas rimas pera-
repens ita comprimit, ut cibos quandoq; expri-
mat.

Mulus, ὄνος, Asinus sylvestris uel montanus,
Maulesell. Sui generis animal ab ἡμιόνῳ diuer-
sum, Latini uocabulis non distinguunt.

Mulus, Mula, ἡμιόνος, Differt à Mulo monta-
no. ἡμιόνος enim nullum animal gignit, ut inquit
Aristoteles, ἂν ἡμιόνῳ γένος ὅλον ἄγονον.
Latini ex asino & equo natum Mulum. ex equo
& asina Mulam: Ex equo uero & asina marem
Hinnum uocant.

Oues, πρόβατα que pariunt Schaaff.

Oues que non pariunt, cis, Scheps, Mares in
hoc genere castrati uocantur à Latinis Verue-
ces, Hammel.

Agni. ἄγρως ἢ ἄμνοι, Lemmer.

Aries. ἄριος, Widder. Virq; paterq; gregis.

Oryx de Caprearum genere, bisulcus, uni-
cornis, prægrandi corpore, magnitudine hirci,
barba sub mento promissa.

Pardus. πᾶνθη. Lupus canarius. Animal ut
quis

quibusdam placet sui generis. Alij marem pantherarum esse uolunt, Frequens in Africa, colore ex ceruleo aliquantulum nigricante, maculis uigris, oblongis, undulatis aspersis, magnitudine canum uenaticorum maiorum, facie cattorum.

Panthera. πάρδαλις. Bestia colore ex albo flauesciente, maculosa tota, notis orbicularibus fuluis ac nitentibus oculorum instar uariata. Amica feris omnibus præter aspidem & draconem. Capitur uino inebriata, ut Oppianus refert.

πλατυκέρωτες à latis sic dicti cornibus, ceruis similes sunt, cornua habent lata parte superiore & ramosa, ceruices iubatas. Prussia his abundat & Liuania. Damhirsch & Damlein.

Rhinoceros. ῥινοκέρως. Grande animal est, unum in nare cornu habens, quo ad saxum attrito & limato præparat se pugne cum Elephante, cui natura hostis est, & in dimicatione alium maxime petit, quem scit Elephanti molliorem esse.

Sciurus, σκίρπος ἢ κάμψιπος. Eichorn. Mustela paulo altior, rutilus, sed hyeme rubedinem in caesium uertit colorem. Caudam oblongam uillosam & densam habet, qua cum residet inflexa dorsum caputq; tegit, unde & nomen habet. Cursu saltuq; ualet plurimum, & tempestates occulto naturæ suæ sensu præsagit. Obturatis
enim

enim qua spiraturus est uentus cauernis ex parte
alia fores aperit.

Sciurus Cæsius figura, magnitudine, moribus
& uictu priori prorsus similis: colore discrepat,
qui huic in dorso cæsius, imo uentre candidus
est. Pilis uestitur mollissimis & delicatissimis.
Fech, Schonberg.

Simia, π.θη, ein Aff: Genera Simiarum
plura & diuersa. κυνέφαλος à caninis capiti-
bus dicti, Affen mit hunds-kopffen. His effera-
tior natura & malignior.

Satyri & Sphinges mitissimi.

καλλιγῆες toto penè aspectu differunt.
Barbam habent in facie. Caudam late fusam.
Vulgo Æthiopice Simiæ nominantur. Ex hoc
genere qui alben't toto corpore, reliqua prioribus
similes, Indicæ uocantur Simiæ.

Scincus σκίνα uel νεκρόφιλον χόρ-
δος, Non est Wassermolch seu Wassereidexen.
Sed ex Ægypto adfertur.

Sues ues. Mares à Latinis Verres. Germanice.
eber: fœmelle Scrophæ nominantur. Sew.

Porcus χοίρος. Geschnitten schwein. Inde
χοιβάδες, id est, strumæ seu scrophulæ. Kropff
an dem hals.

Domesticæ sues. ues ἡμερᾶ. Hauschwein
Syluestres & fera. ues ἄγρια. Wildeschwein

obuios, & uenenato aculeo ualide in corpora ad-
daſto ſauciat atq; inſicit. Vnde & nomen habet
Iaculos hos Lucanus uocat, Iaculiq; uolucres.

ἄμφιστανα, zweykopffichte schlangen, ἄμφικέφαλος est ut Solinus annotavit, Caput habens geminum, unum anterieus, alterum inferius. ad caudam. Sed uno reuera tantum est capite. Extrema cauda capitis formam refert, quod anteriorem tumida magnitudine aequat, & serpens ipse ob costas quoquo uersus mobiles in utramq; cepit partem, unde ἄμφιστανα dicitur, ἀπὸ τῶ ἄμφιστάνειν.

Aspidum genera Aegyptijs nota sunt, cute aspera et scabra, Cinerea, oculis scintillantibus. His ad ubera admotis post Actiacum praellium sese Cleopatra interfecisse commemoratur. Intra trium horarum spacium hominem interimunt. Tria genera recensentur. ΠΥΧΟΣ quod ex-puit uenenum quo necat denominata est. Colla enim exporrecto, praetentataque et explorata corporis quod petit distantia, postea uirus eia-culatur. ΧΟΡΣΑΙΑ alterum genus, uel potius νεγαία, id est cornuta. In capite enim duo emi-nent tubercula cornuum instar. Color corporis rubeus est. Venter Siccus et asper. Longitudo duorum cubitorum. ΧΑΙΣΟΝΙΟ tertium, quod

inter quas mas Aper latinis, Græcis κᾶπρος dicitur, ein Zwilder eber.

Rana uel Rana subcinerea, Βάτραχ' ὁ χερσαῖ' ὅ, Frosch.

Ranuncula Βάτραχιδ'.

Rana uiridis, Βάτραχ' ὁ χλωρός, Duo eius genera. Vnum in aquis præcipue degit, quod coaxat. Linguam enim faucibus adhaerentem et impediā habet. Alterum terrestre ἑρῆας. καλαμίτης, Laubfrosch. Vocalis est, et noctu maxime clamat, insidens arboribus aut planis, et tunc ferè pluuias prædicit.

Rana temporaria, Regenfroschlein.

Rana rubeta, ὁ φελῶς, Maxima omnium, ueneni aliquantulum habens, degit in rubetis et dumetis.

Rana uenenata Fossilis, Bufō, πυριφελῶς Feuerkrote. Cinerei est coloris et densissimæ pellis. Viuit sub terra, et humore terreno uescitur. Fit præda talpis.

Μολορῖδες, Βάτραχιδες, γυρίνοι, Kaulskrotten. Cicadis similes sunt.

Serpens. Schlang. Serpentum plura genera, quæ Lucanus recitat et Nicander.

Ἄκοντίας et ἄκοντις. Toto corpore excenso in longum uibratoq; iaculi instar insilit in obuios,

surdum est, colore hirundinis. Longitudine unius cubiti.

Anguis ein Schlang. Vocatur & nomine generis serpens. Nasci anguem ex medulla spine hominis tradunt, etsi sua quoq; est anguib; coeundi & pariendi consuetudo. Dissident naturali odio à mustelis, & saluam hominis ut exitiale ipsis uenenum refugiunt. Si laeserint hominem, à terra non recipi amplius aut foueri dicuntur.

Basiliscus, Βασίλισκος. Serpentum uenentissimus, ut qui solo halitu interficit, urit & corrumpit obuia quæq; adeo ut & quos conspexerit, & qui stridulo sono perstreptentem audiuerint eos inficiat solo obtuitu sonituq;. Longitudo duorum palmorum est. Caput acutum, ornatum diademate cui Chrysolithi color guttulis uariatus candidis uelut quibusdam interlucentibus gemmis, oculi rubentes. Color ex nigredine declinat in Cinereum. Occidit. à mustelis domesticis.

Βόα, ein Vnck. Habitat in domos subit, & halitu uenenato sepe totas adflat & inficit. Ad ubera adrepat Vaccarum lacte turgentia, quæ sugens & pinguescit & in molem augetur immensam. In Aphrica Boam centum uiginti pedes longam inuentam legitur in Historia Romana.

Cecus

Cæcula, τυφλωτ τυφλῖνος. Blindschleiche.

Parua admodum & gracilis corpore,

Calabricus serpens ignotus.

Natrix. coluber. ὕδρος χερσὺς δροε. Natter

Serpens aquaticus, fontes ueneno inficit. Vnde

Lucanus : Et Natrix uiolator aquæ.

Κέγχρις ignotus. Lucanus eius meminit. Et
semper recto lapsurus limite Cenchris. Pluribus
ille notis uariatam tingitur aluum. Quam para-
uis tinctus maculis Thebanus ophites, Concolor
exustis atq; indiscretus arenis Ammodites &c.
Nicander κέγχρουαυα nominat à crebris macu-
lis in milij similitudinem.

Κερᾶςκς. Serpens cornutus. hornichte schlan-
ge. Cornibus enim octo armatur, quæ ut arietum
cornua intorta & in Orbem ἐλικοειδῶς conuo-
luta sunt. Caret spinis, proq; illis Carthilagine
habet. Ideo flexuosior cæteris & uolubilior. Co-
lore est puluerco. Nicander sena ei cornicula
tribuit cum inquit. ἄλλοτε μὲν πισυρεῶσι τὸ τ'
ἐνδοίοισι κέραςκς.

Δίψας. Situla. Figura est Vipere, longitudi-
ne palmi, tota nigris tincta in dorso maculis. No-
men ab effectu acquisiuit. Sitim enim in illis quos
sauciatos ueneno suo imbuit, accendit inexple-
bilem, quæ uelut ardenti flamma uruntur inte-

Prester. πρεστερ, ab ardendo dictus. *Lucanus.*
Oraq; dissoluens avidus spumantia *Prester.*

Pareas πρείας πρεά τὸ τῆς πρείας μείζος
ἔχον, *Colore fuluo, oculis uelox, ore lato, morsus*
non maligno.

Σκυτάλη. *Sola* εἶς *prima exuias hyeme* dea
ponit, cum uerno tempore cæteri serpentes exui-
ant. *Lucanus.* Et Scytale sparsis etiam nunc sola
pruinis, *Exuias* positura suas.

Σκεπιδώρη σήψ, à putrefaciēte ueneno no-
men habet, πρεά δὲ σήψον τὸς πλεχλύτας, *Lu-*
canus. *Ossaq;* dissoluens cum corpore tabificus
Seps, induit colores loci, cui sese applicat. Vt est
apud *Nicandrum.*

τὸ τε δίψις ἐμβατεῖ σήψ.
πρεοῖ δ' ἀλλόφατον τε καὶ οὐ μίαν διαδὸν
ἴσχει.

Ἄϊερ ἐφδόμενος χῶρῳ ἵνα χερσὶν αὐτὸν πύχῃ.
Vipera, ἔχιδνη. Mas in hoc genere ἔχis, *Fœtus*
Viperarum ἔχινες apud *Nicandrum*, qui de his
mira refert, etsi uera negant esse, qui *Viperas*
uenantur. Coeunt mare semen in os fœmelle
proijciente, quod dum collo in os eius inserto per-
agit, fœmella caput mari præcidit dentibus.
Fœtus ubi maturuerunt uelut ulciscētes pa-
rentem corrosis atq; exesis lateribus uteri ma-
terni

rius, adeo ut & rumpantur quandoq; ut plurimum uero consumantur.

Δρυῖν & uel χέλυν & . Eichschlange.
Latibula terra ad radices quercuum subruta
excauat. Tanta ueneni eius est uirulentia, ut
solo contactu membra quæ attingit, & tota de-
nudet cute & tumefaciat. Moxq; eodem malo
corripiuntur qui lesa membra contrectant. Cum
peti se ab aliquo sentit, uenenatissimos & fœdia-
simos emittit fœtores, quibus organa olfactus
adeo corrumpuntur ut nullos postea odores
sentiant aut discernant.

De appellationibus huius serpentis Nicander.
κῆρυξ δὲ τοῖς δρυῖν αὖ τοῖς φαύσκειο τοῖς δὲ χέλυν
δρυὸς δὲ ζέτεροι καλεῖσσι &c.

Et de fœtente fumo.

ὅτι ἀπὸ τοῦ ἁπλοῦς ἐκ θρόνου ἄκτι.

ὅτι ἀπὸ πλαδῶν τὰ πρὶ σκύλα καὶ δερμὶ
ἵππων γναμπίόμυλοι μυδῶσιν ὑπὸ ἄεθ-
λοισι λαδᾶγγοι, Fumat dorso, & quacunq; res
pit de terra ui ueneni fumos elicit. Lucanus.
Trahitq; uia fumante Chelydri.

Dracones maximi sunt. Minimus enim ho-
rum cubitos quinq; excedere: Maximus triginta
equare dicitur. Et timent tonitrua & crebro fe-
riuntur. Drachen.

Ῥόρυξ & ignotum.

Prester

æterni erumpunt, atq; ita pereunte matre edun-
 tur. Ob hanc causam parricide antiquitus lege
 Pompeia non gladio, igne aut alijs usitatis su-
 plicijs afficiebantur, sed insuti in culeum bubu-
 lum cum cane, gallinaceo, simia & uipera proij-
 ciebantur in mare aut uicinum flumen, ut omni-
 um elementorum usu uiui mortuiq; priuarentur.
 Mares utrinq; binos dentes habent acutos ad-
 modum, unum in superiore, alterum in mandibu-
 la inferiore, tectos uesicula membranea ueneni
 plena. Ex ea morsu perforata in uulneribus quod
 dentibus faciunt uenenum illabitur. Fœmelle plu-
 res habent. Tyrus è uiperarum genere est.

Sunt è serpentum genere Ἐλλοπες, λί-
 βοες, μύαχοι, μόλχοι. αἰμορροίδες, de omni-
 bus Nicander. Ἐλλοπες ab imbecillitate sic dictæ
 πρὸς τὸ ἐλαίπαρ, uel Ἐλλοπες quasi Ἰλλοπες
 διὰ τὸ ἐργεῖσθαι φωνῆς ἢ ἄφωνοι εἶναι. Est enim
 τὸ Ἰλλεῖσθαι, ἐργεῖσθαι ἢ τὸ ὄψαι, φωνῆ, quod muti
 prorsus sunt. μυαχοι, id est, Venatores muris-
 um ἀπὸ τοῦ ἀχθεῖν φησὶ τῶς μυαῖς. Vocantur &
 Rophiæ. μόλχοι dicuntur quasi cauda ingre-
 dientes.

Αἰμορροὶδες Mas, & αἰμορροὶς Fœmella. Ser-
 pentis genus à quo icti per totum corpus sangui-
 ne effuso intereunt, ut Nicander inquit:

μή ποτε τοι θήλει αἰμυρῶσις ἴορ εὔειν
τῆς γῆς ὁδὸν ἀμύνης, τὰ μὲν ἄθροα πίμπρῃ
ταὺ δούλα.

ῥιζοθεν δὲ ἐνὶ χώρῃ κατείδετο ἄσπερος αἶμα.

Salamandra, cin Molch. Lacerta similis, cauda proluxa & flexuosa, pedibus aduncis acutisq; cute aspera & scabra, incessu tarto, oculis profundis, colore albo. Ignem quem tangit extinguit. Tanta ei frigiditas.

Stelliones. ἑσκαλάβοι & ἑσκαλαβῶτες. Italis Tarantule. Senectutem quam exuerunt protinus deuorant, præripientes comitali remedia. In dorso pellem habent picturatam & punctis conspersam, quæ Stellarum instar radiant. Vulgo Salamandræ uocantur.

Scorpius & Scorpio. σκόπιος. Scorpion Nicander octo Scorpionum genera recenset, Primum λευκὸν uocat à colore albo, cuius morsus non est lethalis. Alterum πυρρὸν à rutilo colore, quod ictis à sese tremorem & sitim commouet. Tertium зоφοειδὲς à colore obscuro. Quartum χλωρὸν à uiridante colore. Quintum ἐμπέλιον quasi πελιδνὸν à liuido colore. Sextum καρκινώϊκελον, id est. Cancro simile. Septimum παγούριον ὁμοιον, id est. Paguro simile, qui Cancrigenus est. Octauum μέλιχλωρον, à melleo cereo uel flammeo colore.

Tals

Talpa, ὁ ἀσφαλῆς, Mult worff, Animal no-
tum, nigrum, pelle murium, quod sub terra degit,
eamq; suffodit ac subruit egestis uelut colliculis.
Visu destituitur: cute tamen detracta, qua cras-
siuscula est, oculorum uestigia apparent, nimirum
orbiculus nigricans, & in eius medio pupilla,
quam κοῦλῶ uocant, tandemq; utriq; circum-
fusus τὸ κυκλώπιον.

Tarandus, ein Reen & Reener. Animal ad
Boream Suecis notum & reliquis gentibus Sc-
ptentrionalibus. Videtur mixtum quiddam esse
ex ceruo & Dama, medium proceritate inter
utrumq; crassicie autem & robore neutri ce-
dens. Forma corporis non multum à Ceruo dif-
fert, nisi quod crura sunt crassiora & breuiora,
ita ut anterior tibia non uideatur excedere pal-
mi longitudinem. Pes demissior est & eius fere
magnitudinis, cuius est Vacca in bimatu. Caput
tenue est, argutum, siccum & oblongum, aures
breuiores quam cerui. Cornua uero latius etiam
se se diffundunt, nec sunt rami teretres, sed nonni-
hil lati. In utroq; cornu statim à radice recta su-
pra oculos exit tanquam in mucronem ramus
initio tenuis & teres, paulatim autem grandis-
scens inq; latam sese diducens, & tandem si ssura
multiplici ceu in digitos dehiscens, quibus sese
extrema

extrema illorum ramorum contingunt. Cicuribus in hyeme, hi præciduntur, eo quod musco uesci uolentes, quem niue perfossa ungule anterioris pedis & disiecta nudant, impediunt quo minus os terræ propius admoueant. Palmo supra illos ramos insigniores duo trunci cornuum edunt alios duos in anteriorem quidem partem, ita tamen ut recuruentur in altum. Horum caulis ferè cubitalis est priusquam in ἀποκύσας alia quot latas finditur ac desinit. Ab horum exortu trunci ipsi alte sese erigunt, atq; ita incuruantur ut hemicyclij ambitum efficere uideantur, superantq; extensa in altum proceri hominis brachia. Extrema eorum tandem dilatata in ramos aliquot insignes ima parte latos, summa nonnihil acuminatos finduntur. Singulis annis uere appetente cornua amittunt. Relinquunt illa in uertice capitis qua hæserunt duo profunda uulnera, quæ quinq; aut sex dierum spacio fouendo inuersa ungula posteriorum pedum sanant. Renata cornua tota æstate obducit & uestit pellucula uillosa, quam autumnò atterendo saxis arboribusue affricando deradunt atq; deglubunt. Non est illis idem color hyeme, qui æstate. Hyeme enim nonnulli albi sunt, alij flauī, alij fului, alij mustellini, Æstate omnes (exceptis paucis feris qui nigri sunt) eiusdem sunt coloris & ferè asinini

asinini nigricantis. Quia tamen pilorum qui albi
sunt alioquin, extrema nigricant, quanto in hor-
rore pilos distente cutis ceu exerunt colorem ui-
dentur mutare. Inde fortasse nata fabula de Ta-
rando mutante suam & rerum quibus astat as-
sidetue colorem imitante. Venter illis albus est
et pars etiam interior crurum anteriorum. Vn-
gula nigra prorsus & distincta à crure tenui
linea candida. In anteriore parte suffraginum
macula est alba, oblonga, forma ferè amygdala.
Videtur esse pars altissima totius corporis ex-
cepto capite, ubi spinæ coniungitur cauda. Inde
ad armos usq; dorsum uidetur in decliue ferri
nonnihil. Cauda brevis est ut damarum, ubi exit
è spina subcinericia in superiore parte, in reli-
quis candida. Sub Cauda clunes incipiunt albe-
scere perfecta figura inuersi turbinis, cuius lati-
tudo in basi ea ferè est, quæ transuersæ manus,
longitudo duplo maior. Palearia propendent
illis ut ceruis & bobus. Incedentes strepitum
edunt talem qualem ignis urens spinas. Pascen-
tes incredibili celeritate maxillas mouent cum
strepitu, qualem nos leuiter plaudentes manibus
excitamus. Nulla re uestuntur quam nuda ma-
nu attigerit homo. Contenti sunt cibo tenuissi-
mo & ceteris muscum aridum preferunt, qui
saxis & aridioribus locis adheret, qualis

pyris & malis senescentibus innascitur.

Tigris. Tigerthier. Animal Hircaniae notum;
colore subfuluo, maculis nigris, orbicularibus, et
eleganti nitore fulgidis asperso. Tigris σχιζόπτερος
est & γαμψώνυξ: πολυτελευτῶν & φιλό-
τελευτῶν. Ereptam enim sobolem odore uestigans
persequitur tantisper, donec inueniat. Raptor
uero conspecta unum ex catulis abijcit, quem illa
arreptum in specum reportat, moxq; reuertitur
ut & ceteros repetat, iterumq; altero & tertio
quartoue recepto redit, assequiturq; ac accele-
rat raptorem toties quoties insequitur, donec ex-
tortos factus recuperet omnes, nisi aquis exclus-
datur, sobole nauigijs auecta.

Tragelaphus ex ceruo & hirco mixtum
quiddam est, Brandhirsch. Animal est cornibus
armatum ceruinis: sub mento hircina decoratum
barba: uilloso pectore: robustum & pugnax.

Vrsus. ὄρκτος Beer, Robur urso in reliquo
corpore & potissimum in anterioribus pedibus:
Caput inualidissimum, ut leoni fortissimum. Ideo
urgente necessitate precipitaturus sese, capite
pedibus operto desilit, ac sepe craneo perfracto
exanimatur. In terris borealibus reperiuntur &
candidi ursi minores uulgaribus.

Catuli urforum σκύμνοι uel σκυμνά. Scribunt

bunt aliqui Vrsos radem & informem edere
massam, eamq; lambendo fingere & formare. Id
negant uerum esse Venatores, qui & recentissia
mos ursarum partus considerarunt, & grauidis
catulos executerunt, absolutos utrosq;.

Viueria. Huius duo genera. Vnum paruum
capite uario, dorso rubente, uentre candido. Cuti
cuius pili tam pertinaciter inhaerent, ut à carne ci
tius abstrahatur cutis, quam euellantur pili.
Germa: hamster. Alberto Cirsctus Sclauica seu
Illyrica appellatione, Alterum mustela maius,
colore ex albo croceoq; mixto, secundum, ani
malibus omnibus inuisum, cuniculis infestum,
quos uenatur & de caueis in retia propellit.
Alberto furo & furunculus. Frette, Vtrumq;
δῆσυχόλορ & μάχιμορ.

Vulpes, ὄλωπυξ, Fuchs, Notum animal cal
lidum & fraudulentum. Foucas Melium ipsis ab
sentibus ingreditur, & conspurcatis suis excre
mentis foetore inquinat ingratisimo, quem illi
abhorrentes deserunt foucas & nouas parant.
Male affecta pini sese resina sanat ac restituit.
Habet Suecia & nigras uulpes, quarum pelles in
tanto sunt precio, ut uiginti quinq; & triginta
quandoq; aestimentur aureis. Habet & ceruleas,
& omnium uilissimas candidas.

Vri boues sunt, quos *Zrisent* Germani uocant^a
collo, ceruice, & tota anteriore parte iubata
barba sub mento..

Zapetion feli simile animal, sed grandius mul-
to & ferum, maculosum, fuscum colore. Ex ge-
nitalibus eius resudat, id quod Zibetum uocatur,
odoris delicatissimi. Zibekatz. Est & animal
Capree non absimile, unico armatum cornu,
prægrandi corpore, in cuius umbilico laxioris
utriculi modo prominente ex effuso in eum san-
guine Moschum generatur, quod attrito ruptoq;
umbilico reijcit, Bisem thierlein.

Serapha animal est, altitudine mediocris equi
Thracici, cruribus ceruinis, posterioribus bre-
uioribus, anterioribus altioribus, tota parte
posteriore demissiore ac decliui, dorso à clunibus
uersus collum sensim assurgente, collo gracili, lon-
go, elato erectoq;, & altitudine oblonga Hunga-
ricorum equitum spicula æquante, capite paruo
hinnulorum aut capreolorum capitibus simili,
cornibus duobus paruis, acuminatis, fronte sum-
ma exertis, pilo plano leuiq;, colore ex dilutiore
flauidine nitido, candidis maculis Rhombi figu-
ra toto corpore distinctim et undulatim uariato,
Vngula bifida plane ut ceruorum aut capreolor-
um Meminerunt eius Topographi terre san-

die. Et Anno 1553. Bizantiij apud Imperatorem
 Turcicum tale usum est, quod sequenti mox an-
 no extinctum est, Turci Surnapa appellatione
 cognata nominarunt.

A P P E L L A T I O N E S I N S E C T O R V M.

APES, μέλιττα, Binen, κηρόποια, Hæ-
 mortuas sunt qui putent reuiuiscere, si in-
 tra testum hyeme seruentur, deinde uerno Sole
 torrantur, ac ficulneo cinere toto die fouean-
 tur. In totum uero amissas reparari, uentribus
 bubulis cum fimo obrutis, Vergilius ex iuuenco-
 rum cadaueribus apes, ut ex equorum uestpas &
 crabrones, ex Asinorum scarabæos nasci tradit.
 Et notus est uersus Græcus. ἵπποι μὲν σφήκων
 ἄλυσσις, ταῦτοι δὲ μελισσῶν.

Dux Apum præstantior. ἡ γέμων πυρρός,
 der röttlichte binen konig.

Apes rotundæ & uariæ, quæ optimæ. μέλιτ-
 ται σφόνδαλαι καὶ τρίκιλαι. Runde binen vnd
 sprencklicht.

Apes longæ. μακράι. Similes Crabronibus.
 Lenglichte binen.

Fures. φῶγες. Nigræ apes cum latiore uen-
 tre. Schwarze binen.

Arānci.

Aranei, ἀράχνη & ἀράχνη. Spinnen, Genera araneorum plura.

Phalangia, φαλάγγια, quorum differentie septem.

ῥόξι & ῥάχιος, Acinor nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus brevissimis tanquam imperfectis. Dolor à morsu eius qualis ab ictu scor pionis, Kleine schwarze spinnen, rund wie eine Weinbeer.

Stellio, ἀσέλιος, Albis seu stellatis uirgulis distinguitur. Kleine sprecklichte erdspinnen. Hinc stellionatus crimen.

Ceruleus araneus, κυάνεος, lanugine nigra, Caliginem concitat & uomitus.

Araneus muscarius, ἀγγώσκος, Venatur muscas telis in pariete latissime expansis, Fliegenfänger.

Σφίκεος & σφιδάρι, A difficili pugna de nominatum est, inimicum uestis. A crabronibus penna tantum differt.

Μυρμικέος. Araneus capite formicis similis, aluo nigra, albis guttulis distincta, Vesparum dolore infestat, Septimum Cantharidibus simile.

Alterum genus araneorum ὄλιος & λύκειος uocant, id est, lupinum. Species eius due. Una que non textit, λύκος μυρμός. Altera que ad

sepes textit, lanuginosa, grandi capite, λυκὸς
μαίζων, id est, lupus maior, zaunspinnen.

Tertium genus, ἀνώνυμον, Sapientissimum
omnium & artificiosissimum in texendo.

Quartum, τετραγώνιον Plinio,

Ajylo, Tabenus, Oestrum, ὄισον, Bremse.
Pungit & infestat in aestu.

Aurelia, χρυσάμιδος, Goldwurmlein. Fi-
unt ex crucis olerum & oleribus insidunt, In Ra-
phani folijs enim primo uere ros calore solis
spissatus cogitur in milij magnitudinem, Inde
porrigitur uermiculus paruus, & triduo mox
cruca, quæ adiectis diebus accrescit, immobilis,
duro cortice, ad tactum tantum mouetur aranei.
Hæc deinde cruca, quam χρυσάμιδα appel-
lant, rupto cortice uolat papilio.

Bombyx, βόμβυξ, Seidenwurm, Sunt autem
Bombyces primum crucae albæ, cum sericum
nunt. Ex his bombyli fiunt: ex Bombylis Necydalis
ex Necydalis sex mensibus uicissim Bombyces.

Blattæ lucem fugiunt, & ex humida nascun-
tur materia. Heymen. Differentiæ earum tres.
Molles μυλῶναι, quæ circa molas nascuntur, &
quæ odoris tedio inuise acutæ clunes habent.
Cerylli à blattis differunt. Sunt enim animalcu-
la similia locustis sine pennis. Græce τετραγώνια
στῆς, Feldheimen, Feldgrillen, Feldheuschrecken.

Blattæ

Blattæ pistrinariæ, σίλφαι αἱ ἐν τοῖς ἀγροκοποίοις, Meelwurm Brodwurm.

Blattæ uirides αἱ πρᾶσοκροδίδες, Arrodunt herbarum & præcipue porri folia. Vnde Porricidæ nominantur.

Bruti. ἀπείλαβοι, Krautwurm. Krautkefer. Sprenkell.

Buprestes, βυπρέστες, Qualster, E Cantharidum genere, simillimæ scarabeo longipedi. Falunt inter herbas boues, deuoratæq; ita inflammant eos, ut rumpantur. Vnde & nomen inueniunt.

Clerus, κλήρ, uel πυγάρους, Vermiculus araneo similis, qui parit in alucis. Nocet fauis & facit ut examen ægrofet.

Βδελιδες, uel ὄνοι uel ὄνοισκοι, uel τίλοι, Latini mellepedæ & multipedæ. Vermes pilosi, qui nascuntur in humidis locis uel sub uasis aqua repletis, multis pedibus arcuatim prorepunt, atq; ad tactum contrahunt se Eselchyn.

Crabrones, καθαρίδες, Horlitzgen. In cauernis ac sub terra nidos faciunt ex luto.

Crabrones syluestres, καθαρίδες αἱ ἄγριοι. In arborum cauernis degunt. Ferociores multo & nocentiores prioribus Ictus eorum absq; febre non est. Ducem eligunt ut apes, & aculeo omnes armanitur.

Culices, αἰσίδες κνίπες, Mücken, Schnecken, Differentiæ culicum plures.

Culices ficarij, ψύπες, ψύδες, Generat hos Caprificus fructibus suis.

Culices Vinarij, κώνωπες, Oriuntur ex Vermiculis, qui uini fece acescente gignuntur.

Culices muliones αἰεμίδες, Ex tipulis quas ascarides græci uocant Circa puteos & aquas nascuntur, Wassermücken.

Cicadæ τέτυγες, Heuschrecken, Differunt à locustis nostris, quæ in segetibus degunt. Cicadæ sonore, quæ canunt, ἄχες, Minores mutæ τέτυγονία.

Cicindela, Nitedula, Duplices sunt, Aliæ non uolant, πυγολαμπάδες αἰαπίεροι, A clunium fulgore nomen sortitæ. Fiunt ex crucis pilosis & mutata degenerant in Cyrres βοσρύχες dictos, Aliæ uolant, πυγολαμπάδες αἰπιέρωτοι, Cicindela uolantes, Lichtmücken, Lucent de nocte & in tenebris oculos uelut fulgore præstringunt, Circa elychnia uolant uesperii.

Cantharides, αἰ κανθαρίδες, Muscæ uirides Goldkefer, Fortent & cum uim habeant διόξινον uis, incantius sumptæ renes exulcerant.

Cinices, κορῆς διὰ πὸ κλίβανος δραντζεν.

Cossi, ξυλοφθόροι, Holzwurm, uocantur & κώληκες, Sed hoc nomen generale est.

Cossis

Cossis cognatæ ἑξίπτις sed minores, *Kleine
holzdwurmlein.*

Erucæ κάμπαι, *Raupen, Erucæ Pinorum.
πιτυοκάμπαι.*

Formicæ, μύρμηκες *Emsen, Laboriose sunt,
tota æstate conuehant & reponunt, quo hyeme
fruantur.*

Fuci, κηφῶδες, *Threnen.*

Gurguliones, κίς *Kornwürm. In frugum ex
cussis granis nascuntur, eaq; corroduunt & deuor-
rant.*

Αἰλαμπυγίδες, *Feurkefer, Lucent ignium
modo noctu clunium & laterum fulgore.*

Hepiulus, ὁ ἡπίολος Papilionum genus
quod circa ardentes lychnos noctu uolitat & sæ-
pe impetu flammam extinguit. *Kleiner glöwe-
falter.*

Hirudo, ἑσέλλα, ἡ sugendo dicta, *Sanguisuga
Aegel.*

Lentes, κορίδες, *Nissen. Ex pediculorum in-
ter se coitu generantur in capite & asperginis
instar pertinacissime capilitio inhaerescunt.*

Locustæ, ἀκρίδες, sic dicte ὡς ἐπὶ τῷ ἀκροῦ
ἀκέρω τῷ σιτῷ ἐπὶ τῷ ἀκροῦ. *Varie sunt, diffe-
runtq; magnitudine & coloribus. Germani una
uoce Heuschrecken uocant. ἀκρίδες αἱ πικρά-
κοσκοί uel ἰνοί, Latine Asiraci uel Aselli. In Ly-*

bia comeduntur. Carent alis. Vidimus annis superioribus magna locustarum agmina ex Oriente appulsa & Meridie, quæ tam denso confertoq; uolabant agmine, ut solem obumbrarent: pennarum uero stidore tanto, ut alites esse crederentur. Imensos tractus alarum permeabant remigio, & quacumq; procumbebant multa tactu adurebant, omnia uero arrodebant morfu, ut de messa attonsq; uiderentur.

Byturi, ἵπες. Vermiculi, qui ex austrina coeli constitutione putrescente in uitibus humore suo perfluo & excrementiceo nascuntur, cum primum geminant Vites, eroduntq; gemmantia uitium germina. κείπαι, in oleis nascuntur uitio aliquo affectis coeli terræque iniuria, cum primum germen edunt uel efflorescunt.

κράμβοι, Vermes in Vuis & Pampinis nati ex affectione ærugini simili.

Ἀκὰγι, Animalculum quod in uetusta cera de putredine humoris aquei reliqui post aërcum humidum attenuatum et pene absumptum gignitur.

Lytta, λυττὰ, Vermiculus qui lingæ canum innasci atq; insidere consuevit, quo exempto Canuli nec rabie corripiuntur nec fastidium sentiunt,

Lumbrici ἑλμινθες Nascuntur in animantibus & eorum præcipue intestinis. Origo è putredine est. Ζωύριον.

Lumbrici rotundi. στρογγυλαί, Runde lange
Wurme.

Lati lumbrici, πλατῆαι, Dicke Wurme
ἄσκαριδες, Latine Tipulæ. Kleine Wur-
mlein. Albicant & sæpe magno numero ab infan-
tibus præsertim ἀσδιφάγοις eduntur.

Lumbrici seu Vermes terrestres. γῆς ἑνδοθα
Regenwurm.

Μίσηαι, Vermiculi consummentes fabas. Klei-
ne bonenwurmlein.

Muscæ, μύσαι, Fliegen, μυώπις, Roßfliegen.
Mordelle, ὄξσοσάκναι.

Νύμφαι, Vermiculi uocantur, ex quibus mu-
tatis Apes, Vespe, & Crabrones generantur. sci-
licet, cum mutari iam incipiunt.

Pediculi, φθῆγες, Leuse, Origo pediculorum
ē putredine in animantibus, quorum caro laxior,
humidior & πῆξιτωμαλκωτέρα, qualis suum
& anserum. Inde φθειρίασις, qua perijt
L. Sylla, Leusefucht.

Pulices, ψύλλαι, Floe.

Papiliones, ψύχαι, Summeruogel, ἡδονοψά-
τερ. Differunt coloribus, qui alijs candidus est.
alijs ex cœruleo candicans, alijs niger, alijs au-
reus, alijs uiridis, alijs & plerisq; uariis.

Tipula

Tipulæ, αἰ ἄσκαριδες, Ex his fiunt Culices
mulliones, Wasserfpinnen.

Ricini, Vermiculi seu pediculi Canum.

Scarabei Tauri uel Lucani, καῖαβοι, Schro-
ter hornichte kefer, scarabei terrestres, Cornua
his praelonga bifidis dentata forcipibus, quæ ad
morsum in cacumine comprimunt, ut Cancri
chelas suas & Scorpj.

Scarabei Virides & Galleruæ, αἰ μολό-
λονβαι, Grunkefer.

Reduij, κρώτωνα, Holzbock, Pecudibus
æstiuo tempore aculeo totoq; capite infixo inha-
rescunt, sugentes sanguinem.

Scorabei pillularij, αἰ κῶνθαροι, Roßkefer,
Hi in fimo quem uolunt hyeme conduntur exa-
nimes, & Vermes pariunt, quibus uerno sole so-
tis ac uiuificatis restituuntur.

Scolenpendra uel Centipeda, Nossel, Ossel.
Pennatis connumeratur insectis. Discissa longo
uiuit tempore, ut pleraq; insecta longa πολύπο-
δα, & pars abscissa tam caudam quam caput
uersus mouetur.

Tineæ, σῆτες, Schaben, Vermiculi qui Vestes
arrodere & libros consueuerunt.

Teredo, τετραδῶν, Kupferwurm Non ab-
similis Crabronibus, sed uaria & latitudine pro-
xima apibus. Appetit delicatos & dulces cibos
auide,

quid e ad eosq; cum impetu aduolat. Vnde & nomen habet, τένθεα enim λιχνότης significat et γαστριμαργία, Aculeus eorum δ' τένθ' ὄλιον.

Teredo. τέρηδ' ὤρ, Erucæ nomen quæ in alucarijs gignitur.

Vespe. σφῆκες, δ' vespen. Duæ sunt Vesparum differentie. Fera, ἄγριοι σφῆκες. Et Placidiores, ἰμωρότεροι. Inter utraq; quædam duces sunt, quæ præcunt ceteras, uocanturq; μήτρες, id est, matres, quædam operariæ, quæ & laborant fauos nidosq; fingendo ut apes, quanquam steriles, & ducibus seruiunt atq; administrant necessaria. Est & Vesparum genus, quod ἰσλος & μυγίόπας, Græcis dicitur.

APPELLATIONES VOLUCRVM.

Aquilarum genera.

Aquila ἄετος, Adler, Ahrn, sex aquilarum genera.

Valeria, μελανἄετος, id est fulua, uel λαγοφόνος, id est, leporaria, inde quod lepores uenatur, Colore nigricans, minima magnitudine, uiribus præcipua, sola alit & educat foetus suos, Hasengeyer.

Πυγας

πυγαῖος, id est, albicilla, ab albicante cauda uel νεσποφῶνος, id est, hinularia. Huius pulum, priusquam cauda albicet, Romani augures *imiusulum* uocant.

μόσφν, id est, Næuia à macula pennæ, uel ιντοφῶνος, id est, anataria, uel πλάγος, id est, plancus seu clanga, Homero τέκερος, uel ἑρμαῖτις, magnitudine secunda, Ingenium est ei testudines raptas frangere è sublimi iaciendo.

πεγκρόπτερος ab alarum notis, uel γυπαῖος à uulturina specie, uel, ὄρεπάλαιος, id est, Ciconia montana. Imbellis ac degener adeo, ut uerberetur à coruo, famelica querula, solaq; ex anima fert corpora.

Ἀλκιετος, id est, marina aquila. Clarissima est oculorum acie, ex alto enim librans se, uisq; in gurgite pisce, præceps proruens discubis petore aquis eum abripit. Pullos adhuc implumes producos, cogit aduersam solem intueri, nolentes ferit, illachrymanτες reijcit ut adulterinos, *fischabrn*.

Ἰνδοῖος, id est, uera germanaq; aquila. Sola incorruptæ originis, magnitudine media colore subrutilo. Ceteras aquile, accipitres, et minores etiam aues promiscua consuetudine procreant, *edellabrn* Pennæ aquilarum reliquarum alitum pennas, si misceantur deuorant.

Ex aquilarum genere & φῆλως est, quam barbari
batam Romani, osifragam Tusci, augures Ro-
mani sanqualem uocarunt. Cæteris omnibus ma-
ior est, color eius ex cinereo albicat, nutrit pullos
suos & aquilæ marinæ, quos ante maturitatem
ab ipsa eiectos colligit, suscipit & educat.

ACCIPITRVM GENERA.

Accipiter, ἰεραξ, horum genera decem ge-
neraliter à Germanis Habicht aut Falcken
uocantur.

Buteo, τρυγῶν à numero testium, Busarhn
Æsalo, ἀισάλωρ, arhn, solus omni tempore
apparet, cæteri hyeme absunt.

Circus, κίρκος, Falck. Prosperrimi olim fuit
augurij nuptialibus negocijs & pecuniariæ rei,
unde adhuc usitatum est nostris germanis in a-
matorijs elegijs circorum meminisse. Sunt horum
differentiæ plurimæ.

Stellaris accipiter, ἀστέριος, Blaufuß.

Palumbarius accipiter, φαωφορὸς, uel φα-
ῶτυπος ein Taubenfalck.

Pernix, πέρνης, uulgo gyrofalco, Stoßfalck.

Subbuteo, ὑποτρυγῶν, latior reliquis, Ha-
bicht.

Perca, πέρκος, Schmirlein uel Sperber, aliàs,
Nisus.

Accip

Accipiter fringillarius, Rotelgeyer, σπιζιάς.
Rubetarius accipiter, φεβηλόχος Hunner
abrn,

Leuis accipiter, λῆος ἰσράϊξ, Bawmfalch.

Cybindus nocturnus accipiter Plinio, qui
bellum gerit cum aquila. χαλκίς uel κυμινός
Bergfalch.

Alauda, κόρυδος uel κορύδαλος, Lerch, Ge-
nera earum plura. Vnum cristatum ἐπίγειος uel
λόφος ἔχων, unde cassita latinis & galerita di-
citur, Heubellerch.

Alterum gregale, ἀγελῶς, sine crista, Sangs-
lerch ἑυπτόρος, colore priori similis, sed minor,
& uolatu alta petit, cum cassita & raro euolet,
& euecta alis, statim rursus procumbat, neq; al-
tis nec longis spacijs confectis.

Est & tertium ἀνώνυμος grecis. Steinlerch.
Acredula, ὀλολυγῶν, Greinerlin.

Ἄιματόπιδος ἢ ἐρυθρόπιδος Rottlangk.

Allectatrices aues, ταλεύτεις, Lockuogel.

Anas, νῆττα, Mas anatum, Enrich, Erpell, fœ-
melle Emte, σεγανοπόδων genus.

Anates sylvestres νῆτται αἱ ἀγρίαι, wildent-
ten. Maiores quas germani grossenten, mertzent-
ten uocant, ima supremaq; corporis parte cœsiae
sunt, pennas alarum & alijs aspersas coloribus,
præcipue tamen purpureo nitentes habent, collo
capitiq;

capitiq; uiredo ad nigredinem tendens inest, me-
dium collum candidus ambit circulus. Fœmellæ
uariæ sed cinereæ & nigris albisq; maculis dis-
finitæ sunt.

Βοοκιάδες, quibus rostra latiuscula & sima,
cinereus color nigredine uariatus. Mittelenten.

Φασκιάδες anatibus sylvestribus fœmellis si-
milimæ sed minores, Krichenten, A Varrone lib. 3.
querquedula uocantur.

Ούγια plus cæteris nigricant, minores sunt,
angustiore rostro & oblongo Meccrenten.

Anser, χλώ, anser maior. Gans Zamgans.

Anser minor seu gregatilis χλώ ο μικρός ο
ἀγελαῖος, Wildgans. χλωαλώπης Vulpanser,
ignotus.

Chenocrotes fero anseres minores, Seegenfc.

Ardea, Ardeola, ἐρωδιός. Tria earum gene-
ra, πέλδος cin blawer Reiger.

Λευκορῶδιός, id est, ardea alba, ein gemeiner
Reiger, ἀστέριας ἐρωδιός. id est, ardea stellaris,
que cognominatur ὄρνος à pigritia, rosdam, Rora
dummel, pittouer, Plinio onocrotalus.

Atricapilla, μελαγκόρυφος, Munchlein.
Caret summe lingue acumine ut luscinia, quod
his duabus proprium est. Currucæ simillima,
cinerea, uertice nigerrimo, qualem aurimilis
habet.

Auriuittis, χρυσοπτερίς. Goldfinck, Loba
finck, Thumpfsaff, Gumpel, Vertice tota nigra,
ima parte punicea, superiore cinerea, nigricans.
Fœmella in hoc genere tota cinerea, uertice ni
gro ut mas. Vocatur germanicè Quetsch, à uoce
quam edit.

Argathyllis, ἀργυροπτερίς ex ripariarum ge
nere hirundinum. Spirschwalben,

Brenthus, βρενθος, Montes colit & Sylvas,
ὄρνις βρενθος & ἐν βίοτος, uocem edit sonoram
& suauem.

Caprimulgus, δαιρυοθάλας, ein pfaff. Inter
diu cœcutit, noctu cernit acutè, maior minima
merula, minor cuculo. τὸ ἴδιον βλακικὸς, fugit
ubera caprarum furtim, quæ exhausta emoriantur,
& capris quas ita mulserunt, cœcitas obori
tur.

Cardueles, καρπιδέες, Distelfincken. Stiglis
hen. Dorsum eis cinereum & fuscum, alæ crocco
colore nigroq; mixtim & alternatim uariate, al
bisq; notatæ maculis, uertex nigricans, rostrum
niger ambitus, hunc, miniatus, miniatum cœsius
circumdat. Valent amœnitate uocis, & imperata
faciunt, nec uoce tantum sed pedibus & ore.

Cataraëta. καταράκτης, albus falco zweisser
falck. Viuit in maritimis locis, paulo minor ac
cipitre.

Cœrus

Cœruleo, κῦανϑ, Klein zimmer, cœruleus
totus, minor merula, maior fringilla, acuto ro-
stro, breuibus pedibus.

Ciconia, πέλαγοι. Storcke. Hyeme exacta
nidos eosdem repetunt, & parentes senio confe-
ctos uicissim alunt, & pastum educunt. Dicuntur
πέλαγοι διὰ τὸ ἔχειν πῶρ μέλαντα καὶ
λευκά: πέλον uel πέλισνον liuidum fuscum si-
gnificat, ἀργὸν album:

Collurio, κολλυρίον, ex turdorum genere,
Brachvogel. Capitur sub hyemen maxime, nec
figura nec magnitudine multum dissimilis merula,
le, colore fusco, terreo, obscuro, ut humi sedans
uix agnoscitur, & à terra dolore discerni possit.

Certhia, κέρθιϑ, parua avis minor cardue-
le, uaria, pulchra, moribus & ingenio audax, sa-
gax in uite officijs, uoce clara, θριποφάγϑ.
Hirengryll.

GENERA COLVM. BARVM.

Columba πορσις absolute, Zometauben.
Columbae fidem coniugij non uiolant, com-
munemq; seruant domum, neutri nota adulteria
nidumq; neuter relinquit, nisi celebs aut uidua,
F 2 tota

tota æstate foctant, & tricesimo die prole priore
expedita rursus pariunt.

Liua, πλεας, Holtztaube, dicta á liuore, li-
uet enim plumis & penè nigricat, pedibus ru-
bris scabrosisq; est, minus cæteris columbis man-
suescit, minor columba domestica.

Palumbes φάλαξ, Mas in hoc genere, φάλαξ,
Palumbus, Ringeltauben. Maxime sunt corpo-
ribus in columbaceo genere palumbes, Vere &
æstate gemunt, hyeme discedunt cum turturibus.

Vinago, ὄνας, ex columbaceo genere, minor
palumbe, maior columba autumnno conspicitur
& capitur.

Turtur, τρυγών ὁ κρηνῆς minimus columba-
cei generis, parit bina oua, interdum terna, &
duo excludit, tertium relinquit, quod ὄρνις
græci & κωός & γορ uocant. Turteltaube. Col-
lum ut cæteræ eiusdem generis bibens, non resu-
pinat.

Pipiones iunge Tauben.

Cuculus, κουκὺς, de genere accipitrum, parit
in alieno nido, ut Palumbe, Currucæ, Alaudæ.
Foetus ubi aboleuit pullos reliquos cum matre
deuorat, procedit primo Vere, ortu caniculæ, oc-
cultatur. Kukuck.

Coturnices, ὄστρυες, Swachteln. Salaciſſimæ
sunt,

sunt, pullos exclusos ut gallinæ, incubando reser-
uent, prodeuntes ducunt & subinde transfe-
runt, non in alto nidificant, sed in plana area ue-
pribus congestis nidos construunt, autumnō pin-
guescunt. Cum migrant, duces sequuntur, ὄρνυ-
γομῆτες, lingulacæ, otum & cenchramum,
Redeunt sine ducibus, & propter corporis gra-
uitatem difficulter uolant, præsertim austro
flante.

Κένυια apud Athenæum τὰ μικρὰ ὄρνυγια.

Cenchramus, κήχραμος, ein Schreer. Dux
coturnicum unus, quas & de nocte cum abeun-
dum est, excitat & euocat admonetq; itineris,
uocem eius cum senserint aucupes, intelligunt
parari discessum.

Cinclus, κίγκλος, Steinbeisser, Steinbicker,
magnitudine ruticillæ, ex cinereo albicans, cau-
dam mouens, τὰ ὀπίθ' ἐκτρέφει.

Culicilega κνιπλόγος, Fliegenstecher, Differt
à motacilla, magnitudo ei spini, color cinereus,
maculis distinctus, totus σποδοειδὴς καὶ κατα-
σικτός, uox parua, caudam mouet, Muscas uenā-
tur & culices.

Curruca, ὑπλάξ, Grasmucklein.

Coruus, κόραξ. Rapp, pullos cum iam pote-
stas uolitandi est, non tantum nido eijcit, sed per-
sequens tota pellit regione,

Calidris, καλιδρίς, auicula parua, cinerea
& uaria agilis, & ad motum expedita, recta sur-
sum prorepit, & accliuia quæq; conscendit re-
ctissimo tramite, Baumkletterlein. καλιδρίς ci-
nerea, Baumheckel.

Cornix, κορώνη, Krae.

Cornix cinerea σποδοσφίς, Schiltkrae, Ne-
belkrae.

Cornix Nigricans, Schwarzkrae. Dissidet
cum ulula, ardeole amica est, & sola grandio-
rum auium pullos iam uolantes comitatur.

Cornix fera aut syluestris. Holkrae. Maior
reliquis, color ei partim cinereus ad albedinem
uergens, partim fuscus ut in capite & collo, al-
uarijs mixtim coloribustinctæ, degit in syluis.

Cres, κρέξ, Schrick, aduersatur merule.

Ficedula, σικαλίσ, Schnepfflein, Zwustling.
Latinum nomen inde factum, quod cum ficus ma-
turescunt, tum primum fere prodit & conspi-
citur. Cognata phoenicuro. Atricapilla uerò as-
deo similis, ut nisi cauda differrent, quæ illi ru-
bea, huic cinerea est, uix possent dinosci. Schne-
pfflein uerò inde denominata est, quod auidiissime
hiantibus faucibus Muscas captat & culices.

Fringilla, σποΐζα, Finck, Rotfinck, rubet in pe-
ctore, rubore obscuro, & nigricante, nomen inde
acquisiuit, quod frigore cantat & uiget.

Frin-

Fringilla montana, ὄγισ' ὠϊζν, degit in montibus, collum habens caeruleum, cætera fringillæ similis, Rowert, Schneefingk, Winterfingk, -

Florus, ἄνθος, equi uocem imitatur, colore pulcher, magnitudine par fringillæ, aquea loca amat.

Fulica, κέπφος, non est Kybitz, sed marina auis, Kepff proferens, sequitur gaudas & spuma capitur, carnem bonam & odoratam habet. Zwismeye.

Fullo, γνάφαλος, Seydenschwanz, Zwipstern, pulchra auis, colorum uarietate elegans, raro apparet & hyberno tempore sere cernitur, ut uideatur esse ξεινός ὄρνις.

Garrulus, σαρμολογος, Gaza græc. in uocem expressurus frugilegam uertit, cum ab Aristotele inter σκωληκόφαγα recensatur, & fructibus arborum ut glandibus plus quàm frugibus uescatur. Tot hæc auis uariata est coloribus, ut nullus ei deesse uideatur. dorsum tamen ad cæcylum tendit, alæ cæruleo & pluribus alijs neustissime coloratæ sunt, uenter purpurascit & uelut ὑακινθίζει, ipsa μιμνησκή natura reliquarum uoces effingit ac reddit, germanis Heher Marcolfus, Holzschreyer.

Gaudia, λὰγος, genera gaudiarum duo. Alba

γαυία λάγοι ὁι λευκοι Seegallen, albuken, circumuolitant in mari coniuncte fulicis.

Gauie cinerea, λάγοι ὁι δ' χρωμα σποδία. Sēs, Kybyz. Cinereo colore propemodum nigricant, inferiore uentre alben, cristam capite gerunt, amnes ac flumina petunt uictus causa,

Galgulus κολοίος, κέλεος ἢ κέλεθ, quidam à galgulo galbulam differre putant, ut galbula uel galbulus sit ἰκτερος. Plinius. ἰκτερος ἢ galgulum eiusdem esse auis nomina putat, nec Aristoteles icteri meminit, nisi χαράδριος sit, quæ etiam solo obtutu ictericos sanare existimatur, quòd si cum charadrio seu Rupice, Icterus eadem non est, à galgulo eam differre non opinor. Est autem auis tota ex uiridi lutea, turturis magnitudine, ξυλοκόπος. Quidam eam germanorum Emmerling, quidam δωιδωολ esse putant, ego eam esse conijcio, quam uocamus Geelgorst.

Galli gallinacci, ἀλεκτρυόνες. Hausban.

Capi, galli castrati, Kaphan.

Galline, ἀλεκτογίδες, Hennen. Greci gallinas ὀρνίθας etiam generali nomine uocant.

κάλατοι, galli gallinacci barba.

Αΐφος, crista galli, der Hancn Kamp: insigne gallinaceorum serratam quod nec caro est, nec cartilago, nec callus, uerum peculiare quippiam

πλακ

πληκτεδὸν galli calcar.

Gallinæ Aphricanæ μελαγρίδες, Kuere hennen. Oua edunt maculis & punctulis uariata, ut phasiani.

Gallinæ Nouellæ, ἄλεκτορίδες ἢ ὄρνιθες αἰνεσιδές, Merzhennen, quæ pariunt nonnunquam oua ὑπανεμία & ζεφκία dicta.

Matrices, Bruthennen, quæ incubando excludunt pullos.

Gallinæ ueteranæ, ἄλεκτορίδες αἰπρεσβύται ἢ παλαιαί, Kluckhennen.

Gallinago, ἄσκαλώπαξ, Schnepff, Holzschnepff, gallinæ magnitudine, oblongo & rotundo rostro colore attagenis, cursu celeri, εὐλάνοτροπος est.

Perdices, πέγδρες & κᾶκκαβαῖ inde κακκαβίζαρ, Feldhunner, Rephunner. Insigniter ἀφροδισιαστικοί sunt, & certo anni tempore inter se dimicant acerrime coturnicum more pro foemellis. Humi nidos texunt suos, & mira calliditate pullos ex insidiantium aucupum manibus eripiunt, quos cum accedere sentiunt, pellunt pullos nido, ipsi uero donec fugerint & absconderint se alibi expectant, postea subito cum strepitu prorumpunt, & aucupes turbant atq; eludunt. ἄγριοι πέγδρες δὲ wilde Rephunner, τίθασοι πέγδρες, game Rephunner.

Attagen ἢ Attagena, ἄτταγυνῶν uel ἄτταγῶ-
νός, Birckhun. Paulo maior perdice, toto dorso
maculosa ἔν uaria, colore nigricans ἔν ὑποπυ-
γίω, id est, flammeo rubore rutilans, difficulter
euolat ἔν pondere corporis grauata, ἔν alarum
admiculo, quas nimis breues habet, destituta,
κοῖσιμος, ἐπιγῆος.

Phasianus, φασιανός, Phasan, à Phaside ame-
ne, Colchidis.

Tarda auis, ὄρνις ἔν λαγοςίας Haselhun,
galli magnitudine, colore coturnicis, aliquantu-
lum ad purpureum declinante, oblongo capite,
rostro acuto, gracili collo, lingua ossea. Tardæ
nomen à tardo uolatu adepta est. Auis μιμιῦ-
κα, ἔν imitans aucupes κοδωνίκα οculos sibi
oblimentes capitur, clausis enim ἔν glutinatis
oculis excecatur.

Tetrix, τέτριξ, quam Athenienses ὄρχαλα
uocant Vrax, Vragen. Auerhan Maior quouis
gallo maximo, colore cæsius uel cœruleo, sed sub
albicante collo, utrinq; ab auribus demissa ha-
bens gallorum more τὰ κάδουα.

Grues, γέραναι, Kranich. Discedunt Autum-
no, ducem quem elegerunt sequentes, ἔν inter
uolandum ordine ac serie λαμβάνουσαι græcum ex-
primunt, unde Martialis;

Tura

Turbabis uersus nec litera tota uolabit,

Vnam perdideris si palamedis aucte.

Vipiones, iunge Kranich.

Gryphes, Greysf. Inter hos & equos disidia
um naturale.

Gracili, κολοιοι, Talhen. Dalen. Genera eo-
rum tria.

Graculus qui nomine generis sic dicitur, κο-
γακίας græce, magnitudine cornicis rostro ro-
tundo & rutilo. Plinio πυρρόκορος, Bercktale,

Monedula, à moneta cognominata, soli enim
huic aui furacitas auri argentiq; inest. λινος &
βωμολόχος græci uocant, utrumq; nomen à
rapacitate acquisiuit, unsere Thalen.

Tertium genus ἀνώρυμος Aristoteli, σεγας
νόπρι est, id est, Palmipes, Plinius, φαλακροκό-
ρος, quasi caluum coruum nominat,

Halcedo, ἁλκυών πρὸς τὸ ἐν ἁλὶ κύνει Eys-
uogel. Halcedonum aliæ marinæ, aliæ fluuiales.

Marinæ raro apparent in littoribus, paulo
maiores passere, colore cœruleo, uiridi & sub-
purpureo mixtis, rostro longo, tenui & luteo. Nis-
dos in scopulis pile marinæ & ijs, quas à spuma
maris græci ἁλὸς ἄχνας uocant similes constru-
unt brumæ, tempore. Vnde halcyonia dies, quorū
septem antecedunt brumam, septem consequun-
tur, quiescit enim mare ipsis incubantibus & ex-
cludentibus pullos.

Fly

Pluviales marinis maiores sunt, ceruleæ magna ex parte, & earum aliæ ὠδῖνοι sunt, quæ arundinibus insidentes canunt, aliæ ἔφωνοι, Eysvogel.

Carulus, κάρυλϚ, halcedonum mas.

Harpa ἄρπη huic inimica φῶξι.

Hirundo. χελιδῶν, Schwalbe, Prima omnium parit, & coecos enititur, & quia primi sætus frigore ferè pereunt, secundos diligenter magna solertia fouet & educat. Plura earum generum nidos luto confingunt, stramento roborant.

Hirundines domesticæ Nigræ sunt, Hausfchwalben.

Hirundines rusticæ uel agrestes imo uentre ad collum usq; albicant, reliquo corpore nigræ, Kirchschwalben.

Ripariæ seu falcule, minimæ omnium, ripas excavant, atq; ita internidificant. Colorem habent fuscum ad cinereum uergentem. Vberfchwalben.

Apodes ἄποδες uel κυψέλλοι, ὅτι νεοττεύουσιν ἐν κυψέλλοις ἐκ πηλῶς πεπλασµέναις, id est, quia in cistellis ex luto compactis ac confortatis nidificant, uel χελιδόνες θαλάττιαι, id est hirundines marinæ, Reinschwalben, Spirschwaben. Perpetuo circumuolitant, nec confidunt unquam, nulla enim his quies, nisi in nidis, aut pen-

den

dent aut iacent, extra nidos semper μετέωροι
sunt, alas habent longas & latas, pedes pilosos,
& adco minutos, ut his carere putemur.

Iunco, χοϊνίλος uel χοϊνίωρ, caudam mo-
uet ut Cinclus.

Tryngas, uersatur circa paludes & aquas,
Rictmus.

Ligurinus uel spinus, ἀκανθίς, duo horum
genera. Minus quod non ualde dissimile cardue-
li colorem ex albo nigroq; mixtum habet, nos
etiam Distelfincken uocamus.

Maius fringillam duplo excedit, cætera fere
similis Kirschfincken & Kernbeisser. Colore
utrumq; genus ignobile, sed ualet & commenda-
tur amœnitate uocis.

Lingulaca, γλωτῆς, dux coturnicum cum
ortygometra oto & cenchramo, sic dicta ὅτι
γλωτῆαρ δ'ξαγορνίω ἔχα μέχρι πορρω,
id est, quia linguam exerit prælongam. Non plus
uno die cum agmine pergit, in primo hospitio
pertaesa itineris & uolatus progredientes dese-
rit, Dorendreer.

Luscinia, Philomela, ἀνδρ' ἀπὸ τῆς ἀνδρ' αἰ-
quod sine intermissione frè cum coepit canit,
denominata est. Fœmina aut mas modulatur quæ
cum incubat, aut fouendis uacat pullis, cessat à
cantu. Vterq; caret summæ lingue acumine, con-
ditur

ditur uterq; ab autumno usque ad uernos dies,
mutatq; colorem & speciem. Nachtigall.

Luteus, χλωπεύς, δρονίτς. Nota auis, citrimo
ferè tota colore insignis. præterquam dorsi pars
et suprema, quæ obscura uiredine tincta uide-
tur.

Luteola, χλωρίς, sic uocata, δία τὸ τὰ κἄ-
τω ἔχει ὠχρὰ, id est, à partis suæ inferioris
colore luteo, paulo minor alauda ea quæ crista
caret. Ex alo herba, quam σύμφυτον greci uo-
cant, stirpitus euulsa nidum parat, substernitq;
pilos & lanam. zeislein. Foemella cinerea est &
uaria, imo uentre pallida.

Lapogus crocea à coturnicibus magnitudine
& colore differt, croceo tinctu, cibus gratissima
tota hyeme conspicua. Emmerling, Goldammer.
Est & altera candida, cui nomen leporini uilli de-
dere, columbæ magnitudine, ignota, apud Plinium

Miluus, ἰκτινός, δweiher. Ex accipitrum ge-
nere, isdem & magnitudine & pennis respon-
dens, afficitur podagra circa solstitium.

Merula, κόττιφος. Tria earum genera. Nig-
ra Merula, ὁ μέλας κόττιφος, rostro rutilo,
colore nigro & nitente, cetera non dissimilis
turdo, Amsel.

Alba Merula, ἰαλευκός κόττιφος, magnitu-
dine & uoce priori par, sed rara.

Fusca

Fusca, ὁ βαυὶς κ' ἡυφός, paulo cateris minor, colore ex nigro in fuscum uergente, Pirckhamsell.

Nigra merula uocem mutat & colorem.

Mergus, ὁ ῥῖζα, uictum ex aquis petit. Daucher. Varia candida quibusdam partibus, quibusdam nigra, σεγαυόπες, id est, palmipes.

Merops, μέροψ, hunc et ὁ ὄρεπς ab aëreo colore cognominari existimo. Pennae eius superiores partim caeruleae, partim uirides sunt, inferiores pallent, extremae laterotenus & primores in pectore ad purpureum uergunt, rubris intercurrentibus maculis. Magnitudo ei turdi rostrum aduncum, adeo, ut uelut πρὸς ὀσκιδ' α' habere uideatur Krinitz, & in thals. Accerrimi morsus, rostro enim caueas omnes, prater ferreas confringit. Aristoteles in hoc genere inquit, τῶς γονίας αὐτὴν ῥέφιδ' ἵπ' αὐτῶν ἐγγόωρ' ἐν μόνον γαστροῦτας, ἀλλὰ καὶ ἐν θύς.

Μελαγκόρυφος, Atricapilla, Munchlein.

Motacilla, σεοπύγης uel ἰυγξ, Bachstelz, Zwasserstelz. Fringilla paulo minor, colore uario, continuè caudam mouens.

Molliceps, μαλακοκεφαλεύς, Harschnepff. Neunmorder. Capite grandiusculo molli & carthilagineo, unde et nomē acquisiuit, paulo minor turdo, colore cinereo, ore firmo, paruo & rotundo pennis inualidis, sed ὑπὲρ.

No:

Nocturnæ aues, νυκτέρινοι ὄρνιθες, quæ ont-
nes γαμψώνυχες sunt.

Bubo, Βύας, Vho, Schuffaus.

Cicunia, νηκλόραξ, Náchtrab, unguibus est
aduncis, uenatione nocturna cibum parat.

Noctua, γλαυξ, Nachteull. Hanc aues ceteræ
repetunt & circumuolitant. Ipsæ maiore multi-
tudine circumdata resupinæ pedibus repugnant,
collectæq; in arctum rostro & aduncis unguibus
teguntur, auxiliatur oppressis accipiter, bellum
que partitur. Aucupes his minores alliciunt, &
allectas capiunt aues.

Otus, ὄτος, Schleyereull, inde dicta ὅτι πρὶ
τῶ ὄτι πρὸς γλαυξ ἔχει, aures enim plumbeas
eminentes habet, imitatrix alioqui & parasitica
& saltatrix, noctuæ similis, sed maior.

Aluco, ἑλεος, Maior gallo.

Vlula, αἰγώλιος, uenatur picas ut aluco.

Asiones, σκῶπες, duo horum genera. Alij
semper conspiciuntur αἰετοσκῶπες, Keuzlein. Alij
autumno quandoq; uno atq; altero die appa-
rent, Steineulen. Illi ἄφωνοι sunt, hi clamant sub
crepusculum.

Vespertilio, νυκτοφῶς, Fledermaus, δερμό-
πτερος est, uolat enim cute membranæ & no-
cte incunte prodit, habet auriculas.

Olores, νύκτορες, σεγαρόνες sunt & ὠδικοί,
canuntq;

canuntq; maximè morituri. Inde uersus est Græ-
cus Οὐ δῶατῃ κύνω κόρυς Θ Πραπλήσιω
ἄδφρ. Sunt qui omnino cynos canere negant.
Ipsi se inter se deuorant, quod his solis & acci-
pitrum generi proprium est, nulla enim alioquā
unius speciei animantia cognatas & congeneres
carnes gustant.

ὄρτυγομήτρα, Ortygometra, dux coturnia-
cum, matrix, der Wachteln konig. Auis est tur-
turis magnitudine, longis cruribus δουδαλὴς καὶ
δφλι.

Onocrotalus, Aristoteli ἐζώδι Θ ἄσφιας.
figura cycni, galli magnitudine, fuscus rostro
longo, quo in aquas uel terram infixio, ciet soni-
tum qualem asini edunt, unde Rosdam & Ror-
duwmeel à Germanis uocatur, faucibus eius inest
uelut alter uterus capax & amplus, in quem in-
explebili auiditate, quæ uorat congerit & pre-
coquit, post eadem ruminans in uerum trans-
mittit uentrem. Nominatur etiam Pittouer, &
Pickart.

Parus, ὁ ἀγρίεαλ Θ, auicula fœcunda καὶ
πολ/τεκν Θ, Mays, Genera parorum plura.

Et si tria tantum Aristoteles refert.

Fringillago σπιζίτης, maxima omnium frin-
gille equalis, pulchra, inferius ex lutco uirescens
in uertice nigricans. spigel mays, ko. mays.

G

Parus

Parus montana, ὄρνις ἀγρίβαλθ', διὰ τὸ
διὰ τῆς ἐπ' τοῖς ὄρεσι, Blawmays, meelmays,

Parus ὑπόβρυχα, minima quidem omnium,
sed longissimam habet caudam, zagelmays pfan-
nestiglitz.

Parus cristata, Montane par magnitudine.
heydenmays, heybelmays.

Parus tuus ἀρξὺν καὶ θήλειαν, Pfan, Mas ut
Aristoteles refert, pennas amittit cum primis
arborum frondibus, recipit cum germine earun-
dem, et ova frequenter dum fœmina incubat,
aduolans frangit, ideo gallinis incubanda non ra-
ro subiiciuntur. Nomen habet ἀπὸ τῆς τάσσεως
πῶ πῶρ. Gemmantes enim expandit colores
pennarum aduerso sole, laudatus maxime, collo
toto saphyri gemme color inest, extreme pennæ
Chrysoberylli, Auri et Saphyri coloribus distin-
ctæ sunt.

Picus Martius, Σκουλάπης, Specht. Tundit
et excavat arbores uermium et culicum causa,
egressos lingua arripit, quam latiusculam et ma-
iusculam habet, perreptat arbores, humi raro
consistit, scanditq; in subrectum, felium modo,
quandoq; et supinus stellionum more ingreditur.
Plura eorum genera.

Maximus paulo minor gallina, niger, capite
ruffo, Schwarzer Specht.

Medius

Medius capite ruffo, croceo pectore, collo dor-
soq; uiridi, alis cœruleis, proprie picus martius
latinorum, merula maior, grunspecht.

Minimus qui pipo dicitur, corpore merula
inferior, uarius, ex nigro alboq; commixtas pen-
nas habens, bunter specht, elster specht à colore.
Est & quartus hoc tertio minor, graspecht.

Pica, κῑτῖς. Duo earum genera, Urbanum El-
ster. Aglafter, cœcos parit, garrulum est, uocem
subinde mutat, & quouis anno cum rapa serun-
tur caluescit. Syluestre, toto corpore uarium, pen-
nis candidis cinereis cœruleisq; mixtis, alis uerò
nigrum, Heydenelster. Kriegelster. Varias olim
appellatas Plinius autor est.

Porphyrio πορφυρέωρ, solus morsu bibit &
loco τῆς προλόεσς, longum habet collum ut Pha-
sianus. Est autem προλόεσς, in aubus quibus-
dam uelut anterior gula, in quam deglutiunt &
congerunt cibos, indeq; uelut ruminando in uen-
triculum transferunt, der kropff. Ipsa auis ex
genere est οξίζοπόδωρ; magnitudine galli, colo-
re cœruleo, rostro rutilo, pedibus altis & oblon-
gis, in delitijs olim habita.

Pardali οἱ πῶρδαλοι, gregatim uolant, solis
tarij raro conspiciuntur, colore cinereo, magni-
tudine propemodum mollicipitis, uoce lar ga, non
grauis. Puluer, pulros.

Passer sylvester, *Spercie*, *Hausperlingk*. *Ani-*
cula salax, unde nunc in eo genere non diutius an-
no durare creditur.

Passer Troglodytes, *Baumspierlingk*, *Mos-*
spierlingk. Nidificat in arborum cavitatibus, su-
perne fuscus, sed varius, & transversis albis li-
neis distinctus, inferne cœsius, uertice purpureo,
sub collo nigris candidisq; maculis eleganter uar-
iatus.

Passer aquaticus in harundinetis nidificat,
domestico cetera similis, nisi quod collum albus
cingit torques, *Rhorsperling*.

Passer magnus, *spodos uēyas*, solitarius est
paulo minor merula. *Gersthammer*.

Platée, *πιδέκατες*. Anseribus similes, sed
rostro latiore & longiore, uictum petunt ex a-
quis. Mergos præda potitos insequuntur, corre-
ptos mordicus retinent, donec capturam extora-
queant. Conchis se marinis implent, & paulo
post, ubi calore uentris coxerunt reuomunt elici-
untq; esculenta, testas secernunt. *Loffelgens*.

Psittacus, ἡ ψύττακον, *Syttich*, *αυθγωνόδυωτος*
etiam, quod humanas imitatur & exprimere
consuevit uoces cognominata. Viredo in toto cor-
poris eius lutea, solum collum miniato distinctum
est torque, capiti eadem durities quæ rostro.

Phalaris, *φάλαρις*, aquatica avis, anatum
sylvæ

sylvestrium scæmellarum colore, qui ἔρτεφος est, rostro angusto & oblongo, rotundo capite, Nutvogel, Reck.

Rubicilla, πυρρὸς Buchsingh, Quecker, Blut singh. superne toto dorso & uertice insigniter uario, sub collo anteriore parte & utrinque ad alarum initium igneo rubore & sup pallido nitet, inferne alba.

Rubecula, ἐπιθανός Rotkropfflin, Rothelchyn, auicula nota.

Ruticilla, φονικροός ἀπὸ τῆς φονικρῆς ὀφθαλμοῦ id est, à rubente cauda, Rotstern, differt à ficedula quæ cinereo toto & obscuro colore constat.

Ruberta βαῦς, ziepdruschel. Minutatur dorum, figura alioqui & colore iliaco turdo similis, circa rubos uiuit & uersatur, delectatur enim fructibus eorum & sambuci baccis.

Rupex, χαράδριος, à præruptis torrentium alueis nomen inuenit, colit enim loca confragosa, prærupta & cauernosa, praua colore & uoce, diem fugit, nocte prodit.

Salus, ἀργίOTOS, zotscherlein, colore cinereo, magnitudine lutcola, uertice minato, aduersatur floreo.

Sitta, σίττα uel σίττα, Nushacker, Nushaer, pugnax sed concinna, elegans, sæcunda, callida, & πολυδιδύς. Nomen ei Germani indidoo

runt, quod ex confusa macerie uictum querit,

Sturni, Ἰάροι, Staer. Nigri sunt, maculosi, magnitudine merule, cateruatim uolitant, omnesq; uelut in orbem pile circumaguntur, & in medium omnes tendunt agmen capiuntur dum à uolatu cum impetu procumbunt.

Struthiocameli, Στρουθιοκάμηλοι, nomen hoc ueteribus insolens qui μεγάλας Στρες uocauerunt, altitudine equitem excedunt insidentem equo, & eundem celeritate uincunt, currentem enim pennæ adiuuant, non à terra attolluntur, mira eis natura inest concoquendi sine delectu deglutita. Ungulas bisulcas habent ceruinis similes, alias Στδοι λυβικοι, Germanice Straus.

Tetraones, τέτρανες, Trappen. Vultures magnitudine uel equant uel superant, colorē habent album, tendentem ad cinereum, alas nigricantes.

Tinnunculi, κελγίδες. Ex genere sunt γαμα-
ῖονυχον, id est, aduncarum auium, Steingallen,
Steinschmatzen. Defendunt columbas contra accipitres, quos terrent naturali potentia, in tantum ut hi uisum uocemq; eorum fugiant, oua pariunt minij modo rubra.

Tyrannus, τυραννος. Auium omnium minus-
tissima, paulo locusta maior, cristam gerit ruti-
lam. Color corporis ex citrino rubescit superne,
inferne caesus est, ὄρνις ἐνυχαία. C. ἐνυθμωρ,
ein Goldhenlein.

Τροί

Trochilus, τροχίλος. οἰκὲ τρωγλας Ἐλῶχα-
μας, avis parua cinerea zaunkonig, schnecko-
nig. Vocatur ἔ πεσοβὺς, id est, senator ἔ κα-
σιλεύς, id est, Regulus.

Tryngas, τρυγας, Wasserhenne. Nigra to-
ta, χιζοπτερος, candido uertice ad rostrum usq; de-
misso, pedibus altis ἔ nigris caudam continuo
mouet, ἔ loca incolit aquosa.

Turdus κίχλη. Turdorum tria genera ἱεῖβο-
γὸς ἔ ἱεῖφάγος. Visciuoros, magnitudine pica,
uisco ἔ resina uescitur. Krammetuogel, zimmer.

τρίχας, id est, Pilaris turdus, amplitudine
merule uocem edit acutam cum obscura qua-
dam fuscitudine, uarius ἔ maculosus, Sangdrun-
schel.

ἱλιάς, iliacus turdus. Minor pilari turdo, ci-
nereus ad fuscadinem uergens, sed minus uarius,
Weindruschel, Weingartuogel.

Velia, ἑλέα, Avis parua, colore pulchro, in-
ferne croceo. ualens uoce, estate umbrosa, hyeme
aprica loca petit, zigelhempffling. Velia cinerea
Heydenhempffling.

Vireo χλωπιωρ, Widwol. Tyrolt, Byrolt,
luteus totus, magnitudine turturis, procedit cir-
ca solstitium aestiuum ex oriente Arcturo disce-
dit, ἔ tota non conspicitur hyeme. Aristoteles

inquit de eo quod sit ματῆρ ἀγαθὸς καὶ βίος
μὴχανος.

Vpupa, ἑποφ, Switthopff. Criftam gerit pli-
catilem, quam contrahit erigitq; secundum capi-
tis longitudinem, nidum ex humanis fingit ster-
coribus, figuram æstate mutat & hyeme.

Vratrix κολυμβήσῃς ἔ κολυμβῆς. *Mini-
ma mergorum ἔ reliquarum ex aquis victum
petentium, συζγομελαινά tota, præterquam in
uentre, ubi albet. Mergens sese ἔ conspectos pis-
ces prosequens, diu sub aquis huc illuc fertur,
priusquam reuertitur, unde ἔ nomen inuenit
Germanice Schwarzteucherlein ἔ. zwassera-
msell.*

Vultur, W. & Geyer. Aristoteles duo genera recenset. Vnum albicans minus, ex quo genere sunt qui uocantur, Fischgeyer.

Alterum Maius, & σωδ'οδ'ε'ςοδ'οδ', ut Hageneyer & Ofgeyer, Sagacissimè hi odorantur, & biduo triduoque ante circumuolitant, loca, in quibus cadauera futura sunt.

PISCES GRANDIO-
RES NATANTES IN FLUVIIS
GERMANIÆ. ET NO-
BISNOTI.

SAL

SALmo & Elox unius piscis nomina
Sna sunt, quem Rhenani et Galli adpellant ein
Salmen, Saxonica gentes ein Lachs. Et nomen
Salmonis ueteris linguae gallicae proprium fuisse
existimo. Grandis piscis est, & recens carnem
habet rubescentem, uelut roseo colore. Ideo Aus-
sonius uenustissime dixit.

Nec te puniceo rutilantem uiscere Salmo,
Transierim, late cuius uaga uerbera caudæ.
Gurgite de medio summas referuntur in un-
das.

Quod eò fortasse dicit, quia Salmonis præci-
pua est agilitas in saltando.

Amia, zwels, non multum dissimilis Thynnus
& Orcyno.

Mario, Hausen, porco marino similis, Danu-
bii proprius, ut & Plinius narrat. fortassis Græ-
cis σκίουρα.

Silurus, Sturio, Stor, ut Iouius existimat, cui
adsentior, etiamsi alijs quidusdem aliter uidetur.
Idem piscis γλαῦς & σείλαρος dicitur, quod
est à σείω & ὄυρα, id est, à mouenda cauda.
Quia uerum est, Sturiones magna ui caudis im-
pellere moles non paruas, & sepe ligna impetu
caudæ quasi disseccare.

G S

PISCES

PISCES MEDIOCRIMA
GNITVDINE, NO-
BIS NOTI.

ANGVILLA, ἔγχελος, Ael, ab ἔγχω-
ilus, quod est aqua limosa & cœnosa.
Nam in tali aqua & strangulantur & capiuntur
anguille. Albertus inquit, in Danubio non esse
anguillas.

Congrus γόγγρος Meeraell, & γούλλος.
Murenæ ei caudam præcidit.

Lucius Hecht. Etsi autem aliqui disputant, di-
scrimen esse inter nostrum Lucium & Lupum,
tamen descriptio ostendit cognationem esse. Sit
igitur Lupus & λάβραξ, ein Hecht. Athenæus
inquit, λάβρακες ἔχουσι γλώσσαν ὡσώδην καὶ
ἔστι ἄρκόφάγοι ἐυχύλοι καὶ οὐ πολυτρόφοι.
Habet enim & noster Lucius ossa in lingua,

Aurata, χρυσόφρυς, Forellen. Athenæus in-
quit, omnium piscium suauissimos esse gustui, καὶ
τροφικωτάτους. Est autem nomen Forellen à
latina appellatione uariolus. Et aliqui adpella-
tione moti lupum uarium nominant Forellen.

Cyprinus, Carpio, ein Karp.

Coracinus, κορακίνος, ein Rap, squamosus &
latus.

Porca, πέγκον, Parsen, toto corpore squamo-

se, et interspersas candori rubras maculas habentes, & in dorso spinosos aculeos.

Melanuri, μελανυργοι Kulparsen, nigris maculis distincti à Percis, & ut Athenæus inquit, habent caudam multis nigris lineis distinctam, ευχυλοι sunt & antecellunt Percis. Aiunt autem Melanuros ductores esse Percarum, Vnde prouerbiū est, quod extat apud Athenæū, ἐπεὶ πέρι μελανύργου, Comitatur Perca Melanurum. Significat fortassis familiaritatem talem, in qua minor ductor est maioris.

Murenas, etsi Albertus distinguit species, & alias grandes ac marinas nominat, alias paruas nostrates, die Lampreten, tamen nos secuti iudicia eruditorum non interpretamur Lampreten, Sed Murenæ nomen marinis illis relinquimus, quæ corpora habent anguillarum similia, sed grandiora, & nigris & luteis maculis confersa & cum delphinis pugnant, & ex genere sunt eorum piscium, qui asperis & acutis dentibus armati sunt, & sunt carniuori.

Est autem alius piscis Lampreta lubricus, colore cœruleo, subnigro, septem paruis fistulis mirabili ordine distinctis acceptam aquam remittens, cuius nomen est ἄσπις, latine Mustella stellaris. Et γαλέος, Mustela, nomen est generis, quod plures species continet,

Ἀῖος γαλιός, levis Mustela, Neunaugen.
Γαλιός ποίκιλος, Bcisger. Mustela uaria.
Mullus, Barben, græce τῆγλη, quia ter in anno
parit, & Atheneus inquit Aristoteli dice, e,
τὸν τῆγλῳ τῆς τικτῆρ τὸ ἔτρε.

Alij alias Etymologias tradunt. Etiam nomen
μύλλος Græcis notum fuit,

Orphus, ὄρφος, Orsen, & apud nos ut existi-
mo, Dourffling.

Aloſa, Iesen, τῖῃσα, Romanis Laccia, habet
lucentes squamas argenteo fulgore, est ex eorum
numero, qui apud nos assati gratiores sunt.
Claudianus: Stridentesq; focis obsonia plebis alo-
sas.

Erythrini ex miluorum genere, Rotfeder,
Plozen, rubris pinnis, mit schonen roten feder-
lin.

Prasem, nunc uocant prasinum, sed uetus ne-
scio. Fortasse is quem Ballerum uocant.

Alburni λευκίσκοι, Dweißfisch, Hesling, squa-
mis argenteis. Fortassis ad hanc speciem Sargi
pertinent, quorum uetus nomen adhuc Romæ in
usu est.

Lacertus, Γύρος, Olrupen, non habet squa-
mas. Querendum, an sit σκόμβρος, qui etiam
lacertus est sulphureo colore, exilis & longus.

Gobio κώσιος, Coben, Quappen. Sed quæ-
ren

tendum, an Coben differant à Quappen.

Salpa σάλπη, Stockfisch. Sed uerius è genere est asellorum marinarum noster Stockfisch, à quibus Salpa prorsus differt. Vocantur & Bergfisch, Rotscheren.

Ξιφίας Gladius, Suertfisch, in Dania notissimus piscis longum rostrum habens, simile rostro Ciconiæ, seu gladiolo, Cetera non multum dissimilis Lucio.

Ἄγιος, βελονή βελανός, βάρβα & ἱαχίς, piscis oblongo rostro, carne pingui, molli & delicata, Stuerlein. Abundat hoc pisce Tybiscus seu Tissa, fluiuius in Vngaria, die Teysß. Epicharmus ὀξυγύχης ἱαχίδας uocat.

Passer Plateissen, sine dubio græce ψῖττα, ex planorum genere. Sed nomen ψῖττα generale est ad Rhombum, Passerem & Solcam seu Lingulæcam. Ac inter hos excellit Rhombus piscis latus, & tamen rotundior, ouali figura.

Solea, Schollen πύνη, ex planorum genere.

Raia βάρδος, Rochen, ex planorum genere. Scabrum habet tegumentum, quo ad poliendum ebur artifices utuntur, Cognata pastinacæ.

Halec, Hering, μαύρις & σμαρίς, Hering und Buckling, quia Buckling est Halec torrefactus. Et fortassis nomen Buckling est à Græco βόακας.

φάγος

Φαγός, Aëfchen, Nam & inter eos nūme-
rantur, qui fimiles funt Labraci.

Σκάρος. Romæ Saphyrum uocant, à colore
æeruleo, mixtis aureis maculis, pulcher pifcis, &
notus in Gallia.

Σκόπτιος. Schleien, fine squamis,

Κίθαρος, à grandi capite Romanis Capo no-
minatur. Mullo cognatus eſt, quem colore & fi-
gura refert. Et habet ſub mento longas & ru-
bentes pennas, barbam imitantes.

Tinca, Stincks, ſunt uirides. Auſonius.

Quis noti & uirides uulgo ſolatia Tincas
Norit.

Fortaſſis Φυκίſες.

Cancer. Krebs. Græcæ appellationes cancroſ-
um plures ſunt, quæ diuerſas figuras ſignificant
καρκίνοſ, καράφος, ἄσακοί, & aliæ. Item ἀκρί-
δες Locuſtæ. Nequaquam enim dubium eſt,
cancrorum ſpeciem eſſe græco nomine ἀκρίδας,
latine locuſtas, ut & ex Suetonio manifeſtum eſt.
Et in Hiſpania adhuc nomen locuſta de canceris
in uſu eſt. Et cum Ariſtoteles ait, locuſtas certat
cum ſerpentibus, ac præbendere chelis tan-
quam forcipe colla ſerpentum, locuſtas intelligit
cancroſ.

Minimi.

Turdi, κίχλαι, Smerlini.

Βλέφα

ΒΑΪΜΑΙ, Elringen, Pfullen, quod nomen græ-
co ad fine Tubingæ usitatum est.

ΚΩΣΙΤΖ, kanelheuptlein. Boni saporis sunt &
in riuulis degunt frigidis.

Merula, κρόψυφος Cressen.

Aselli ὀνίσκοι, Maiores aselli, græce ὤρχοι
zanten. Minores, Callariæ, fengelein. Sed marino-
rum Asellorum multa sunt genera. Accommoda-
uimus autem marinorum piscium nomina fluui-
atilibus propter cognationem piscium ac similitu-
dinem, & quod cum recte id fieri posset, iudicio
adhibito eruditis quam barbaris uti appellationi-
bus maluimus.

DISTRIBVTIO AQUA- TILIVM.

Aquatilium alia tantum degunt in aquis,
alia ἁμαξιτῆς sunt. Illorum quedam ἐναι-
μα sunt, id est, sanguinea, quedam ἔναιμα, id
est, exanguia. ἐναιμα sunt ut pisces ἰχθῦες græ-
cis dicti. Horum sunt alij θαλάσσιοι, id est, ma-
rini, qui mare nunquam egrediuntur. Meerfisch.
Alij ποτάμιοι, qui flumina riuulosq; incolunt pro-
cul à mari, Flussfisch. Alij λιμναῖοι, id est, lacu-
stres, qui in lacubus degunt natura uel arte fu-
ctis, stagnisue aut marinis aut fluminum decursu
perflua

perfluxuq; impletis, aut remotis à mari & flumini-
bus, Seeſiſch, Teichſiſch. Alij πελαγαῖοι
id eſt, paluſtres, qui loca cœnoſa ac ſordida, &
paludes ex undatione fluminum, alluuiione, aut
torrentium impetu cauatas impletasq; amant. Ma-
rinorum piſcium aliqui πελάγοιοι ſunt, qui in
profundo maris ſummi procul à littoribus uera-
ſantur. Aliqui ἀγυλαῶδες, id eſt, littorales,
qui littora terræq; propinquas ſedes petunt ca-
ptantq; & poſſident, in mare ſummum raro ex-
currunt. Aliqui πετρεῖοι qui ad ſaxa rupeſq; &
ſcopulos uel in mari ſummo extantes, uel immi-
nentes littoribus degunt. Saxatiles.

Τῶν πελαγοίων alij ſunt Cetacei. κητώδες
qui & grandes ſunt & perfectum animal ex ſe-
mine non ex ouo gignunt. Sunt n. κητώδῃ πάντων
ζώοντων, ut Balena. Delphin φυσίτης. Alij non
ſunt Cetacei. Et horum rursus alij ſunt corporu-
lenti & Craſſi, Alij plani. Ex corpulentorum
& craſſorum genere aliqui ſunt lati ſquamoſi,
λαπίδωτοι, ut Auratæ, coracini, Aloſæ, Aſelli,
Mugiles. Aliqui Rotundi rubeſcentes. Et ho-
rum quidam ſquamis teguntur, ut mulli, corui,
quidam ſquamis carent. Planorum quos
πλατῆς Ariſtoteles & ὑπὸ αἰῶνες uocat, id
eſt, latos & paſſerinos, Alij ſunt ſpinoſi, ἀκαν-
θώδες

ῥόδες, ut Rhombi, Soleæ, Passeres. Alij Carthia-
 laginei, quæ genera χονδράκανθα σελάχη &
 σελαχῶδ' uocantur, quorum alij plani sunt. ut
 Raia. Rana piscatrix, Torpedo. Alij longi. Lon-
 gorum unum genus Aristoteles γαλέες & γα-
 λεῶδες uocat, quo mustellarum genera com-
 plectitur. Alterum priore rotundius & serpen-
 tibus similis seuum habet & pinguedinem, qui-
 bus caret prius genus, Ex hoc genere sunt Mure-
 næ, Lampetræ, Congri, Accipenser.

Alterum aquatiliū genus, quod ἁναῖμοι
 Aristoteli est, complectitur quinque genera, quo-
 rum primum habet μαλάκια ἢ μαλακόζω-
 μα, id est, mollia. Alterum μαλακόσφακα ἢ
 σκληρόσφραμα, id est, Crustis intecta & Cru-
 stata. Tertium ὀσσεῖα ἢ ὀσσεῖα, id dura,
 dura & silicea testa intecta. Quartum ἔντομα,
 id est, insecta. Quintum ζῶοντα.

E mollium genere sunt Sepiæ & Lolligines,
 quas una uoce uocant Blackfish germani ab hu-
 more atramento simili. quem habent loco sangui-
 nis. Item Polypi.

E Crustaceorum genere sunt κάραβοι locustæ,
 ἄστακοι, Astaci. καρίδες, Squille. Et Cancrorum
 genera plurima, ut μαῖαι, πάγγοι, ἡρακλει-
 νοὶ ἄγκτοι, Cancer. πιννοφύλαξ, cancer ἄραχ-

us, Cancer fluuiialis, καρκινός & ἰστᾶμιος. Ger-
mani uocant Meerkrebs, Seekrebs, Bachkrebs.

ὄστρακός τε μαλακὸν ὄστρεον varia sunt. Ger-
mani Schnecken, & testas Muschel & Schnecken-
enheuser uocant. Quaedam altera parte testam
habent, altera testæ loco scopulo adherent, ut
patella. λεπιδόστρεον. Quaedam intra testam con-
dita latent solo capite exerto, aut extremis u-
trinq;. Horum quedam sunt turbinata, ὄστρεον
βωδόν, quæ proprie Germani uocant Schnecken,
quedam non sunt turbinata.

Turbinatorum testæ helicum ductu implexum
quæ orbiculatim intortæ sunt mirabili artificio
suntq; alia marina alia terrestria, Inter marina
genera recensentur. πορφύρεα & πορφυρέα,
Purpure, καρίκες, buccina, & πορφυροειδές, mu-
rices. Horum sanguine antiquitus purpura tin-
gebatur. Germani uocant purpur Muschel.
Operculum horum oblongum, quo teguntur, κα-
χύλιον à Græcis, ac Arabibus blatta byzantia
uocatur. Purpurarum enim in Hellesponto &
Propontide ad Sestum Abidum & Byzantium
captarum præcipua fuit nobilitas. Item cochleæ,
inter quas sunt Cochleæ margaritiferae. Perlen-
mutter.

Ostrea non turbinata aut μονόβουρα sunt aut
διβουρα

δίθυρα, id est, univalues aut bivalues habent tea-
 stas, δίθυρα sunt ut Tellines, Chamæ, quarum co-
 pia est in Oceano Germanico ad Hollandiam,
 κτένες, Pectines & pectunculi, quos Germani
 proprie Muschel uocant. Conchæ propriè sic di-
 ctæ, quo nomine ostrea duabus duris & concavis
 inclusa testis indicantur, quarum aliæ asperæ,
 aliæ leues sunt, uiræq; multiplici discrimine, &
 ostrea speciatim sic nominata. Item quos μυῖδες,
 id est, musculos & μύακας, id est, mytilos, &
 σολῶδες, ἀνλούς, δένεακας, ὄνυχας, δ'αντῆ-
 λες uocant, uocabulis diuersis uni rei accommo-
 datis, quod syphonum rotundorum, sed nonnihil
 compressorum figuram unguium humanorum
 specie, tanquam de coagmentatis essent compo-
 sitæ teste unguibus representant.

ζωοφυτὰ plantis & animantibus cognatam
 habent naturam. Nam & sentiunt & plantarum
 more nutriri uidentur. Annumerat his Aristote-
 les Echinos marinos, Meerigel. ὀλοθόγρια, Verti-
 bula, τέθυα, Callos & tubera. ἀκαλύφας, Vrti-
 cas, ἀστέρας, Stellar. πωγίαις & πώγας,
 spongiar, Schwemme, & alia.

Humorem sepiarum Græci θόλον uocant.
 Germani black.

ἐντομα seu insecta sunt, ut Scolopendre ma-
 rine, hippocampus, hirudines.

APPELLATIONES

PARTIVM, QVÆ PISCIVM PROPRIÆ SVNT.

Pinnæ. πτερυγες. Alis avium proportionē respondent in dorso, uentre, ad latera, pedicem & caudæ extremum. His enim & remigunt & incitant ac propellunt sese. Differunt multipliciter magnitudine, substantia, figura, colore, numero, excessu defectuq; die federn am fisch. Pinnæ aculeatæ, πτερυγες ἀκανθώδεις. Stachlichte federn.

Squamæ. λεπίδες. Piscibus squamosis præstant, quod auibus pennæ. Schuppen.

Palatum carnosum piscibus est uice linguae. die zung.

Branchiæ βράγχια sunt uelut pili dense cernunturq; ad osseam basin, cui figura hemicyclij dispositi, & præfixi cordi, ut aqua spirituq; qui aquæ permixtus est acceptis redduisq; cor ipsis inclusum refrigerent. Balenæ his & Delphini carent, quod fistula ad pulmones pertingente spirant. Fistulam illam Aristoteles nominat ἄνω λὸν φλέβου ὡδὴν. Branchias germanorum aliqui uocant die fischbohren, aliqui den kampf. Saxones den Geckel.

Spinæ

Spinæ. ἄκρωθαι. Gretten in den fischen:
 Carnem fulciunt & continent. Ideo osibuster-
 restrium animantium proportionē respondent.
 Carent his beluæ marinæ & carthilaginei pi-
 sces. Hispinarum loco carthilaginem, Ille ossa
 habent.

Chele. χηλᾶι. Brachia Cancrorum denti-
 culatis forcipibus, quarum inferior mobilis supe-
 rior immota, die Krebscheren. Reliquas partes
 pisces cum animantibus cæteris communes ha-
 bent.

Piscium alij generant, alij non. Qui generant
 aut animal edunt uocanturq; ὠτοκοί, aut oua,
 & nominantur ὠτοκοί. ὡὰ ἰχθυῶν, id est,
 oua piscium uocantur germanice der Rogen. In
 genere ὠτόκων qui oua habent pisces foemelle
 sunt, qui semen candidum lactescens, sed crassum
 compactumq; mares. Semen hoc Aristo-

teles θόζον nominat. Germa-
 nice uocamus die
 milch.

APPELLATIONES PARTIVM IN PLAN- TIS.

Planta φυτὸν, Gewächs.
 H 3

Planta

Plantarum species.

Arbor. δένδρον, est quod à radice, caudice simplici, ramosum, nodosum & surculosum assurgit, βάλαν.

Frutex, δάμνος, stauden, quod à radice caudici multiplici ramosumq; se attollit, θαμνιονος steudlein,

Suffrutex, σπύρανον herba est uel arboreascens uel fruticescens pluribus lignosisq; surculis, ex radice uel simplici caudice prodeuntibus, minutis folijs, cætera herbæ similis.

Herba, πῶα, βοτάνη kraut, quod sine caudice à radice foliatum prouenit, semenq; caule fert. ποάγιον, βοτάνιον diminutiva.

Plantarum partes,

Plantarum partes ut animantium alie sunt ὁμοιομορφές, id est, similes, alie ἀνομοιομορφές, id est, dissimiles.

Similiares distinguuntur in siccas & liquidas, siccae sunt hæ.

Nerui, ἵνες, Adern in beumen vnd kreutern, oblongi sunt, continui fissiles, insociabiles, infæcundi.

Vene, φλέβες, cætera nervis similes sunt, sed maiores crassioresq; & ramos, & humorem habent.

Caro, σὰρξ, diuidi omnibus dimensionibus potest,

test, ut terra, quæq; terra constant, estq; inter
neruos & uenas media.

Liquidas partes Theophrastus ὑγρὰ vocat,
Species earum sunt ὀποί, χυλοί, & δ' ἄκρα,

ὀποί, sunt liquores crassi & lenti, qui uel ex
incisa radice, uel caule secto, terebrato aut ca-
strato effluunt sponte.

Liquor qui ex radice emanat, ὅπρς ριζίας, al-
ter ὀπὸ καυλιάς dicitur, der safft der von sich
selber heraus dringet.

Χυλοί, succi sunt, qui colliguntur ex plantis
totis, aut earum partibus concisis, tuis, & tor-
culari, manu, uel aliter expressis, aqua interdum
uino, alio uel liquore asperso. Ausgedruckte safft,
horum alij sunt οἰνώδες uinei, alij μελιτώδες
mellei, alij ἐλαιώδες oleaginei, alij δ' ριμῆς an-
cres, alij πικροί amari, alij οξύς acidi, alij ὑδα-
ρῆς aquei.

Δάκρυα, lacrymæ, humores sunt qui ex plan-
tis nec incisis, nec contusis compressisue, sua spon-
te exudant ac destillant, uel solis calore educti,
uel copia expressi, uel ab ipsis arboribus aliqua
occasione debiscentibus expulsi, Suntq; uel ὑδα-
ρῆς, id est, aquæ quæ in κόμμι, id est gammi
concresecunt, uel πιττώδες, id est, picæ quæ in
ρυτίλω, id est, resinam coeunt, harq;. At resina-
rum differentie multæ.

Disimiliarum partium alie longo perdurant
tempore cum ipsis arboribus, uocanturq; ἄνθη
νίκαι, alie ἐπέτφαι, annuatim renascuntur. De
fluunt ac pereunt in aliquibus plantis omnes, in
quibusdam uero quedam etiam permanent, &
perennes sunt.

Ἐπέτφαι, sunt folia, pediculi, flores, fructus,
semina.

Folia, φύλλα, φυλλόγρια, Bletter, constant hu-
more & carne.

Folia uitium, ὄνικα, Rebenbletter, pampini
latine idem ἐλασμάτια.

Folia ficuum, θρία, Feigenbletter, unde trium-
phus à θρία & ἀμβύω.

Folia aut integra sunt, aut incisa, uel in ex-
tremis oris que cernata, uel in ambitu que ser-
rata à similitudine dentium ferre dicuntur. Sunt
& alia laciniata, alia fimbriata.

Pediculi, petioli, πόχοι, quibus ex ramulis
folia fructus aut flores dependent, Stilchyn an
blettern, fruchten und bluten.

Flores άνθη & ανθήματα, germani distin-
guunt flores arborum & herbarum peculiaribus
uocibus. Illos blüt, hos blumen, nuncupant.

Iulus, ἰσλος, flos auellane compactili callo
racematim coerens uelut praelongus uermis,
Häselftaudenblüt.

κύτφα

κῦμαζος, græcis duo significat uel quod ob
longa & rotunda specie tumidum, ex picearum
& roborum ramis dependet, latine pannicula,
uel quod ex ramis nucum, roborum, picearum,
squammatis compactili callo prominet, latine
Nucamentum, zwelsche nus blüt.

Iuba uel pannicula, lanosa densa & cauda
modo propendens coma, in milio, panico, arundine,
νε, ἀνθήλη.

Coma, κόμη, quicquid crinium modo summa
ramorum uel colliculorum exornat.

Umbella, Muscarium, σκιαδίου der Dolder
flores suut in summo colliculo confertim in ora
bem dispositi, suis innixi pediculis.

Corymbus, κορύμβος, κορυμβία, κορύμβιον
proprie significat hæderarum uuas, quas acini
uelut in orbem conglobati rotunda specie con
formant. Transfertur deinde ad flores & fru
ctus aliarum plantarum, hæderarum uuis figura
similes,

Calyx, folliculus est, quo flos primum, mox
seminis fœtus continetur & clauditur.

Stamina, filamenta ex imo floris sinu prode
untia, quæ florem sustinent.

Apices sunt staminum extrema, seu pro
prie flores. In rosis enim, lilijs, uiolis, & alijs
quibusdam florem proprie uocamus, medium

illud croceum, quod staminibus insidet.

Muscus $\mu\upsilon\sigma\kappa\omicron\varsigma$ $\beta\epsilon\upsilon\omega\delta\epsilon\varsigma$, uillosa flosculorum congeries, ut in ligustro.

Verticillum, $\omega\omicron\nu\delta\iota\upsilon\lambda\iota\omicron\nu$, florum aut etiam foliorum ambitus circinatus, qui colliculos uel ramulos herbarum coronat.

Pappus $\pi\alpha\pi\pi$ Θ , decidua lanugo, in quam flores nonnulli conuersi delabuntur ac dissipantur.

Vaguet, $\omicron\nu\chi\epsilon\varsigma$, in rosis Θ foliatis floribus $\alpha\mu\epsilon$ foliorum partes, quibus in capite suo coherent. Dioscorides, $\delta\epsilon$ $\delta\epsilon$ $\chi\upsilon\lambda\iota\varsigma\epsilon\alpha\upsilon$ $\tau\alpha$ $\alpha\omega\alpha\lambda\alpha$ $\alpha\omega\omicron\phi\alpha\chi\iota\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$ $\tau\omicron\nu$ $\omicron\nu\chi\alpha$ $\kappa\alpha\lambda\omicron\mu\upsilon\omicron\nu$, $\epsilon\pi\omicron$ $\delta\epsilon$ $\tau\omicron$ $\lambda\epsilon\upsilon\kappa\omicron\nu$ $\tau\omicron$ $\epsilon\pi$ $\tau\omega\upsilon$ $\phi\upsilon\lambda\omega$.

Fructus, $\kappa\acute{\alpha}\rho\pi\omicron\iota$, Frucht, differunt $\kappa\acute{\alpha}\rho\pi\omicron\varsigma$, $\omega\epsilon\gamma\mu\alpha$, $\pi\epsilon\gamma\mu\acute{\alpha}\rho\pi\iota\omicron\nu$ Θ $\omega\upsilon\gamma\mu\omega$.

Fructus, $\kappa\acute{\alpha}\rho\pi\omicron\varsigma$ uel generatim significat totum, quod pulpa nucleo Θ semine constat, uel speciatim Θ propriè in arborum fructibus, inimum illud nucleo inclusum, quod cum maturuit, terre insitum plantulam arbori sui similem genere ac procreare potest, der rechte kern in der beum fruchten.

Semen, $\omega\epsilon\gamma\mu\alpha$, in herbis est, quod in fructibus arborum Θ fruticum $\kappa\acute{\alpha}\rho\pi\epsilon\varsigma$, Samen,

$\phi\upsilon\tau\epsilon\upsilon\tau\eta\gamma\iota\alpha$, semina ad sationem electa Θ destinata. Samen zur sat.

Fructus

Fructuum alij uocantur δῆροται, latine poma.
Obst, ut mala, pyra, pruna, damascena, quæ κατὰ
τὴν pulpa tota molli & ad esum idonea exterius
circumdatum habent, seu quæ foris habent, quod
edendo est, intus durum includunt. Alij ἀγκό-
στα, latine Nuces, Nuß, ut iuglandes, auellanae
castaneæ, quæ duro foris teguntur putamine, in-
tus habent quod esui est.

Nucleus πυλὼν est uel operculum, quod fru-
ctum continet, munit & tegit, uel totum cum fru-
ctu inuolucrum. Estq; in pomis δερματινὸν ut
in malis putamen coriaceum interitus fructum
contegens, In acrodrijs ξυλῶδες ut in auellanis
& glandibus, putamen ligneum, Nussschalen.

Præcoces fructus, πρόωγοι ἢ πρόδρομοι
καὶ πρόχειροι fruezeitige frucht.

Fructus fugaces, ὥσπερ καὶ πρόχειροι, qui non se-
runt statem, nec ad reponendum sunt idonei,
ὥρῳ enim græci tempus uocarunt, in cuius me-
dio κ/ωρ, id est, Syrius oritur, quo tempore su-
gacium fructuum alij declinant, alij in uigore
consistunt, alij ad uigorem accedunt.

Fructus, ἐπίτεροι qui durant ad annum se-
quentem, annui fructus.

Περὶ καὶ ἑξωτερ. pulpa uocatur exterior in o-
mnibus fructibus, pomis et acrodrijs, Estq; in alijs
mollis

mollis ἔστω δὲ μοῖ, ut malis, piris, cerasis, ar-
meniacis, prunis, In alijs dura, ἔ uelut lignea ut
auellanis, glandibus. Ideo alia est πέπωνσις τοῦ
καρπῶδ, alia πριμαρπίδ. Maturatur fructus
cum eam assequitur perfectionem, ut procreare
simile possit, πριμαρπίον maturatur cum ex
permixtione optima materie terree ἔ aquee
à calore subacta ἔ extenuata acquirit tempe-
ratam substantiam, conuenientem corporibus no-
stris, ἔ idoneam nutritioni. Et confert ut Theo-
phrastus inquit, ἢ μὲν πέψις τοῦ πριμαρπίδ
πρὸς τὰς ἡμετέρας τροφὰς ἡδὲ τοῦ καρπῶδ
πρὸς ὕλην τὴν καὶ διαμονὴν τῷ δένδρι.

Acini, ῥάγες, uuarum fructus, Weinberen.

Grana, semina proprie leguminum ἔ frus-
tum, ἔ quorundam etiam sed minorum fructu-
um, græce κόκκοι Korner.

Legumina. ὠπρία, χέδροπα, genus, quo-
rum semina siliquis includuntur. Ut pisa, orobi,
fabæ, lentes, uel etiam uasculis, ut sesamum.

Fruges σίτηα, δρυίτεια ὠπλατα, ge-
treidich, quarum semina continentur spica, ἔ
muniuntur aristis. Ut hordeum, triticum, olyra.

Baccæ, fructus rotundi, parui, duriusculi, nullo
foris ligneo ἔ duro operculo inclusi, ut iuni-
peri, lauri, myrti, corni, græci non discernunt à
granis generali uocabulo, sed singulis propriis

tri-

tribuunt. ἀρκυυθιδας, baccas iuniperi, & achola-
derbeeren, δ'αφιδας, baccas lauri, Lorber be-
ren, μυγτα. Heydelbeeren, nominant.

Pillule σφαίρια, fructus rotundi, grandiores,
putamini inclusi ligno, ut galbuli seu fructus cu-
pressi.

Corymbus, κόρυμβος κορύμβιον, κορυμ-
βία, uua hædere ex acinis dense confertimq;
circa scapum in sphaera figuram conglobatis.

Lanugo innascens fructibus, ἐπιφυσίς λαχ-
νώδης. Hec in castaneis, cotoneis, persicis cerni-
tur:

ῥέονια seu perennes partes perdurant cum
plantis. Suntq; earum aliæ Integrales, aliæ inte-
gralium partes:

Integrales sunt Radices, cauli, rami, surculi.
Radices, ῥίζαι, Wurtzeln, quibus alimentum
attrahunt p'antæ, & terræ coherent.

Nuclei uel spicæ, γέλας, γέλυθες, ἄγλι-
θες, aglidia grana, bulbi, ex quibus allij caput com-
positum est, die zecnam knoblauch.

Bulbi βολβοί, rotundæ radices siue ex pluri-
bus capitulis coagmententur, uno omnes follicu-
le ambiunt, siue distinguantur.

Fibræ uel capillamenta tenuissimæ & extre-
mæ radicum particule, extenuatæ capillorum in-
star zesperlein, ίνες & ῥιχες. Vnde radices ίνώ-
δης & ῥιχωδης. Cirri

Cirri fibræ sunt crispatæ & intortæ.

Caules καύλοι, supra terram simplices assurgunt, in easq; alimentum defertur. In arboribus στέχνη, latine stipites & caudices, germanice stemme uocantur. Caulis uocabulū herbis inhæsit.

τρεμόν, truncus arborum nidusius habens multas ἐκφύσεις.

Scapus uel Tyrsus, caulis styli modo in altum erectus, ein gerader stengel, scapus dicitur ducta similitudine à scapis columnaribus. Thyrsus quod in uirgulæ uel teli rectitudinem assurgat, πύσθος.

Striæ, ῥινοχῆι, sunt in caule rectæ, eminentes, & oblongæ lineæ, secundum caulium exportæ rectitudinem uelut plicæ, falden. Striatus caulis, gefaldener stengel. Strigiles caua canali culiq; intra plicæ.

Rami, ἀντέμορες, qui caudice uelut fisso in omnes partes multiplices sparguntur, die Esthe.

Termites rami cum fructibus auulsi.

Frondes rami cum folijs uel floribus decerpti.

Sarculi, κλάτοι, κλάπισκοι, qui ex ramis simplices atq; indiuidui oriuntur, quale præsertim annotinum germen apparet, zweige, schoffe.

Ramuli herbarum, κλώνες, κλώνια, κλώνάκια, καύλια, colliculi.

Περίσσειες rami palmarum, qui in Iohanne

υποκαίν

uocantur Βαίᾱ, unde factum nostrum *Baiden*, *li-*
tera, & in μ mutata.

Ῥαμίαι, rami Olearum.

κράδαι, rami ficuum.

ἐπιώνη, ramus oleaginus qui gestabatur à pe-
tituris pacem uel inducias.

Soboles, annuum germen, Ῥάλος, Ῥάσος,
iargeðwachs, *iarschoßlein*.

Minutissimæ surculorum particulae instar
capillorum tenues, κάρφοι, festucae latinis.

Cymæ, κύμα, scaporum delicates tene-
rioresq; colliculi, qui à prima sectione exeunt,
Sed magis proprie illud, quo flos ad semen clau-
ditur, κυμάτω aliàs.

Stolones Ῥαυτάδες, uel Ῥαυτάδες, inua-
tiles ex radice, trunco, uel ramis prodeuntes sur-
culi: *Nebendwachs*.

Virgæ Ῥαυτοί, Ῥαυτοί, colliculi recti &
oblongi, ruten, quales sunt corylorum.

Nodi, ὄζοι, Esthe, articuli ramorum cum trun-
co uel inter se. Theophrastus, ὡς ὁ ὄζος ἐπ' τοῖς
ῥαυτοῖς, οὕτω ὁ ὀφθαλμός ἐπ' ἀμπελῶ ἢ ἐπ'
καλάμῳ γόνυ.

Geniculum, γόνυ der knod an eim halm, oder
rhor.

Internodium inter articulos uel genicula mediū.

Ale, μάχχαι, caui inter caules & ramos
anfra-

Anfractus, ex quibus sinuatim noua proies
egreditur.

Oculos primum germinationis argumentum
in surculis knospen.

Spinæ, aculei, ἄκανθαι, in ramis quibusdam
stachel, dornen.

Culmus ἀνθήξ, κάλαμος, καύλος, κῶ-
λον, unde σίτηρα μονόλωλα, caulis frugum,
der halm.

Spica, spicum, ἑρ spicus, σάχυσ, æhr, korn-
æhr.

Mutica spico quasi mutila, σάχυσ κόλοβος,
æhr one spitze.

Granum, Kornlein, κοκκός.

Gluma, grani theca, seu folliculus quod de-
glubatur dicta, heutlein, hulschen

Arista, ἄκρον, apex, spica, quæ ut acus tenuis
eminet ex gluma uel folliculo, das spitzelein an der
æhr.

Erit, quod in summa spica et iam matura mi-
nus est grano.

Vruncum, quod in ima spica ad summum
straminis culmum grano minus est.

Paleæ, ἄχυρα, gramina resecta cum spica.

Acus, σκύδαλον, Spreu.

Metæ, θωμοί, manipuli in quos colliguntur
demisse segetes, Garben.

Integræ

Integralium partes sunt matrix, lignum, cortex.

Matrix μῆτρα, quam κασιδιάρ alij, alij μῆσαλον uocant, in medio ligni residet, & tertium à cortice continetur, uelut in ossibus medulla, Marck, constat carne & humore, cognata huic ὑπορίων.

Lignum, ξυλόν, neruo constat & humore, interdum & carne.

Cortex, φλοιός, est pars ultima à subiecto corpore separabilis, uelut Crusta quædam ad tegendum data. Constat neruo, humore & carne. Rinde. Quod corticem exterius in summo uelut ambigens membrana cingit, tunica dicitur, χιτίον.

Liber, cortex interior, qui ligno propius & pertinacius inheret, tafer.

Thallie, ceparum tunica. die hautlein umb die zwibeln.

Folliculi, φύσκια, qui granum uel semen continent inuolutum.

Siliquæ, λόβοι, quæ uel semina herbarum uel grana leguminum includunt. schotlein.

Valuuli, κιβώρια & κιβώτια, uel generaliter κελυφάι aut κελύφη aut λέμματα, qui fabarum & leguminum cæterorum grana immediate continent.

Vascula, ἀγγεῖα, quæ sesami & papaueris
semina continent

Membrane, ὑμῶν inuolucra tenuia grano-
rum seminum & fructuum membranæ similia. In
frugum granulis proprie ἐλυσσά, latine glumæ,
uocantur.

Putamina κεφύλη uel κελύφαι & λέπκ.
Cuticale quæ περιάσπιον tegunt uestiunt &
inuniunt, schalen.

Aculeatus Cortex, λέπ & ἐχνοφῆς, ut
castanearum.

Vagina, inuolucrum, quo condiuntur ariste
priusquam prodeunt.

APPELLATIONES PARTIVM VITIS.

Vitis Viniifera, ἄμπελος οἰνοφόρος & wein-
stock.

Labrusca, ἄμπελος ἄγρια, & wilderwein-
stock.

οἰνάρη, flos labruscæ, cuius fructus non ma-
turefcit.

Sarmenta, Φεγγωα, prælongæ uitium uirgu-
le, in quas uitis luxurians spargitur, holz.

Palmites, κλήματα, in uite uocantur, qui in
arboribus surculi, quotannis emergunt ex stirpe.

¶ in gemmas abeunt, quæ deinde in modum plæ-
marum humanarum uirgulas quasi digitos ex-
promunt, κλήμαδια uiticuli, κληματίδες.

Palmes pampinarius, qui ex duro prouenit, et
primo anno plerumq; frondem sine fructu affert.

palmes fructuarius, ex anniculo palmitē pro-
creatur, fructuq; protinus induitur.

Annui palmites. τὰ νέα κλήματα ἢ βλα-
στήματα, iahr gewechs.

Nonelli palmites, νέα ἢ νεάνισκα κλήματα,
latine malleoli, rebenschoßlein, μοχεύματα.

Flagellum uitis maior.

Palmes maior uitis ex qua uua nascitur.

Capreoli, clauiculæ, ἐλικες, coliculi sunt,
quibus quasi manibus proreptans uitis admini-
cula apprehendit. Hederæ ramuli quibus se ful-
cris implicat, τὰ ῥίχθα, uocantur.

Pampini, folia uitium, ὀινάρα, βλαστοί, ὁ
βλαστήματα, rebenbletter. inde βλαστολογία.

Propagines, uetulae uites suppressæ per in-
flexos arcus, ut ex una plures emergant. πρᾶ-
φυσίδες.

Gemmæ, ὀφθαλμοί, in ipsis uelut sarmento-
rum articulis relictæ, uuam orientem ostendunt,
die augen.

Lachrimæ, δάκρυα, ex gemmis guttæ extil-
lantes. threnen.

Vue, σαφύλα, Trauben βότρυες & uvas &
scapos seu racemos significant.

Racemus uel Scapus acimos uuarum susti-
nens βότρυς uel τὸ στήγιον der trauben stengel
apud Theophrastum, quod mendosum esse cera-
tum est, & legendum pro στήγιον βότρυος,
ut ex Galeno constat,

Acini, ῥάγες. Zweinbeeren.

Nuclei acinorum uel Vinacei γίγαρτα, die
kern in beeren, ut κερχάμιδες in ficibus.

Folliculi acinorum, σέμφυλα, Zweinhulsen.
χιτώνες, & σκεπασματα ῥαγῶν, id est, tu-
nicæ uinaceorum.

Vue alba, βότρυες λευκοί, blanche Trauben.

Vue nigra, βότρυες μέλαινες, roth Trauben.

Vallum Vinaceum, χαράξ τῷ κλημάτῳ
Zweinleenen.

Solidæ uuarum reliquie, quæ musto expresso
supersunt in torculari, σέμφυλα & βεῦτια, die
hulsen sampt den kernnen.

Vue acide, σαφύλα ὀξεία.

Austere αὐστηρά.

Dulces γλυκεῖαι. Vinose ὀνῶδες, quæ tem-
peramentum inter reliquas medium habent, cum
dulces calore, acide & austere frigore excedant,
ἡμάρτες, uue immature, uulgo agrestæ, vn-
zeitige Zweinbeeren. ὡμάρτιον, succus earum.

σαφίς,

σαρκίς, uel ἄσαρκίς, Vua passa, Rosynen.

σαρκίδες ἐκγεγαυρῶσιν, uue passa à uinaceis purgata.

Mustum, Most. γλεῦκος.

ἀείγλευκες, uerbaltener, unuergorhener
Most, mustum quod non deferbuit.

Passum, γλύκος, ex uuis sole siccatis, in area,
aut in sarmento torrefactis exprimitur.

πρότροπον, Mustum, quod sponte ex pendentibus adhuc uuis destillat.

Sapa σείραλον uel ἑψιμα, fit musto ad tertiam usq; partem decocto, duabus consumptis.

Defrutum eodem ad dimidie, Carœnum uero ad tertiæ partis consumptionem decocto paratur.

Lora, δευτορίας, ἢ σεμφυλίτις, ἢ πότιμος dilutis & maceratis aqua uinaceis post expressionem musti fit, lauer.

ἄσυναμος, ficticiu uinum, quod albi musti duabus partibus, una aque effusa decocta ad aque consumptionem conficitur.

ὀμφακίτης, uulgo agresta.

Vinum melitites, οἶνος μελιτίτης, ex austero musto cum melle decocto paratur, Weinmedt.

οἶνόμελι, ex austero uino cum melle decocto fit Mulsum, Medt aus Most.

Aqua mulsa, μελίκρατον, aqua pluuia est

uel fontana melle permixta, quæ cum uel insolata
uel decocta reponitur, ὕδρo μελι uocatur, Medt.

ὄινος, uinum natium, ðwein.

ὄινος λευκός, album uinum, blaucker wein.

ὄινος μέλας, cui saturata rubedo. uel ad nigredinem etiam uergens. rotter ðwein.

ὄινος κίττος, uinum giluum, gelbichter ðwein.

ὄινος ἐρυθρός, rubrum uinum, lichtroter ðwein.

APPELLATIONES

FRVGVM, LEGVMINVM, OLE

RVMETFRVCTVVM VSI

TATORVM.

FRumentum. σίτος.

Fruges, σίτρα Getreidich.

Triticum, τριττός, ðweitzen, panes triticei, ἄρτοι
τρίτωνοι. ðweizenbrot.

Galenus panes qui fiebant ex tritico, distinguit bonitate, candore & præstantia farinæ triticeæ. Fiunt autem dum triticum in molendino pinsitur he differentie.

Primo integrum triticum ex eminentiore Cistella circumacta lapidis molaris impulsu decidens per medium lapidis foramen in pauimentum teritur ac pinsitur, quod de comminuto agitatione lapidis attritoq; tritico in tenuissimum puluerem & uolatilem euolat, lapidique & parietibus.

hus adherescit Pollen est seu farina Volatilis
 Græce γῆις, Staubmeel. Reliquum in incernicu-
 lum, quod per uocatam cistam extenditur longo
 decluiq; ductu longioris sacci forma, propellitur
 impetu continuo. Eo impetu de commolito triti-
 co farina optima per incerniculum secernitur &
 excutitur. Pars grauior & præcipua ac nobi-
 lissima sed tenerrima & delicatissima, pondere
 subsidens fundum petit. Leuior effertur & euo-
 lat, atq; ad latera sese cistæ applicat. Illa pro-
 prie uocatur Siligo, ut ex Plinio manifestum est,
 Græcis latina appellatione σιλίγυις, das beste
 zweisse meel, ex hac fiebat panis σιλίγυις, id
 est, Siligineus. Hæc Flos Siliginis est Plinio. Non-
 dum extenuata pars tritici, quæ ob crassitiem an-
 gustos incerniculi poros non perrampit, egesta
 motu eius agitationeq; per orificium amplius ex-
 cidit in pauimentum. Inde collecta crassiore
 Cribro transfunditur ac ceu colatur purgatur
 quæ à furfuribus crassioribus, quorum origo à
 contritis est tritici folliculis, quæ glumæ latinis,
 græcis λέμματα dicuntur. Quod hoc modo
 detractis & cribro separatis furfuribus crassio-
 ribus colligitur, & constat similagine crimno &
 furfuribus tenuioribus, usurpabatur à ueteribus
 ad panificia. Conficiebant enim ex eo panem
 quem συγκόμισον & αὐτόπυρον nominabant.

Vocabatur autem *αὐτόπυρος* & *αὐτοπυρίτης*, quasi *ὅλ* & *αὐτὸς ὁ πυρὸς*, quod tota tritici farina constaret, à qua nihil detractum erat præter fursures crassiores. Et *συγκόμις* & *στ* quod de omnibus coniunctis similagine scilicet crimmo & fursuribus tenuioribus pararetur. Græci enim initio non Similaginem à Siligine separarunt, Sed eam postea consuetudinem à Romanis acceperunt cum appellatione ipsa. Separatis ergo fursuribus crassioribus reliquum denuo immisum in molendinum, secundo molitur, excussumq; in cerniculo remittit rursus tum farinam crassiorem decumbentem in cistæ fundum. quæ priori bonitate multum cedit, uocaturque Similago latinis, Græcis *σείμια λίγ*, tum tamen pulvisculum euolantem, qui est flos similaginis latinis, Græcis *παιπαλί*. Sed Græci ueteres, qui ut dixi non tam accurata diligentia primam farinam ab altera separatam seorsum exceperunt, sed miscuerunt utramq; *σείμια λίγ* uocarunt generaliter farinam tritici utramq; primam secundaq; tritura expressam, *παιπαλί* florem farine utriusq; & siliginis & similaginis. Recentiores græci Romana consuetudine distinxerunt. Vocaruntq; panem ex semidali quæ siligine deterior erat confectum *σείμια λίγ*, ut latini Similam & Similaginem. Retine-

mus

mus & nos Romana discrimina & Siliginem uocamus, das beste weisse meel. Similaginem das mittel meel.

Similagine separata de reliquo quod in pauiumentum eijcitur & Crimno ac tenuioribus furfuribus constat, Græcis etiam aliquid farinæ habebat, conficiebant Græci panem, qui πίτυγας, id est, furfuraceus dicebatur, Kleyenbrod. Furfures enim, πίτυγες, nobis sunt Kleyen. Sed plerumq; tenuiore illud ipsum transfusum Cribro perpurgabatur denuo, ut hodie quoq; Excidebat autem quod κζίμυον uocabatur. Gryeß. Detinebantur & hærebant in Cribro Furfures tenuiores, Kleine kleyen. Quorum in Emplastris usus est. cum Crassiores ad saginandos usurpentur porcos. Hec ex ueteribus Galeno Plinio & alijs rectè distinximus.

Panis fermentatus, ἄρτος ζυμῆτης, uel ὄζορ, cui fermentum miscetur, gesewert brot. Est enim ζυμή, fermentum. Sauereteig.

Panis non fermentatus, ἄρτος ἄζυμος. Vngesewert brott, ut placentæ sunt. quarum genera à Græcis πέμματα uocantur. Est et speciei nomen πένμα, & placentas significat ad cornuum similitudinem formatas, quas hodie horner uocamus. Olim Apollini sacre fuerunt.

Melicerides. Melitomata. μελικερίδες. Honig

nighkuchen. Pfefferkuchen. οἱ πλακῶνα. Placentæ. Differentiæ harum plurimæ ueteribus fuerunt in usu.

οἱ ταγῶναι ται ἢ τηγάνι. Taganite à patella & sartagine denominati Pfankuchen. Cum μασα, quæ φραμα est paratum ex mixtis farina oleo lacteue aut aqua, aromatis aspersis quandoq; aut condimentis alijs, frigitur in oleo feruente aut butyro aliaue pinguedine. Inde ὠα, ταγῶνα, quæ fixa latinis appellantur.

στῆλαι ἢ στῆλινιοι. Placentæ, tortiles uelut strijs & canaliculis plicatæ, Sprutzkuchen.

ἀκρηπίδες, Kreplein. Conduuntur uarie eclegmatis. Maza enim extensa ac dilatata, & cum impositis condimentis complicata, conficiuntur.

ἐγχυτος. Streublein. Fiunt pulicula liquida infusoria transfusa in sartaginem feruenti pleuam butyro, in quo mirabili ductuum implexu conuoluuntur & crispantur.

οἱ δελτα. Spieskuchen. ὅτι ὡς δελτακοῖς στῆλαι, quia uelut carnes ad ignem assantur circumactio ueru, cui aut liquidior pulicula affunditur, donec calore durata inherescat ac percoquatur, aut maza allinitur & adigitur manibus.

οἱ ὄσζυον. Eyerkese. Coquuntur in testis.

Ἱρπια. ex melle & farina placentule. Hypo-
pen. Liba ab his non multum differunt.

ρῥυματα, Rhyemata. Liquida pulticula fer-
reis laminis & ignitis affusa, compressaq; &
leuiter assata fiunt. Eisenkuchen.

ἄμυλσκοι. Ex farina triticea & lacte pa-
rantur.

Lagana. Plintzen, τυρολάγανα casco ad-
mixto fiunt.

Βολυτίνοι. Fladen. ut constat ex Athenæo.
Germanica uox Græcæ cognata est, sed uidetur
esse ex Latina uoce facta. Fladen quasi oblata.

Libi circi. Kuchen. Placentæ in rotunditatem
planam & circinatam expansæ, conspersaq; ouis
caseo butyro, aut similibus.

Coctura multum differunt placentæ. Frigun-
tur enim aliæ, φρυκτοί. Aliæ coquuntur, ἐφθοί.
Aliæ assantur, ὀπτοί. Aliæ uelut ustulantur aut
torrentur in craticula, ἐπαιθεῖσκιτοι πλακῆν-
τες.

Panes non materia tantum, sed & locis in
quibus assantur, ac modo assationis & forma diffe-
runt.

Discrimina à locis, in quibus assantur, ac mo-
do assationis sumpta sunt.

Furnarij panes seu testacei, κλιεάνη. In
furnis mediocriter æstuantibus, more horum
tempora

temporum assabantur. Erant hi optimi omnium
et concoctu facillimi.

ἱπνίτι in minori furno concoquebantur.

ἔγκυφτοι in calidos defodiebantur et con-
debantur cineres donec percoquerentur. Sic di-
cebantur, ὡς ἂν τῷ κτλ τῷ τέφρα ἐγκυβέν-
τας ὁμῶς. Appellatio hæc non raro in sacris
est literis repetita, quia in sacrificijs hoc modo
cocti panes proponebantur. Aschenbrot.

Vulgo uocati Panes Martij ἔγκυφτοι dici
possunt, qui infra supraq; candentibus carboni-
bus ærea lamina interposita leuiter uelut indus-
rantur, Marcipan. Est autem hoc nomen factum
ex maza et pane. Marcipan, id est, Maza pa-
nea.

ἐσχάρι in Craticula assabantur aut foci pa-
uimento ad eum modum ut totum exterius ceu
indumentum duraretur in Crustam, interius
molle laxumq; fieret. Pastecten.

Forma differunt, ῥόγχοι, figuram Rhom-
bi habent, zwecken.

κόλλικες, plocamorum instar plexi panes, et
rotundi. Geflochtene koletschen.

κόλλαςοι. Panes quadrangula figura ad si-
militudinem plexus plocamorum formati, zopff-
Spire. Crustule. πῆσαι. Pretzeln.

σίφα

σέφαναί & σέφη. Panes coronæ modo re-
tundi atq; in medio perforati, Ringe.

ἄψάγαρος, superior crusta panis, die obere
rinde oder krost am brott.

ἐψαδία. inferior crusta.

ψαδύγια & ψρύματα, brosem, grumen in
brott.

A Varrone tritici Species recensentur, Silio
go, Robus, & σιτάριον, quod et τριμύλον, id est,
trimestre dicitur. Tritici nomen significat idem
quod tritum ex spinis. Virens triticum χιθρία.

Halica natiua, χιθρία, tritici genus est
errant qui eandem cum farre ueterum esse cen-
sent.

Halica facticia ex Zea fiebat, ut Plinius re-
fert.

Amylum, ἄμυλον, ex eo appellatum est quod
sine mola paretur, Krafftmeel, Ex tritico fit tri-
mestri.

Hordeum, κριθά. Gersten. Est quoddam hor-
deum ἐξ ἑσίοιχον seu canterinū. Sechs schichtig
gersten. Grosgersten. Quoddam δίοιχον seu
galatium. zweischichtig, kleine gersten,

Panes hordeacei, ἄζδοι κριθῖνοι gerstenbrott.

Ptisana dicta ἄπό τῆς πίσης, quod hordeum
ex quo fiebat tundendo degluberetur & suo exu-
eum cortice conderetur ad usum. Tundebatur
enim

enim non molebatur, donec deponeret glutinam
hodie pro Ptisana utuntur hordeo mundato
quod aliter alij expurgant & apparant. Gera-
stenmeel. Conficitur hoc modo ex auena, quod
uocamus heberumeel.

Ὠρα λυσις, id est, crudum lomentum, Plinius
ubiq; farinam hordeaceam est interpretatus. Fit
ex crudo hordeo in farinam contrito.

Polenta. Græce ἄλφιτον, quæ uox quandoq;
simpliciter farinam hordeaceam, quandoq; po-
lentam significat, fit ex hordeo aqua asperso non
nihil siccatoq; & mediocriter frixo ac tandem
tuso uel commolito. Gerstengraupen.

Olyra, Rocken. Korn. Olim arinca, quæ uox
ex germanica appellatione orta est, Crastior
farre.

Panes olyracei. ἄγτοι ὀλυγεῖνοι. Rockenbrot.
ζεῶπιζον olyra præstat. Mediam enim in-
ter zeam & triticum habet substantiam, quod
& nomen indicat. Kern.

Bryza. Βγίζα, quam in Thracia sic nomina-
tam Galenus refert, deterior zea. Plinio Secale:
Schwarzer rocken.

Farrago. Plinio ex recementis farris præ-
densa scribitur.

Far. Adoreum. Italiae notum. Olyra non dissi-
mile sed præstantius.

Typhæ

Typha cerealis seu frumentacea. τῦφῃ triticeo
io similis colore & densitate. Staudenkorn.

Spelta, ζεῖα & ζεῖα. Spelten, Dinkel. Duum
generum est. Una cui grana in singulis membra-
nis gemina δίκωκος nominata. Altera cui simi-
plicia sunt.

Tragos. Hammeikorn. Vulgo hordeum depia-
latum.

Avena. Ἀῶμος. Haue. Notum frumentum,
quo pascuntur equi, conficitur ex ea & ptisana.

Ireo Cerealis uel Erysimum cereale. Vulgo
uocatum frumentum Sarracenicum, Heydnisch-
korn. Quidam à triquetra figura trigonum ap-
pellant.

Milium. κέγγος. Hirsen. Semen gerit in lon-
gis & turbinis figura fastigiatis panniculis tea-
res & pendulum.

Milium Indicum. Vulgo Türkischer Weizen.

Panicum. ἔλυμος, μέλινη Fenich, Fuchsch-
wantz. Semina rubidis continet panniculis dense
confertimq; aceruata, alias purpurea, alias rufa
sa, candida alias & nigra.

Crimmon, κριθή, Crassior tritici & Zea
farina, ex qua fit puls. Gryesß.

Athera. ἄθηρα. ex tenuissime mo'ita Zea olim
fiebat. Estq; sorbitio liquida puliculae similis, hoc
die

die ex auena exquisitissime comminuta paratur,
sauff aus hebern meel.

Puls, πούλτος. Pulticula, πούλτ' & γίον. Brey.

Melampyron μέλαμπος, dwachtel zweis
gen.

Phalaris. Bluthirsen. Semen gignit candidum,
oblongum, milij magnitudine.

Phoenix nascitur in tectis & fossis spica lolij
flore puniceo. Meuse korn.

Lolium. αἶζα, ζιζάνιον, in hordeo Twalch, in
olyra Threspe.

Zythum & Curmi potus ex hordeo cognati
nostræ Cercuisiæ. Zythum, id est, feruefactum à
ζέω, Coquitur autem cercuisia uel ex hordeo solo
uel tritico solo, uel utrisq; proportionē mixtis.

APPELLATIONES LEGVMINVM.

Legumina à Legendo nomen for-
tita sunt, quod à terra leguntur uellendo
non subsecantur. Græcè ὡωια χέδ' & ποωα, Ge-
muß.

Oryza. ὀρῖζα Reis. Semina non spica sed iu-
ta continet ut milium.

Oryza minor. Himelthaw. Schwaden. Na-
scitur

scitur in humidis & aquosis locis, tenuior multo & minor milio. Plania in qua nascitur uidetur ea esse, quam recenset & describit inter graminum genera Plinius nomine Graminis aculeati.

Sesamum σάμωρ. Ex Ægypto affertur, Semen gerit uasculis inclusum, ut Papauer, minus aliquanto lini semine, candidum & pingue,

Fabe. Bonen. κνάμοι, uel ἄπὸ τοῦ κνέειν ὀνόματα: uel ἄπὸ τοῦ κνέειν δ' αὐτοῖ. Fecunditatem enim efficere & uenerem extimulare creduntur, quod flatulentæ sunt.

Puls fabacea liquidior & dilutior ἐτυμολογία: crassior ἔγγυμνα.

Pisa. πῖσος. Cognata fabis. Duo eius genera. Vnum in aruis seritur, minus, caducum, humile, repens, granis rotundis, siliqua cylindracea inclusis, flore circa umbilicum purpureo. Pisa campestris, Felderbsen. Alterum hortense est, Stengelkerbsen, quod adfixis accubat palis, ijsq; sese implicans & annectens Capreolis, quos exerit, assurgit in altum. Huius una species album florem altera purpureum edit. Illam klozkerbsen. Hanc Romisch erbsen nominamus, Vtraq; campestris Pisa magnitudine excedit.

Cicer. ἐγγέρινθος. kichern Tria Cicerum genera. Candidum, Ruffum & Nigrum.

K

Candi

Candidum rotundum & leue. Arietino mi-
nus. Vocatur Columbinum. Δweislichern.

Rubeum ab erui similitudine ὄροβιασος &
ὄροβιας Græcis, Latinis Venercum, Columelle
punicum à mali punici colore dicitur, Rott Kis-
chern.

Nigrum arietinum uocatur, κριθὸς quod Ari-
etino simile sit Capiti, Schwartzkichern.

Cicercula, λάθυροι, quaternis et inæquali-
bus angulis incisæ sunt, non rotundæ sed com-
presse in quadrangularem figuram declinam,
Eruen in Apotecken.

Phaseli φασίλοι. Flores candidos, semina in
oblongis siliquis foenu græci figura, candida, for-
ma & magnitudine inter fabas & pisa media
ferunt, Feseln.

Phasioli φασίλοι, δόλιχοι, λάβοι, λάβια.
Semina hortensis smilacis, ranunculis similia, co-
lore uaria, sed ex parte rufefcencia, Δwelsch-
bonen.

Eruum, ὄροβος, Eruen, Vnum genus candi-
dum, alterum rufam est. Vtrumq; Cylindræa
siliqua continetur.

Eruili, ὄροβοι Circa aluearia feruntur. Flo-
re enim earum delectantur apes. minus alte as-
surgunt quam Smilaces, quibus Topiario opere
Canes

Camera opacantur & Pergula. Sed clavicula-
rum adminiculo mirifice tamen scandunt & re-
punt. Rouilien Italis.

Araci, ἄρακοι, lenti similes ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν
quod frangere est, & ἀσβηλικά, ἀσβησῶν
enim sunt.

Lentes, φακοί, Linsen, Römisch linsen, groß-
linsen.

Lenticule, φάκοι, Klein linsen, Gemeine lin-
sen.

Lentes exorticate, λέκθοι, aufgelüffte aus-
geschelte linsen.

Lupini, δόμοι Feigbonen. Alij Satiui sunt,
Alij sylvestres, quorum differentie plurimæ flo-
re aut roseo rufescente, aut luteo aut cæruleo

Fœnum Græcum, τήλιν. ἑόκας, ἀσπυρόκας,
ἐπινόκας, κόραιτις. Nomina illi imposita à figu-
ra corniculorum, quam siliquæ quibus semen in-
cluditur representant & præferunt Siebenge-
zeit, ziegenhorn.

Linum, λίνον, λινικάλαμον, ἄμμος, Lein
λινώσπορος & λινώσπομα, Leinsamen. Li-
num decorticatedum flachs.


Linum Xylinon, Vulgo cottonum Baumwol-
len. Nascitur in frutice peculiari. qui Gossypion
& Xylon vocatur.

APPELLATIONES

PLANTARVM OLERACEI

GENERIS ET CVLI-

NARII.

 Lera & Oleracei generis plantas latini, λάχαρα & λαχανώδη Græci uocant plantas, quæ coctæ aut crudæ comeduntur, uel ad acetaria usurpantur aut adhibentur cibis reliquis condimentorum gratia. Eorum alia radicibus, alia colliculis & folijs, alia seminibus, alia bulbis, alia acredine & mordacitate commendantur.

Rapa in neutro genere & rapæ. γόγγυλοι & γόγγυλιδες, à rotunda radice figura. γόγγυλον enim idem est quod ῥόγγυλον, Rüben. Densiore satumasculescunt radice procurrente in longum. Rariore effœminantur radice in rotundum globata. Semen serunt in siliquis, quod expetitur olei causa, quod inde excuditur tusione & compressione.

Rapæ syluestres. Rapunceln uulgo. Horum recens ex terra prodeuntium asparagi, id est, tenera & summa ac paululum supra terram exstantia cacumina colliguntur primo uere ad acetaria. Est & aliud raparum Syluestrium genus, luteo

luteo flore in segetibus nascens, diuersum ab Armoracia, grandiore enim multo radicem habet

Napi. Horum duo genera. Vnum quod Βεβαιάδα graeci uocant, maius & rapo ac raphano simile. Alterum quod Βένιος minus, hoc praestat illo. Germanice utrumq; Stockrublein. Bordfeldisch rublein. Mersburgisch rublein. Nomen Βενιάδος à tumente figura factum.

Radix. Radicula. Raphanus. ῥαφανίς, ἀπὸ τοῦ ῥα φαίνεσθαι. Tertio enim die à satū profilit & erumpit de terra, Rettich. Duo eius genera. Vnum longa radice, quod Theophrastus Syriacum & Beoticum uocat. Alterum rotunda, quod Algidense,

Armoratia. Raphanus syluestris. ῥαφανίς ἀγρία. Nascitur in segetibus rapo syluestri non ab similis, sed minor multo. Heidenrettich.

Pastinaca satiuā σαφύλιν & ὁ κικευτός. Gelbe mören, sam mören.

Pastinaca syluestris. σαφύλιν & ἄγριον. Zwidmören. Radicem gignit satiuā minorem, drantalem, crassicie digiti, albicantem.

Sifer. σίκερος, Satiuum est & erraticum. Geyerlein. Klingenmören. Grizelmören. Tiberij Caesaris commendatione nobile est, qui omnibus

id annis ē Germania Romam aduehi curauit &
Gelduba castello Rheno imposito. Radicem Siscari
Arabes Secacul uocant.

Rumex λαπαθον ἂν πὸ τῷ λαπάτῳ, quod
est exinanire. Decocta enim folia molliunt &
deiciunt aluum. Ampffer. Species Rumicis plu-
res.

Lapathum hortense seu satiuum, λαπαθον
καπευτόν, Garten ampffer. Duum generum est.
Vnum grandius non absimile syluestri, sed mol-
lius, pinguius & delicatius. Alterum minus, quod
miniaturum uocare à miniato succo & fibris pul-
chre rubentibus possumus.

Lapathum syluestre, λαπαθον ἄγρον. Vul-
go notum. Germanice, Hasen ampffer, butter
ampffer, quod folij eius obuoluitur & tegitur
buryrum recens, ne tempore lique scat & diffuat
aut mollescat, uel à muscis conspurcetur. Grind-
wurts ab effectu, quod linimentis miscetur, quæ
scabiei extergenda atq; extirpande adhiben-
tur. Ochsenzung, à figura foliorum linguam bo-
uis referentium.

ὀξύλαπαθον. Vulgo lapatium acutum in
officinis. Sic denominatum ab acuta & mucro-
nata foliorum effigie. Spizer ampffer. Acetosa.
ὀξύλα

ἑξάλις à sapore acido, ἔ' ἀναξυγίς à figura
foliorum exprimentium soleas calceorum, quas
ἀναξυγίδας uocant denominata. Sawerampffer,
Duum generum. Maior quæ in hortis ἔ' pratis.
Minor quæ in aruis ἔ' præsertim harenosis ἔ'
aridioribus prouenit.

Hippolapathum, ἱππολάπαθος, id est, grana-
de lapathum. Duum generum est. Montanum
unum quod quia à Monachis seri in hortu pri-
mum ἔ' colit cepit Rhabarbarum Monachorum
uocatum est. ὀρεολάπαθος dici potest. Munch
Rhabarbarum. Alterum in aquis nascitur lon-
gitudine duorum cubitorum, ὑδρολάπαθος.
Dwasser ampffer.

ὀξύς uel ὀφουλλῶ ὀξύς. Trifolium
acidum, Sawerklee. Vulgo nascitur in umbrosis
locis, gratum acorem habet ἔ' lenem, propterea
ad acetaria mirifice expetitur. Vulgo panis Cu-
culi ἔ' Alleluia.

Lampsana. λαμπάνη, ἀπὸ τοῦ λαβαί, quod
folijs terram lambit. Reinkoll. Olus sylue-
stre Iulij Cesaris carminibus iocisque militaribus
præcipue celebratum. Alternis quippe uersibus
exprobrauere milites Lampsana se apud Dyr-
rachium uictitasse, præmiorum parsimoniam ca-
uillantes.

Blitum. Βλίτον. Meier. Olerum insipidum & satium sine acrimonia. Vnde Greci Βλίτον & fatuos uocant & stolidos. Aliud satium, aliud syluestre est. Satium aut caule folijs & radice rubet, ut amaranthus, aut caule & fibris foliorum purpurascit, folijs uero ex saturata uiredine nigricat.

Malua, μαλάχη, ab emolliendo dicta. Pappein Malua hortensis, μαλάχη κηπέυτη, uulgo nota, & cultura assurgit & grandescit in arborem. Vocaturq; Malua Arborescens, δένδρον μαλάχη. Florem eius quem aut candidum aut ex candido purpurascentem, aut purpureum aut uermiculato rubore nitentem profert, cumque aut simplicem rarumq; aut exploribus dense confarctum folijs, germanice uocamus Ehrenrosen, erdrosen. Magnitudine & uenustate rosas uincit, sed inodorus est.

Malua Crispa. Krauspappeln. Romisch pappein. Folia ampla, mollia, rotunda, & in ambitu laciniata ac plicato sinuatoq; uibrata & flexu eleganter crispata habet.

Malua syluestris maior. Rosspappeln. Minor hasenpappeln & genespappeln. Veraq; differentia nota uulgo. Omne maluatum genus folia cum sole circumagit, eodemq; sese inclinat quod sydas fertur.

Attrit

Attriplex, ἡ ἑτάφαις, ἀπὸ τοῦ ἐσθῶς ἔσσῃ, quod statim in altum adolescit. Mox enim à satù profert se in emersum, confestimq; incremento proficit, & ut crescit ocysissime, sic mox quoq; senescit & perit. Vocatur & ἄνθος χαλὸν à colore uiridi in luteum languescente & auri amulo. Melten. sammelten. Huic cognatum olus quod spinachiam aliqui ad Spinaceum olus, aliqui σπιντομάλαχον, aliqui attriplicem uiridem uocant. Binetsch.

Attriplex syluestris. Scheismelten, mislmelten quod in fimo & locis in quibus stercora coaceruantur nascitur.

Brassica, κρήμβη, non sic dicta quasi κρημβλή, πρὸς τὸ ἀμβλῶναι τὰς κορὰς, quod hebetet & obtundat pupillas oculorum, Medetur enim caligantibus & cæcutientibus oculis, sed ὅτι ἀντίσθι κορῶν, quod Crapulæ medetur. Summo cibo enim sumpta crapulam discutit & uini noxam comprimit. Sunt & pernicialia odia brassicæ cum uiribus. Koll. Mangolt.

Brassicæ satiuæ. Vnum genus κεφάλωτον est & capitatum, alterum ἀκεφάλον & capite carens.

Capitata brassica aut folijs in rotundi orbis formam collectis capitatis imitatur & represen-

tat figuram, aut caulo in prætumidum globum
 extuberrat. Priores due sunt Species, Vna quæ à
 Plinio uocatur Brassica fabellica, Germanice
 Krauser kappis. Hæc folia quæ habet crispæ &
 intus alba tenera ac subdulcia, conglomerat in
 quandam capitis figuram. Altera quæ folia cano-
 dida leuia & carthilaginea exacte contrahit &
 concludit in orbem solidiorem, proprie capitata
 uocatur. A Plinio scabulis, lacuturris & tritiana,
 Kappiskraut, heuptkraut.

Brassicæ non capitatae differentie sunt.

Brassica leuis. κρόμβη λεῖα ἢ ἀφύλλωτος.
 Eius una species candida est, Breiter zweisser
 Koel. Altera caule & foliorum carthilagineis
 fibris rubet obscuro rubore, folijs ex uiredine de-
 clinat ad cœruleum colorem nigricantem. Bla-
 zwey Koel, Roter breyter Koel. Vtriusq; folia le-
 uia & lata, neq; unquam in capitis coeunt aut
 coalescunt rotunditatem.

Brassica apiana κρόμβη σελινόειδης ἢ σελινό-
 σια. A foliorum figura incisuris apij folia imitan-
 tia, Krauser Koel, Römischer koel oder Mangolt.

Brassica absolute κρόμβη, Minima omnium
 Klein Koel.

Brassica syluestris, uulgo in locis nascitur ina-
 cultis. Gutter heinrich, κρόμβη ἀγρία.

Brassica marina, κρόμβη θαλασσία. in
 Phara

Pharmacopolijs Soldanella & Soldana.

Beta, σέυτλον, ἀπὸ τοῦ σέυς, quod mirifice
ce ceu impulsā atq; incitata attollatur & crescat.
Beta nigra. σέυτλον ἢ τεύτλον μέλαν, Rote
ruben. Radices eius calenti cinere fōtas ac
maceratas donec emoleſcant, cortice detracta in
rotundas assulas ſecant. Post conditas aneiho &
raphano maiore tessulatim conciso, asperso quan-
doq; pipere reponunt atq; asseruant in usum
acetarij.

Beta alba, τεύτλον λευκόν, zweis koel. Romi-
scher mangolt. Beese uocabulo à beta detorto.

Portulaca. ἀνθεράχην. Satiua portulaca
Portzell gartenporzell. Folijs pinguibus, à tergo
candidis, sapore aliquatenus falso. Sylvestris
portulaca commutato nomine κηπά. α uocatur.
zwildporzell.

Asparagorum duo genera. Altilis seu satius
asparagus ſeritur & educitur in hortis ex sylue-
strium semine, & cultura mansuescit ac tenerior
euadit, garten spargen. Sylvestrium alius in ari-
dis & harenosis collibus nascitur, uocaturq;
περδαῖον & Myacanthinus: alius in palustri-
bus & humentibus locis qui ἔλαον dicitur,
zwildspargen. Dicitur, ἀπὸ ἀσπαγος quasi ὁ μὴ
ἀπερδύμνος, quod sponte, etiam sine satione
nascatur.

Plano

Plantaginis species tres. Minima quæ proprie ἀγνολωσος dicitur ab aguinæ lingue similitudine, quam referunt folia. Spitzer Weggrich, Media cui folium latius aliquanto & rotundius, molle, languinosum, leuiter rufescens, odoratum. Richender Weggrich. Tertia maxima, glabro & lato folio. Breiter wegrich & Roter wegrich.

Lauer, σιόρ, Bachpungen, wasserpungen, wassernerck, Gaudet riuulis perennibus, quorum fluentibus quod alluitur & lauatur aquis, laueris nomen inuenit.

Sisymbrium, σισύμβριον, Duum generum est. Hortense, σισύμβριον κριευτόν. Vulgo menta crispa. Krausemuntz. Huic cognata duo genera mentæ aquaticæ, quæ balsamias Myropole uocant. Eorum unum nostri fischmüntz, alteram bachmüntz nominant.

Syluestre Sisymbrium. σισύμβριον ἔτορον ἢ καὶ δ' αὖν. Duum generum, Vnum minus Brunkressen. Vulgo nasturcium aquaticum Alterum maius, winterkressen. Vtrumq; cum prodit folio rotundo exit. Vtrumq; perennare uidetur. σισύμβριον dicitur ὅτι δ' σιόρ ὁμαλῶς ἢ ἔτορον, à cienda urina. Omne enim sisymbrium δισχηκτόν est, καὶ δ' αὖν ὅτι τὸ καὶ δ' αὖν. Ledit enim caput halituum acredine.

Critica

Crithmum κριθμop. Latine *batis*. Germanice
be baccillen. Myropolis Creta marina. Nascitur
in maritimis locis.

Coronopus. κορωνόπος. Sic dicta quod folia
quæ ceu in acutos mucrones fissa & per terram
strata habet, figuram exprimunt pedis cornicum.
Kraenfuß.

Sonchus. Cicerbita latine & lactucella. σογ-
χος ἀπὸ τοῦ σῶρον χεῖρ, quod succum si tunda-
tur & exprimatur fundat salubrem. Duum est
generum. πλατύφυλλος & σενόφυλλος, *Son-*
chus πλατύφυλλος duplex rursus. Aspera, quæ
germanice, *Sewdistel*, *Sewmelcke*. Levis quæ *Ha-*
senkoel. σενόφυλλος etiam duplex est, sed utraq;
aspera, & utraq; in segetibus nascitur, una cœ-
ruleo, altera luteo flore.

Intybus, *Intybum*. σέρις, Duum generum.
Hortense & *Sylvestre*. *Hortense Intybum*, σέρις
κηπευτή. Vna πλατύφυλλος est. *Zam* oder
garten Endiuien. *Vera Endiuiā*. Altera σενό-
φυλλος, cætera priori similis. *Zam* dregwart.
Scariel. *Scariola*, quasi *Seriola*, nomine detorto
ex *Seride*.

Sylvestre Intybum. σέρις ἀγρία Duum etiam
generum. Vnum quod σέρις ἰμῶρος & ἡδύπνοις
dicitur. Vulgo *Dens Leonis* & *Caput Monachi*.
Altes

Alterum quod Cichorium, κίχουρον nominatur,
inde quod florem cum sole circumagit, & ὠκρίπης
ab amaritudine. Theophrasto amarago. Latine
Ambubeia, Germanice Zwegwart, Hindleufft.
Sonnenzwirbell.

Condrilla, κονδρίλλα, Nomen acquisiuit,
quod imis radicibus callum quem χόνδρον graeci
uocant ostendit. Duo eius genera. Vnum ἡ-
λυκλον cuius una species Cichorio similis flo-
re coeruleo sed minor multo, klein sonnenwirbel.
Alter maior, luteo flore, circumrosis folijs, Ha-
senstrauch. Alterum genus μονόκλον, cuius
duae species magnitudine discrepantes. Klein
und groß wild zwegwart nominant germani.
Omnia autem Sonchi, Intybi, & Condrilla ge-
nera & turgent & fracta incisq; manant la-
teo succo.

Cucurbita à concurnatu, κολοκύνθα πρὸς τὸ
κόλον κώπ dicitur. Duo eius genera. Camera-
rium & Plebeium, Hoc humi repit, illud sese at-
tolit reptantibus scandens flagellis. Camerarij
tria genera non natura, sed figura diuersa, quam
exulti acquirunt mangonio.

Longa Cucurbita in longum porrigitur res-
ecto ductu ex seminibus, quae prope collum creues-
cunt propagata. Langer runder Kurbs.

Rotunda cucurbita globatur in orbem ima
parte

parte atq; intumescit, suprema arctatur & co-
gitur in angustum, deq; seminibus à medio ex-
emptis corpore educitur. Runder Kurbs rnd
lenglicht.

Sesilis Cucurbita brevis est & crassa, aptis-
sima recipiendis & asservandis liquoribus. Run-
der dicker Kurbs.

Cucumis. σίκυς ἢ σίκυον, ἀπὸ τοῦ σέλας
ἢ σέλας ἢ σέλας ἢ σέλας quod minime cieat,
sed cohibeat & extinguat Venerem, σίκυς
ἡμῶν. Viret perpetuo, longitudine cubitali &
curva specie hirsuta. Planta sylvestri similis est,
Ex Cucumerum sunt genere, quas Itali Angurias
uocant & aliqui Cucumeres. Semen in aliquibus
nigrum est, in alijs aut rubet, aut flauet, aut albi-
cat, aut herbaceum colorem praefert. Officinae
ostenderunt pro citruli semine. Zwelfsch gurcken.
Nomen enim gurcken ab Anguriarum appella-
tione deductum est.

Pepones, πέπωνες, sic nominati à maturitate,
qua illis opus est, quasi πέπωνοι, sunt ueteribus,
qui hodie ab Hetruscis Citruli, quod ubi maturi-
tate in magnitudinem iustam excreuerunt aureo
citri colore flauescunt, & à Longobardis Cucu-
meres uocantur, Germanice Gurcken. Polnische
Limoien, Pluzern. Scruntur in aliquibus locis
ad Vna

ad Vestigal, & dum uirent decerpti ante maturitatem iustam & priusquam semina concipiant, sale condiuntur anethi semine asperso aut alio ad acetaria.

Melopepones, & Melones. μῆλωνες ἢ μῆλοπέπωνες, à pomi figura, quasi pomosi. Horum duo genera uulgo cognoscuntur. Vnum cortice subtiliore, quod Melones uocant, Germanice Melaunen. Alterum crassiore & solidiore cortice, quod pepones. Germanine Pseben. Sed à peponibus Veterum diuersum est, Vocemus ergo Melones germanorum Melaunen, & Melopepones Pseben, Pepones, Pluzern & Gurken.

Lactuca à lacteo succo quem fundit nomen sortita. ὅτι δ' αὖ ἢ ὅτι δ' ἀκίνη uel ὅτι τριζὰ δακνύμενη, uel ὅτι ἐν τοῖς δέρεσι γίνεται quasi δόρι δ' ἀκίνη, uel simpliciter ἀπὸ τοῦ δόριζέως, quod metitur crebro, id est, decerpitur & colligitur ad acetaria, uel ἀπὸ τῶν δόριξ. Duo genera lactucarum Satium & Sylvestre. Satiui unum genus Crispi est folijs insigne, altarum planis. Crispi due species. Sessilis lactuca, Græce ἐὼςχιον & ἄσκαλις, quod in caulem non assurgit, ui omni in folia assumpta, que eleganter Crispata in formam capitis conglobat, Sed non nisi transplantetur. Krauser latich. Krauser Salat, der kopff gewint. δὲ kappis.

Kappiskraut. Hauptlattich. *Coecliana* totis quidem folijs & in ambitu præsertim sinuatim cre-
natis, atq; crispatis nascitur, in globi tamen for-
mam ea nunquam complicat. Gemeiner krauser
lattich.

Plani generis due etiam species. *Intybacea*
lactuca. folijs intybi, latis, ex uiredine albescenti-
bus, **Swelscher Salat.** *Querna*, quercuum folijs in
ambitu profunde incisiss nascitur, Gemeiner Sa-
lat. Hec durior agrestior & magis insipida. Illa
mollior & tenerior est. Vtraq; candido semine,
ut *Crispa* utraq; nigro nascitur,

Lactuca sylvestris. $\theta\epsilon\iota\delta\alpha\gamma\alpha\chi\iota\alpha$, Gensdistel.
Myropolarum falsa Endivia.

Gingidium uel $\chi\alpha\gamma\acute{\epsilon}\phi\upsilon\lambda\lambda\omicron\upsilon$. **Creutzkraut,**
Korffelkraut. *Pastinace* similis. Sed foliorum
plures minoresq; incisuras habet.

Scandix, **Nadelkraut, Nadelmoren,** Nomen
habet, quod in oblongis gracilibus & acute mu-
cronatis filiquis semen fert, Inde mater Euripi-
dis dicta $\sigma\kappa\alpha\nu\delta\iota\kappa\omicron\pi\omicron\lambda\iota\varsigma$.

Caucalis, $\kappa\alpha\nu\kappa\alpha\lambda\iota\varsigma$, **Rauhe bibenell, Swilde**
grosse bibenell.

Daucus, **Gemeine bibenell.**

Daucus creticus, **Beerwurz.**

Eruca ab erodendo dicta. Linguam enim gu-

L

stata

stata acredine urentis saporis uellicat, ἔνζωμος,
quod iura commendet grato sapore imbuta,
Weisser semp ff.

Ocimum, ὀκνυμῶν, ἔνε τοῦ ὠνὸς ὠζόν, quod
subita celeriq; et uehementi fragrantia petat feri-
atq; nares. Basilien.

Ocimum citreum à citri odore. Groß ba-
silien.

Ocimum simpliciter, Klein basilien.

Ocimum Cariophyllatum. Zwelfsch basilien.

Orobanche, à strangulandis orobis nomen in-
uenit. Theodoro apud Theophrastum Eruanga.
Sommerwurtz.

Tragopogon, Τραγοπόγων. Barbula hirci,
Bochsbart, Gauchbrott. Florem aut cœruleum
aut luteum edit. A calyce qui supra caulem exit,
promisse dependent barbule quales hircorum,
inde nomen.

Ornithogalon à flore intus lacteo, foris hera-
baceo, Erdnuß, Seennuß, Kockelkern, amat ar-
ua pinguis.

Tubera. ὕβωα. Colore distinguuntur candi-
do ruffo nigroq; Nascuntur quouis anni tempo-
re, sed preferuntur ceteris Verna. Germanice
morchen. Carent medulla & uena, solo undiq;
circumdatis, nec fibris aut capillamentis ullis in-
tuntur, nec terræ coherent.

Medi-

Medica. Vihe Klee. Burgundisch bew, Bur-
gundisch gras, Siliquas profert inflexas in cor-
nicula, seu potius intortas & conuolutas ελικο-
ας ως cochlearum instar in orbem, in quibus sin-
gulis semen lunatum corniculatæ lunæ specie Tri-
tius genera sunt, magnitudine diuersa.

Aphace, Vicia, wicken.

Porrum capitatum. πρῶτον κεφαλῶτον,
Aricinum porrum, Lauch.

Porrum sectium seu sectile, γήθυλλος &
γύθυον. Prislau, Schmitlau.

Ampeloprasum, quasi Vitigineum porrum.
Nascitur flore cœruleo non in vineis tantum sed
& pratis, wilderlau.

Cepa, κρόμμυον, πᾶς δὲ κορυμβῶν, quia
acredine halitus infestus mordicat & conuulsi-
oculorum pupillas cogit γυβεῖν, zibeῖν, zybollen
Rubeat alia, alia cundicat. Et penè sola inter
plantas Luna senescente reuivescit & germinat,
augefcente rursus uelut corrugatur & marce-
scit.

Ascalonia Cepa. ἀσκαλωνίον κρόμμυον.
Eschlauch,

Allium, σκορδόν, Hortense allium, ἡμῶν
ἢ καπνῶν σκορδόν. Knoblauch. Sylvestre,
ἐπίσκορδόν, quasi anguinum allium. Folia
cernitur lilij conuallij, Rampen, Ramfern.

Scorodoprason mediam inter allium & porum naturam habet, Feldknoblauch, hundsknoblauch, ackerknoblauch.

Scilla, Meerzwibel. Pancranton, Kleine Meerzwibel.

Sinapi. σινάπι uel σινάπι. Nomen inde habet ὅτι σίνετι τοὺς ὄπας ἐν τῇ ὀσμῇ. Odor enim naribus raptus statim sternutamentum ciet & oculos uellicans lacrymas elicit, Senff. Est aliud hortense, aliud syluestre.

Nasturcium à torquendis naribus. καρχαρόν ἀπὸ τοῦ καρχαδέμενον. Tentat enim caput ignea ui seminum, Gartenkreß.

Thlaspi, ἄπο τοῦ θλάω. Semen enim lenticule effigiem habet, sed infringitur. Thlaspi minus. Klein deschelkraut, Thlaspi maius uel sinapi persicum, Moerrettich, Krien. Aliquibus nasturcium album.

Draba nasturcium Orientale.

Irio ἰγύσιμον, ἀπὸ τοῦ ἰγᾶν, quod incisa & eruce modo laciniata habet folia. Schutsemff.

Hidropiper, Wasserpfeffer, Flokraut.

Piperitis. Siliquastrum. Schotenpfeffer. Turbischer pfeffer. In siliquis enim metæ figura turbinatis, primo uiridibus, maturitate rubescentibus.

tibus semen gignit album, tenue, acredine pipera-
ris.

Apium, σῆλινον Sativum est, Duo eius ge-
nera Vnum Crispum. Vulgare Petroselinum, Pe-
terlein, Petersilien, Alterum latifolium, Eppich.
Gros-peterlein.

Carum, κάροϋ, à Caria regione nomen tra-
xit, Karbe, Dwisenkummell.

Cuminum, κύμινον. Kromkummell. Frequen-
tior eius usus corpora pallore deformat. Vnde
Quidij illud. Pallentis grana Cumini.

Salvia, Salbey, ἑλελίσφακος ἀπὸ τῶ ἑλε-
λίσφου εἰς σφακὸς, quod statim marescit & sy-
deratur, comminuiturq; facile in pulverem. Sal-
via minor, Kreuzsalbey.

Foeniculum, μάραθρον. Fenichell.

Maiorana, ἀμάρακος, σάμψυχον παρὰ τὴν
Γενετὴν τὸν ψυχλὸν, Reficit enim & recreat spi-
ritus mirifice suauitate temperati odoris, Maio-
ran.

Rosmarinum, λιθανότης σεφανωμάκη,
Rosmaryen.

Hyssopus, ὕσσωπος. Eysop. Vox peregrina &
hebreæ est hexoph.

Mentha, Rote muntz.

Mentastrum, Pferd muntz.

Nephetba, Katzen muntz.

Nardum, Nardus, Nardus Indica uel Syriaca
Spickenard, Nardi appellatio hebraea est Nercd.

Nardus Celtica. Marien magdalenen blum.
Seliungk. Saliunca, Fuit autem Nardi appellatio
generalis Graecis ut ϵ $\mu\psi\gamma\omega\pi$ ad unguenta, quae
uel foris in unxerunt corpori, unde ϵ $\pi\iota\gamma\gamma\iota\varsigma\alpha$ di-
cta sunt, uel hauserunt, quae $\pi\iota\varsigma\iota\kappa\alpha$ uocata sunt,
 $\tau\omega\iota\omega$, id est, potabilia. Inde $\nu\alpha\gamma\gamma\delta\omega\varsigma$ $\tau\omega\iota\varsigma\iota\kappa\iota$ in hi-
storia Passionis Domini nostri Iesu Christi.

Phu Ponticum, Theriackskraut. Gartense-
liungk.

Helenium. Alantzwurz. Hec incocta Vino fa-
cit Vinum quod Helenites ϵ Nectarites est Plin-
io, Alantwein.

Angelica, Smyrnum, Brustwurz, Heilige
Geistwurz.

Abfinthium, Overmut, Inde fit Vinum Absin-
thites.

Santonicum, Wurmsamenkraut.

APPELLATIONES
AROMATVM QVORVN-
DAM VSITATO-
RVM.

Aqua à roborando nomen habet, $\gamma\omega\mu\alpha$
vix enim est confirmo ϵ roboro. Tribui
tur

tur illis plantis, quæ & saporis & odoris pecu-
liari ui aliqua recreant & roborant spiritus &
precipua membra corporis.

Acorum Vulgaris calamus Aromaticus, Kal-
mneß.

Cardamomum minus, Cardamomlein. Maius
uocant grana meligette.

Myropola pro Cardamomo maiore ostens-
dunt grana paradysi, Paradyskorner,

Cinamomum κίνναμωμ, hebreæ appellatio à
Canna.

Casia, Putant aliqui nos Cinamomo carere, et
Cinamomum nostrum esse Casiam Veterum, Ca-
nell, zimetrinde. Virgilij Casia Coronaria herba
est, & à Theophrasto describitur nomine Cncori.

Crocum. Hebreæ appellatio est. Carcos, Saff-
ran, quæ ipsa quoq; appellatio Sarracenica est.

Gingiber, Ingwer, radix plantæ harūdinacæ.

Galanga, Galien.

Caryophylla, Negeln, Kromernegeln. Ex atro
ruffescunt, capitata in clauī modum. E capite
quatuor in aduersum exerunt ceu denticulos sese
decussatim intersecantes, inter quos alucolus
quadratus.

Nux myristica, καρύδωρ μυγίστιμωρ, Muscatnus.

Macis exterior cortex nucis myristicæ. Mu-
scatblum.

Piper, πῖπρις, Pfeffer. Tria piperis genera,
 Longum, Album & Nigrum. Plinius in una na-
 sci arbore prodidit & siliquis includi, quæ betu-
 larum grossulis figura respondent, quæ prius-
 quam dehiscunt maturitate, decerpitæ tostæq; pi-
 per faciunt longum. Paulatim maturitate fathis-
 centes candidum piper ostendunt, id demum ubi
 exacte maturuit, siliquis excussum, ac solibus tor-
 refactum nigrescit & corrugatur in piper ni-
 grum. Negant hoc qui piperis regiones adie-
 runt, & singula genera in suis nasci arboribus
 affirmant.

Zedoaria. Zittwer.

A P P E L L A T I O N E S FRUCTVVM COMMVNIVM ET ARBORVM NO- T A R V M.

A Mygdala et Amygdalæ, mandel-
 kern. Dicuntur ἀμύγδαλα πρὸς τὸ
 τῷ μετὰ τὸ χλωρὸν ὥσπερ ἀμυχὰς ἔχει
 πόνδα, id est, quod post uiride putamen scaris-
 ficatus plurimos ostendunt & ceu in rimas de-
 hiscunt. Amygdalæ aliæ dulces sunt, aliæ amaræ.
 Bittere Mandeln. ἀμύγδαλα πικρά κεφάλια.

Auellane nuces. λεπτοκάρυα. Coryli frus-
 ctus, Haselnuß, Conditæ ollis in terra seruantur
 uirides.

Ponticæ nuces, & prænestinæ & heracleo-
ticae. Lampertisch haselnuß. Coryli surculo uel
uirga serpentem ictum obtorpescere, tandem e-
mori obseruatum est.

Persicæ nuces uel regiae, uel iuglandes, καρύα
Βασιλικὰ ἢ πρῆσικα, Zwelschnuß, καρύα dicun-
tur quod tentant & grauant cerebrum. Sunt
enim κεφαλαλγῆ omnia & maxime cum ex ue-
tustate rancorem contraxerunt. Persicas quod
ex Perside conuectæ sint: Regias ut à regibus
translatas uetustas cognominauit. Duo iuglan-
dium genera. Vnum putamine fragili, quod Mol-
luscas uocant, Kleine Zwelsche nuß. Alterum du-
ro, quod Moracias & Moracillas, Steinnuß. Ser-
uantur ne rancescant, uel paleis obrutæ uel ha-
rena, uel musco recenti petris derafo & saxis,
uel folijs suis aridis, uel mixtæ cepis.

Castaneæ nuces. σῖος βάλανοι Ἐρσιάναι
Βάλανοι. λότιμα κάσανα, Kesten, Kastanien.
Echinato includuntur calyce.

Cerasa & Cerasia à Cerasunte oppido Ponti
denominata sunt, Kirschen.

Primus Cerasum Lucullus Mithridate de-
bellato in Italiam detulisse proditur. Genera Ce-
rasorum plura.

Duracina Cerasa, colore rubent, sed ex rubo

L S

re de

re declinant ad albedinem, carnem habent copiosam et dulcem, Vngerische Zweichseln, Groß Zweis kirschen.

Ceciliana, Kleine Zweichseln. Rote vogelkirschen. Parte soli obuersa rubent, auersa candicant, sapore sunt dulci, in syluis proueniunt.

Actia et Actiana nigerrima sunt, succoq; sanguineo manus et ora inficiunt, Schwarz vogelkirschen.

Aproniana, vnser Zweis kirschen. Primo maturescunt et carne constant copiosa Sapore inter acidum et dulcem medio, penè subaustero.

Macedonica et Merasia, Saurkirschen. Arbori innascuntur mediocri, interdum et pumile. Colore ex purpura nigrescunt. Grato commendantur acore.

Cappares, Kappern. Rotundi fructus Capperum, similes baccis olcarum, quibus fathiscenibus flos emicat. Hic postquam decidit excussis, glans extuberat oblonga, seminis acinosi plena Condiuntur sale, quod Grecis est τὰ γίγνηται, ut asseruari possint. Et condita hoc modo, ἁλμαῦας greci, latini salgamata uocant.

Citrium malum, Cedromalum, et Medicum malum, κυδρόμηλον, κίτριο, μυδιόν, Atheneis ait δὲ κίτριο ἀλεξιφάγμα κομίζειναι πάντῃ
ἡ κίτριο

ἑλκντίζις. In hoc genere poma quæ orbiculata
specie auri renitent colore, χρυσόμυλα, Aurea
mala, & uulgo Pomerantzen uocantur. Diffe-
runt saporibus, qui alijs dulcis, alijs acidus inest.
Quæ ex uiridi in luteum uergunt colorem ea-
dem specie, citreola uulgo & citrula nominan-
tur.

Citria nomine generis sic adpellata oui, figu-
ram oblongam emulantur, colore luteo. Duum
sunt generum. Maiora quæ & longiora sunt &
ouata specie magis turbinata, uulgo Citrangula
nominantur, Citrinat epffel. Minora breuiora
sunt, uocanturq; Citrea, Kleine Citrinat.

Quæ herbaceo uirent colore aut prægran-
dia sunt orbiculata specie Melonum, aut parua,
qualia aduchuntur ad nos sale condita limonum
nomine, Limonien.

Corna. Horlizen, Hornkirschen. Fructus corni
oblongi, qui primo exortu uirides, maturitate
flauescunt & tandem rubescunt. Cornus arbor.
κρᾶνεια Kornleinbaum. ὀνλκρᾶνεια semina in
hoc genere.

Cedrides, κεδρίδες. Cedri fructus magnitus
dine myrti, flauus, odorati, suaves gustu,

Cotonea mala, κυδώνια μᾶλα. Kutteln epffel
à Cyn

ἡ Cydone Cretæ oppido, unde primum aduecta
sunt, Tria eorum genera.

χρυσόμυλα. Aurea mala. Pomi figura strijs
canaliculisq; in ambitu distincta, aurco colore.
Gros böemisch Kuttten.

Mala Struthia. στρουθιόμυλα ἢ μύλα στρου-
θία. Minora sunt magnitudine & serotino pro-
uentu fragrantius olent. Kleine Kuttten, Hæc
fœminas, illa mares qui sexu distinguunt appella-
lant.

Mustæ, μελίμυλα. Præcoca sunt & cele-
rius maturescunt, mellea dulcedine grata.

μυλοπλακῆς. Exacte attenuata ac leuiga-
ta cydoniorum caro & cum melle uel zacharo
decocta, Kutttenbrott. Vulgo διακνῶσις simplex.

Pillule seu G albuli, σφαυρία, Fructus Cupres-
si, quibus tenue & exile semen laricis fructui
proximum innascitur. Cypressen nuss. Dicitur
autem Cupressus, ἀπὸ τοῦ κνῆρ πρὶς σφ, quod
ex æquo ramos & fructus procreat. Trunci Cu-
pressorum in perticas & asseres finduntur.

Fici & Ficus, σῦκα. Feigen, Harum aliæ do-
mestice sunt, ἡ μῶρα σῦκα. Aliæ sylvestres, quæ
ἄγρινοι vocantur. Fert has Caprifiscus, Domestici-
narum aliæ primo erumpunt & cito matures-
cunt. πρὸ δ' ὅμοια σῦκα, id est, præcoces ficus.

Erue

Fruchtige feigen. Alie post prodeunt ex iisdem arboribus, & cum ceteris fructibus ad maturitatem perueniunt. Hæ decerptæ, cum desiccantur Carycæ latinis, Græcis, ἰσχάδες, uocantur, ὀιωνέες κατισχωνιδία σύκα, τῶτέσιρ, λέπιδωθένθα ἐν τῷ ξηραίνεσθι. Etsi hoc nomen ferè pinguioribus tantum ficibus tribuitur. Marsilier feigen, Korblein feigen.

Großi ὀλωθοι. Grosse feigen. Roßfeigen, Laubfeigen. Harum sunt alie albæ. λευκοὶ ὀλωθοι, quæ esui sunt & nascuntur in arbore sui generis. Alie nigrae, μέλωνες ὀλωθοι, quarum quædam ἄβρωτοι sunt, quædam ἐδωδιμοι, & nascuntur in arboribus gignentibus ficus, Est enim ficium arborum multiplex differentia. Alie uocantur ὀλωθοφόροι, quarum quædam solas grossos candidas procreant, quædam & ficus & grossos produciunt, & ut Theophrastus annotauit. φέρουσι τὸν ὀλωθον ὅπιον τῷ δρίει & de mutatione talium grossorum inquit, πεπαύοντι μεχίζοντες οἱ ὀλωθοὶ σωδργόνει ἢ δὴ τῆς χώρας.

Alie rursus ficus grossos nullas sed solas ficus gignunt. Earum quædam, quæ δυφοραὶ, id est, bis fera nominantur, bis pariunt anno uno. Primo uere enim præcoces ficus, quas Græci φιλικαὲ uocant,

vocant, mox reliquas edunt. Id uero non conti-
nue quouis anno faciunt, sed quandoq; uno in-
terquiescunt & φιλικας non proferunt. Quae-
dum uero praecoces prorsus non pariunt, sed
ficus solas. Iuxta scyllam sata ficus letius proue-
nit & ocyus augetur. Fici uero umbra ruta dea
lectatur atq; sub ea insita incrementum capescit
maius.

Συκόμορα. Ficus Aegyptiae, Aegyptisch Fei-
gen. Fructus arboris, cui Sycomorea nomen, qui
non maturescit nisi ferro scalpatur aut ungue.

Glandes, Βάλανοι, Eckern, Eichen. Diffe-
rentie glandium plures, ut & arborum glandi-
ferarum.

Quercus, ἡρᾶς. Theodoro Placida. Breuior
ceteris & in orbem comosa, alasq; ramorum cre-
bro cauata. Glans huic optima & maxima, quae
glans querna uocatur, sed dulcior est & mollior
in hoc genere faeminae, spissior glans mari. Som-
merreiche & eichbaum absolute.

Robur, ἄγρος, Huic glans parua, quae Βάλα-
νος ἄγρος dicitur. Hageiche, Zwintereiche, eis-
holz.

Cerrus, δρυῖς, zirmenbaum. Excelsissi-
ma & incultis amica. Glans ei tristis & horrida
echynato calyce ut castanea. Cerrua glans.

Efeu,

Esculus, πλατύφυλλος apud Theophrastum
id est, latifolia.

Fagus, φηγός, Glandem fert dulcissimam, nuc-
cleo non absimilem, triangula cute inclusam, &
parte postrema utrinq; lapidescentem. Duo su-
gorum genera. Vnum campestre nigrum, quod
minus & brevius, Hagenbuchen. Alterum mon-
tanum, excelsius, materie candida, Rotbuchen,
Fagina glans, Bucheckern.

Ilex, πρίνος. Duo eius genera. Vnum arborea
scit, quod & βαλανφόρον est, id est, glandife-
rum, folijs ἐπακωνθίζον materie solida & dura.
fructu glande minori, cetera simili, Steincichen.
Fert autem præter glandem, granum etiam pu-
niceum tanquam sua, & ut aliena viscum ac hy-
phear. Sic enim inquit Theophrastus φέρει πρὸς
τὸν βάλαντον κόκκον ἵνα φοιτικοῦ ἴσχει δὲ
καὶ ἱξίαν καὶ ὑφέαν ὥς ἐστιν ὅτι συμβαίνει
τέτταρας ἅμα καὶ τὸν ἐχέει αὐτὸν δύο μὲν
τὸς ἑαυτῆς. δύο δὲ ἄλλας τὸν περὶ ἱξίας καὶ
δὲ τὸν ὑφέας. καὶ τὴν μὲν ἱξίαν φέρει
πρὸς τῇ ἐκ βογγίαν, τὸ δὲ ὑφέαν ἐκ τῇ
μεσημβρίαν, Glans iligna. πρίνις βάλαντος
Homero ἄκυλον.

Alterum Ilicis genus fruticescit & coccife-
rum est. Duo & huius genera. Vnam minus,
quod

Quod Ilicen Aquifoliam Plinius, Græci κόνκδιον
 uocant. Poloni apud quos copiose nascitur
 Tſcherwitz ſua lingua à rubente grano. Grano
 enim eius puniceo lanæ tinguntur, ex quibus
 Charmefinum textitur & Scharlacum. Vocat
 hoc Plinius quisquilium uel ut aliqui legunt Cuſ-
 culium. Græci κόνκδιον βαφικόν. Vulgo Gra-
 num tinctorum. Figura lentis frutici adheret.
 Quoddam eius genus celerrime ſeſe in Verment
 mutans κωνάκιοτον uocatur. Inde pannus quiſ-
 quilatus uel coccineus, ein Scharlack. Et ſeri-
 cum coccineum, Roter Charmafin. Charmefini
 nomen à Chermes deductum eſt, qua appellatio-
 ne Arabes Granum tinctorum indicant. Alte-
 rum maius eſt & uulgo naſcitur, folio ut prius
 quercino, ſed minore & etiam aculeato ac per-
 petuo uirnte, grano puniceo maiore. Quandoq;
 ad iuſte arboris magnitudinem excreſcit, quan-
 doq; uix fruticum aſſequitur altitudinem.

Suber. ἡ φος ἢ φελός, Pantoffelnholz, Baſt.
 Cortex enim à ſutoribus expeditur ad crepidas.
 Folio naſcitur ilicis, Coma perpetuo uiridi.

φελός γυν ſœminam ilicum faciunt, mediâ
 roboris & ſuberi natura. Folio ſuperi, materiæ
 & cortice cerro cognata eſt.

Gallæ. κικιδίς. Galepffell. Haſ ferunt omnes,
 quæ

quæ glandem. Duo earum precipua genera. Solidæ, ὀμφακίτιδες, parua sunt, nodosæ, ponderosæ, nullo foramine peruiæ. Tûrckische galle apffel, Adferuntur ex Asia & præstant cæteris. Perforatæ grandiores sunt, rotundæ, raræ, leues, insere galle apffel. Erumpunt sole de geminis exeunte.

Viscum, Ἴξο & Ἴξια. Mistell. Nunquam in terra nascitur, semper in arbore, ut quercu, ilice, robore, malo, pyroq; sylvestribus, betula, abiete, larice. Sed quernum præstat omnibus. Resectum Visci fruticem, qui in conclauia auiæularum gracia suspenditur, uocant ein Kerner.

ἄγκύδιδες. Bacca iuniperi. Zwacholter beeren. ἄγκυβος enim Iuniperum significat. Duo eius genera. Pumila iuniperus. Zwacholter stauden. Arborescens iuniperus, Zwacholterbaum. Ex hac liquor extillat colore odoreq; æmulans thus, qui calore duratus coit in gummi. Vocaturq; Vernix, Vierniß.

Ἀφρίδες. Bacca lauri Lorbeeren. Fulmine feriri negatur laurus, & si uratur, strepitum ciet, qualem in flammam coniectus sal.

Vaccinia apud Virgilium cum inquit: Alba
M ligna

ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur, sunt
nigre bacce ligustri, in quas conditus flos matu-
ritate commutatur, die schwarzen beeren abn-
dem mundholtz oder Reen zweiden oder beim-
holtz. Alioquin Vaccinium latinis floris & plan-
ta nomen est, que grecis dicitur βακινιά.
blawe mertzblumblcin.

Per alba ligustra florem intelligit. Ligustrum
κνπζ.

Lentiscina. Resina uel Mastiche. Mastixho-
ner, Fundit hanc Lentiscus.

Malum, μήλορ. Apffel. Malorum plurima
genera.

Mustela mala. μέλιμυλα γλκκνμκλ.
honnigepffel, augstepffel,

Orbiculata mala, η πρζωλκκ μκλ.
Atheo latina imitatione ορβικκλκ. Paradyslein.

μορδίανα, à loco Apolloniæ Mordio deno-
minata, Burstorffer.

Appiana, Kutteneppfel. Odore & magnitu-
dine referunt cotonea.

ορζωμκκκκκκ à mammarum effigie. Schciba-
epffel.

Panucca celeriter marcescunt & in rugas
contrahuntur, Moßepffel.

Acida poma Saure weinlin.

Vinas

Vinacea poma, Grosse vnd Kleine Zweins-
ling.

Claudiana, Grosse rote apffel, qualia in Po-
merania nascuntur.

Petisia, Kleine susse apffel.

Persica, πέρσικα μήλα. Pfersing, ζωστήα
μήλα. Rott vnd geel pfer sing.

Precocia & precoqua Armeniaca. Amarel-
len, Miswachs, quod rarius fructum ferunt &
leui occasione sterilesunt.

ἀγριομήλα. Sylvestria mala. Holtz apffel.

Serica et Zizipha. In Myropolijis iuniba
peregrina uoce.

Mespilus. μεσπίλα, Mispelbaum. Tres spe-
cies Theophrastus recenset, quae notae sunt omnes.

Ἐτάριον, Sathanea, cuius pomum gran-
dus candidus, solutius & molliore intus ac-
norum ligno, uerum sugacius ceteris, cito enim
flaceseit. Gros Mispelbaum. Sathanea mespila,
grosse misseln. Reliquarum specierum studi-
minor, gustu astringentior & uerustatis pau-
tior, Klein Mispelbaum. Gallica mespila, Klein-
misseln. Nominatur enim una ἀνθηδονία, altera
βυλλωδομήνη, id est, anthedoni similis. Hanc Phi-
lipus Gallicam uocat.

Myrta hortensia, μυρτὰ ἢ μυρτίδες. Nigra
bacca myrti, quibus succus uinosus, sapor pipe-
ris. Zwelfsch heidelberen.

Myrta sylvestria, μυρτὰ ἄγρια, nſere ge-
meine heidelberen.

Myxa, μύξα ἔ μύξαγια, in Myropolijſ
Sebeſten.

Mora, μόρα ἢ στυάμινα, Maulberen, Suc-
cus horum uariat. Nam ab ortu ſtatim acerbus
eſt ἔ aquoſus, Pubeſcentibus miteſcit ἔ rube-
ſcit. Exacte maturis uinoſus eſt, ἔ nigricans
ſanguineo colore manus inficit. Morus ipſa no-
uiſſime germinat, ἔ cum poſtremis folia amit-
tit. Fructum primo maturat non omnem ſimul,
ſed alium atq; alium ſubinde.

Mora rubi, μόρα βάτος ἢ ῥάβδα. Brombe-
ren, Kraßbeeren, Frutex ipſe Rubus, βάτος ἢ
χαμασίατος. Brombeerſtrauch.

Mora rubi Idæi. μόρα βάτος ἰδαῖος. Him-
beeren. Et quæ ſpecie fragis ſimilia colore ru-
bent, ſapore Vinum imitantur, Bocksbeeren.

Fraga. Plantæ aut ἑριφύλλου uel etiam πέν-
ταφύλλου innascentur erdbeeren : aut pecu-
liari, humi repenti in locis umbroſis, cuius folia

in multas sunt prætenuēs capillatā fibras. Vnde
ā quibusdam Harbeeren uocantur, Ab aliquibus
Zwaldbeeren & Knickelbeeren. Ex parte una
rubent, alben ab altera. Hæc maiora sunt, illa
minora.

Poterion, ποτῖγιον Kreuselbeeren. Grossel-
beeren.

Rhamnus, Kreuzbeeren staud, Kreuzdorn
Fructu myrti, foris nigro, intus uiridi. Bacca
Rhamni, Kreuzbeeren, Ex eo pigmentum pa-
rant pictores uiride, Safftgrien. Hebræa appel-
latio Rhamni est Atadim, & extat in 58. Psal-
mo.

Opulus, Faulbaum. Baccas gignit racematim
dependentes, primo uirides, maturitate purpu-
rascentes, male olentes, Scheisbeeren.

Diospyros, Baccas fert primo uirides, æstate
rubentes, autumno nigras. Nostri uocant Kalin-
kenbeeren.

Euonymus, Spindelbaum. Florem fert albæ
uiolæ, luteum, in siliquis fastigiatis in angulos qua-
tuor & purpureis grana solida, crocea membra-
na uestitas. Baccas uocamus hanhodleim.

Paliurus, Melbeerenstrauch. Frutex acus-
leatus,

leatus, baccis rubentibus, racematim coherentibus.

ῥεῦζανθα, Sawerdorn, Sawrach, Versich officinarum Berberes.

Rhus obsoniorum, ῥεῦζανθος ἡ ῥεῦζανθα. Vulgo Sumach, Fructus sunt rubentes acinis uuarum similes graciles, densi confertiq; circa caulem Rhus coriariorum, ῥεῦζανθος ῥεῦζανθος, folia sunt plantae oblonga, modice rutila serratim in ambitu per oris incisa.

Rhus Ponticus. Vulgo ribes. Fructus eius ῥεῦζανθος, Iohannes beerlein. Iohannes treublem

Cynosbata καὶ ῥεῦζανθος, Rote beerlein romhagendorn, Frutex aculeatus, odoratus album fert florem, baccas uirides primo, maturitate rubescentes, καὶ ῥεῦζανθος. Columella sentem canis nominat.

Cynorrhoda, καὶ ῥεῦζανθος. Feldrosen. ex baccae rubentes, intus lapideis plenae nucleis ac laevigiosis. Hagenbotten, Arschkizeln.

Oliue, Oleae fructus, Constat oleo, nucleo, carne, amurca.

Oliue caduce, ἄρσενος περὶ τῆς. Baccæ olearum sponte decedentes.

Oliue

Oliuæ conditæ muria, ἄλμαδες uel κολυμα-
βάδες, Oliuæ, adhibentur assaturis condimentæ
gratia.

Oleum maturum, ἔλεος, Reiffenöl, Baumöl.

Oleum crudum, ὠμοῦ ἔλαιον uel ἐμψάκνον,
quod ex immaturis uuis exprimitur.

Palmulæ, φοίνικες, uel ἐάλανοι φοινίκων,
uel δ' ακτυλοὶ, Datteln, Dattelnkern. Ægyptiæ
differunt ab illis, quas Palestina gignit & Sy-
ria, Ille succæ sunt & astringentes. Hæ molles
humidæ & dulces, uocantur ἡ καρύωσι ab effec-
tu. Sunt enim κεφαλαλγῆς & præstantiæ
reliquas superant. Tria harum genera. Νικό-
λαοὶ à Nicolao Peripatetico Damasceno deno-
minati, qui eos quotannis Augusto Romam mit-
tebat. ἁδελφίδες & πᾶνκτοι maximi. Et
πᾶνκτοι uocantur quod cum humore abundant,
copia ruptæ calcatis similes euadunt. Hæ po-
steriores palmule mediam inter Ægyptias &
Syriacas naturam habent. Ægyptiæ ad nos ad-
feruntur.

Nuces pincæ, πιτυίδες Zirbelnüss. Ma-
gnitudine & figura ponticis nucibus similes,
sed longiores. Ligneum putamen squamatis
compactum & subtus excavatum qua nuces
continet, græci κῶλον & σφῆλον uocant. No-
minant & nuces ipsas σφῆλας. Sed arborum

cognatarum σφοδρίως ferentium multa genera.

Pinus, πίτυς, Picea, πεύκη, Differunt coma,
que Picea longior est ramis etiam dependentibus.
Pino breuior. Nucibus, que Picea minores sunt.
Pino maiores. Cono, qui Picea longitudine dor-
drantem, crassicie manum aequat. Pino breuior
compactior & amplior est, Squamis que Picea
tenuis sunt & hiscentes. Pino crassiores duriores
& cumpactae. Pino in germania caremus. Pi-
ceam uocamus zirbelnbaum.

Pinaster syluestris est Pinus. Caremus &
hac.

Picea syluestris conum Picea similem gignit
inque eo minutum & alatum fructum. Eine
fichten.

Abies, ἑλᾶτη Thannen. Conos habet picea
syluestri similes. Duo eius genera. Fœminæ que
prolixior, materia mollior utiliorq; & rotun-
dior, Folia pinnata densaq; Rote thannen. Mæ
deterior est zweisthannen.

Taxus, μίλαξ, σμίλαξ, Eibe, Hæc baccas
fert, cum reliqua genera nucamenta Squamatim
compacta & e ramis paniculorum modo depen-
dentia procreent. Fiunt ex taxo arcus & scor-
piones.

Teda,

Tæda δ' ἄρ'. Kifer, Kienbaum, Flammis gratæ
Pinguissimam eius materiam uocamus germanice
Kien. Tædam latine.

Larix, ein Lerch. Lerchenbaum. Plinius eam
nec ardere nec carbonem facere, nec alio modo
ui ignium consumi tradit. Exudat liquorem,
melleo colore, lentum, nunquam durescentem, quo
utimur pro resina terebinthina. Resina laricea.
Terbenthyn.

Pyra. ἄπια. ὄχνα. ἄπια ὀιονεὶ ἡκιστα πίν
οντα, πρὸς τὸ ἐν διήροισι τόποις φύεσθαι,
quod amant loca arida, ὄχνα ὀιονεὶ ἄχου τι
νες οὐκ εἰ, διὰ τὸ μὴ ποτίεσθαι καὶ πλεονασ
μοῦ τῷ, v, Germanice birnen. Figura pyris tur
binatior.

Pyra superba, χῖα ἢ μισραπίδ' ἰα. Musca
telbirnen. Parua sunt, Ocyßima & odoratissi
ma.

Crustumina gratissima sunt, & ex parte ru
bent. Parißbirnen.

Volema Virgilio. Catoni sumentina & mus
tea. μῦστα. Alantbirnen, Pfaltzgrawerbir
nen.

Falerna seu lactea. Largo succo abundant,
Speckbirnen.

Mespilacea pyra, Steimbirnen. Duros enim
nucleos mespilorum instar habent.

Præcocia pyra, Haberbirnen Jacobsbirnen.
Turbinata pyra, Zappenbirnen.

Mustea à dulci & mellio sapore. Honigbir-
nen.

Scrotina ad hyemen usq; in arbore perdur-
rant, Winterbirnen, Mertensbirnen.

Mammosa pyra, Frauenbirnen.

Dolabellina, Regelsbirnen.

Nuces Myristicæ. κάρυα μυριστικά, vel μο-
χοκάρυα vel μοχοκαρύδια, nuces unguen-
tarie & odorate, Vulgo nuces Muscate, Mus-
katnuss.

Nuces indicæ, κάρυα Ἰνδικά : Indianisch
nuss.

Tribuli aquatici, Wassernuss, Spitznuss.

Pistacea. πισάκια, Vulgo Fistica, Pistacien,
ex Syria adferuntur, Nucleis pincis similia
sunt.

Cubebe, κόμπεβα, Cubeben.

Pruna. κοκκίμυδα vel πέρυμα apud Gas-
lenum, Pflaumen.

Pruna Damascena πέρυμα δαμάσκηνα
Bzāhna

Ῥοδάκοντα, quibus cum careamus utimur Vngaricis ungerisch pflaumen.

Pruna Iberica, κοκκίμηλα καὶ τὸ Ῥοδίον. Ea parte qua solem respiciunt purpureum colorem concipiunt, auersa candicant. Grosse zweinling. Vtraq; ubi maturuerunt decerpta & siccata ac tosta aliquantulum solis uel furni calore aduehantur ad nos.

Pruna cerea uel cerina. Gelespilling. Eorum quedam ouum magnitudine aquant, Grosse spilling.

Pruna Iuliana, Coerulea sunt & confertim ex ramis dependent suis, Kleine zweinling.

Pruna Asinina, Rosspflaumen. Purpurea sunt, mollia, maiuscula, & carne constant copiosa, laxa & humida, ideoq; facillime putredini obnoxia.

Pruna onychina. Thalnigel, Kleine braune Pflaumlein.

Pruna syluestria, ἄγριοκοκκίμηλα. schleem. Frutic. in ipsum Virgilius Spinum uocat, cum inquit. Spinos iam pruna ferentes. Aculeis enim horret præacutis. Schleendorn,

Mala punica, ῥοδάκοντα Vulgo granata. Granatle
epffel.

epffel. Sic dicta quod numerosis granorum
acinis intus ceu facta sunt, quibus color ex ru-
bore purpurascens, pellucidus, gratus admodum.
Galenus tria genera recenset, etsi plura alij.

Acida, φοῖοι ὀξύα, Dulcia, γλυκύα. Aus-
stera, ἀυσήρα.

Balaustia flores mali punici oblongi, calathi
effigie, coloris punicei, nitidi. Et Medicis idonea
sunt et tingendis uestibus.

Cytini, κῦτινοι αἱ πρῶτόγονοι φοῖοι. Pri-
mogenita mala punica, quæ circa ucris finem ge-
nerantur et uel sponte decidunt uel decutiuntur
uentis, vnreisse granat.epffel.

Σίστιον, Malicorium. Corium seu membrana
seu cortex, quo grana ordine digesta continentur.
Durius enim putamen malis punicis et lignosius
quam ceteris.

φοῖοι σκληρόκοκοι, quibus nuclei intus du-
ri et lignosi.

φοῖοι ἀπύγενοι, quibus aut nulli aut mi-
nimi.

Siliquæ. κορῶνα, et ἐυλέγατα, à corniculi
similitudine fructus Ceratonie arboris, seu po-
tius dulces siliquæ, quæ semen quod nec ligneum
est.

est nec carneum nec cartilagineum continent.
Iohannis brot.

Sorba, ὄξα & ὄβα Sorbepffel, Sporepffel,
Eschroßlein. Plura eorum genera, Quibusdam
enim mali rotunditas, alijs turbinatio pyri, alijs
ouata species. Est & quoddam genus, quod tora-
minale uocatur, Frucht vom wilden sferwera
baum. Et Sorbus Aucuparia, Ebrischbeeren.

Arbutus, Vnedo, κώμαρος, In Germania non
nascitur. Fructus eius pruni magnitudine figura
fragis respondet, intus habens paleacea grana,
sed gustu in iucunda. Grosse dwelsche erdbeeren.
Fructum μεμαίκυλον uocant.

Fraxinus. μέλια, Asche, Duo eius genera,
Vna procera enodis, teres, quam momanam uo-
cant, Buchaschen. Altera breuis, durior & fu-
scior, Steinaschen. Campestris fraxinus, Fiunt ex
fraxino haste praelonge, Quare & Homeri
præconio & Achillis hasta nobilitata est.

Tilia. Είλυα, Linde.

Acer, σφένδαμνος, Ahorn, Tria eius ge-
nera. Campestre quod σφένδαμνος generis
nomine & γλινος uocant Græci, Plinius Galli-
cum, Candidum est & non crispum, Zweisbew-
menholz, Masholter, Momanum, quod κλινότρο-

χος

ἄϋρ γράκι uocant, durius est & crispo uenarum
macularumq; discursu elegans, Ahorn, Tercium
ζυγίαρ γράκι uocant. Carpinum Plinius. Vulgo
etiam Ahorn nominant, Quidam breitolbern.

Bruscum & molluscum tubera sunt aceris,
Elader von ahorn. Bruscum intortius crispum.
Molluscum simplicius sparsum est.

Vlmus. πῆλέα, Duum generum est. Monta-
na Vlmus ὄξῃ πῆλέα, Ilmenbaum. Campestris.
πῆλέα simpliciter, Rusternholz, illa amplior &
procerior, hæc fruticosior est.

Populus, αὔρα, Tria eius genera Populus
alba. αὔρα ἢ λευκή, Döeispappe-weiden.
Döeisalberbaum. Folia enim inferiore parte can-
dicant. Populus nigra, ἢ αὔρα absolute, Pap-
pelweiden. Populus lybica. Äßpen.

Alnus. κλήβεα, Erlenbaum.

Betula. σκνῦσα, Bircke. Caudicem eius pri-
mo uere rustici terebro perforant, ut liquorem
eliciant inde, quem fundit copiosum. Adfirmant
liquorem illum magna ui calculos renum & Ve-
sicæ comminuere, ac maculas faciei & corporis
emendare atq; extergere.

Tamarix, μυζίκη Tamarischen. Ex ligno ei-
us pocula fiunt.

Erica, Heiden.

Hedera

Hedera, νῖος Θ', Ephem.

Salix, ἰτέα, Weiden. Salicum differentia
plures.

Amerinae salices, Werben, Salweiden. Cortice
et folio cano ac subcinericio, uirgas emittunt
seguacis ad texturas sepium lenticie et uicturas.
Primo uere gemmas protrudunt cana lanugine
molles,

Græce et Viminæ salices, Rotweiden. Cor-
tice purpurascente uirgas emittunt prætenues,
flexibiles, et uinciendis rebus alijs texendisq;
uiminibus spectabili subtilitate.

Vitellinae salices. Gelbe Weiden. Sandwei-
den, Cortice flavescente ad ripas aquarum na-
scentur.

Amerinae candidæ. bruchweiden, Weiße Wei-
den. Cortice albescente uirgas edunt fragiles,

Ebenus, Frantzosenholz. Guaiacum, Cognatum enim Ebeno Guaiacum est. Vox Ebeni He-
brea est ab Eben ex. quasi lignum lapideum. So-
lidum enim est spissumq; et graue, ut et buxus,
Neutra in aquis fluitat.

Buxus, buchsbaum, πύξος.

Fungi, μανιτζες, Generaliter à Germanis
uocantur Schwämme. Duo eorum prima genera.
Alij enim ῥώσιμοι sunt. Alij φθαζένοι. Sed
utriusq; generis species multe.

Ex eorum genere qui esui sunt, nomina habent.

Fungi lactei, quibus piperis sapor & succus lacteus, Pfifferling.

Boleti Pütz.

Fungi Suilli, Pfifferling, Reiske. Sed uenentorum plurima genera ut fungi betulacei. Fliegen schwemme. Sub Betulis enim nascuntur in candido & ruffo colore uarij,

Santalum, Sandelholz. Tria eius genera. Citrinum, Album, & Rubrum. Hoc postremum Aspalatho ueterum uidetur esse cognatum.

Bersilicum. Bresilling, & Bresilium, Lignum teres & enode, tenui uestitum cortice, subter materie dilutiore purpura rutilante.

Agallochum. ξυλόχλος, Paradisholz. Agallochi appellatio Hebraea est. Composita ex ez & aloach, & sonat tandunem ac lignum aloes.

APPEL



APPELLATIONES FLORVM QVORVNDAM CO- RONARIORVM, QVI GRÆ.

cis sunt Ἰνδὸν σεφά-
ρωμαῖνα.

Amaranthus. Ἰνδὸν μαγαίρεος. Duum
generum. Vnum purpurco flore uelut spi-
ca. Amaranthus purpureus. Blümlein der lieb.
Alterum citrinio flore, quod & syluestre est.
Dioscoridi helychryson. Gaze aurelia. Reine
blümlein.

Bellis. Duum generum, Hortensis & sylue-
stris. Bellis syluestris, Weiße mertzblümlein, Bellis
hortensis. Tausentschön.

Ranunculi syluestres & hortenses. Gelbe
schmalzblumen.

Cacalia, Meyenblümlein, Liliū conuallium.

Narciſi, quorum flores aut candidi aut lutei
sunt. Gelbe und Weiße mertzblumen.

Hyacinthi. Vaccinia. Blaw und braune mertz-
blümlein.

Viola purpurea, ia, Blawe violen.

Viola alba et lutea, Ankoia, Weiss und gel-
be violen.

N

Lychnis

Lychnis coronaria, λυχνίς στεφανωμένη
Negelen, halb rind fülle.

Verbascula φλομίσσες. Himmelschlüssel
Calthæ, Ringelblumen.

Otbonnæ, Indianisch Negeln.

Flores Teucrij, vorgiß mein nicht

Flores Echij palustris, Ihe lenger ihe lieber.

Lychnitides & *thryallides*. Sammatrosen.

Marienrosen, *Damaskenrosen*. *Verbascula coronaria*.

Rose, Rosen. *Quarum multa genera*.

APPELLATIONES
RERVM METALLICARVM
AVTORE GEORGIO
AGRICOLA.

A.

A Chates, achat.

Acidula, sauerling oder saurborn.

Acies, Scherff, auch stael, id est, σάμωμα

Adamas, demut

Aduſtus locus, Ein gegend die gebrant hat,

Aeris flos, Kupfferbraun

Aeris squama, Kupfferhammerschlag oder Kess
selbraun

Aerugo

Erugo, Grünspan oder Spanschgrün, quod pri-
mo ab Hispanis ad Germanos sit allata. *bar-*
bari nominant uiride eris.

Aes, Kupffer

Aes purum fossile, gedigen kupffer

Aes sui coloris, rot Kupffer

Aes rude plumbei coloris, Kupfferglas ertz

Aes album, weis Kupffer

Aes nigrum, schwarz Kupffer

Aes luteum, gelb Kupffer

Aes caldarium, lebeter Kupffer

Aetites, adlerstein

Alana terra, gelerbolos

Alectorix, Kappaunsteine

Alumen, alaun

Alumen fossile, alaun folge

Alumen coctum, gesottener alaun

Aluminis uena, alaun ertz

Alueus, trock

Amethystus, ein orientischer Amethyst

Amiantus, federweis, pliant, salamanderhar *bar-*

bari uocant amentum amarum.

Ammochrysos, straggold, oder Katengold

Ammonites, ragenstein

Ampelitis, steinkolen

Apnis, ein gros fließend wasser

Anthrax, siue uena minij, Quecksilberertz.
 Aqua, Wasser.
 Aqua seri colore, ein molken oder schottenfarb
 Wasser.
 Aqua nigra Schwartz Wasser.
 Aqua rubra, rot Wasser.
 Aqua uiridis, grün Wasser.
 Aqua caerulea, blau Wasser.
 Aqua salsa saltz Wasser.
 Aqua nitrosa, Nitter Wasser.
 Aqua aluminosa, alaun Wasser.
 Aqua atramento infecta, Wasser mit kupffer
 Wasser gemischt.
 Aqua sulfureosa, schwefelicht Wasser.
 Aqua bituminata, Wasser mit bergwachs oder
 petroleum vermischet.
 Aqua metallica, metallisch Wasser.
 Aqua byrite infecta, kistig Wasser
 Aqua calida, Warm bad, quia plerumq; balneo
 rum usum prebet.
 Aqua fontana, brun Wasser.
 Aqua putcalis, zihbrun Wasser.
 Aqua fluuiialis, gros fließend Wasser.
 Aqua riui, bach Wasser.
 Aqua niualis, schnee Wasser.
 Aqua glacialis, Eis Wasser.
 Aqua lacustris, sch Wasser.

Aqua pas

Aqua palustris, mor Wasser

Aqua lacunarum, lachen Wasser

Aqua marina, Meer Wasser.

Aqua cisternarum, gesamlet Wasser.

Aqua piscinarum, teich, oder zweier Wasser.

Arbusculæ lapidibus bituminosis agnatæ, Kleine
meer baumelcin

Ardentes montes, brinnend berge

Arena, sandt

Arena fossilis, Grabe sandt

Arena fluviatica, Wasser sandt

Arena Marina, Meer sandt.

Argentare, vber silbern

Argentum, silber

Argentum quod statim est suum: quod purum in
uenis reperitur, gedigen silber

Argentum rude, gedigen silber ertz

Argentum rude plumbei coloris, glas ertz

Argentum rude rubrum, Rot gold ertz

Hoc nomen primo impositum fuit ei quod
aurum in se continebat: quale reperitur in
Carpato monte. Deinde eodem nomine ap-
pellatum est id in quo argentum tantum in-
est.

Argentum album, zweis rot gülden ertz, denn es
ist frisch, zweis oftmals rot gülden ertz pfler-
get sein.

Argentum rude rubrum translucidum, durchsichtig
 rot gülden ertz
 Argentum rude nigrum, gedigen schwarz ertz
 Argentum rude cineraceum, gedigen grau ertz
 Argentum rude purpureum, gedigen braun ertz
 Argentum rude luteum, gedigen geel ertz
 Argentum rude iecoris colore, gedigen leberfar-
 big ertz
 Argentum uiuum, quecksilber
 Argentum uiuum sui coloris, uel purum fossile
 gedigen quecksilber
 Argilla, than
 Armatura, harnisch
 Armenium, blawschiffergrün
 Asterios, weise
 Astroites, azstein
 Atramentum sutorium, Kupffer zwasser
 Atramentum sutorium fossile, bergkupffer wasser
 Atramentum sutorium coctum, gesotten Kupffer
 zwasser (wasser
 Atramentum sutorium candidum, weis Kupffer
 Atramentum sutoriū uiride, grün kupffer wasser
 Atramentū sutorū cæruleū, blaw kupffer wasser
 Atramentum sutorium in uiridi cæruleum, grün-
 bla'wlicht Kupffer zwasser
 Atramentū sutorium candidum tenue, die blume
 Aura pestilens, schwaden

Auri

Auri pigmentum auripigment, oder operment

Aurum; gold

Aurum purum fossile, gedigen gold

Aurum obrizum, uel ἄπυρον, fein gold

Aurum argentatum, uel λευκόν, zweis gold

Aurum netum, gezogen gold

B

Blemnites, Alpschos

Saxonum lingua, Alfscht

Beli oculus, belokel

Berillus, bryll

Bisemutum siue plumbum cinereum, bismut

Bitumen, bergwachs

Bitumen, liquidum, fließent bergwachs oder ther
oder petroleum

Bitumen Iudaicum, lüdisch bergwachs, oder
asphaltus

Bituminosi carbones, steinkolen

Bituminosi carbones molles, weich steinkolen

Bituminosi carbones duri, pechsteinkolen, quia
plerunq; pici similes sunt nigri.

Bituminosus pulvis, lesch. fit in istis locis, in qui-
bus hoc bitumen ardet.

Brontia, donnerstein. Wetterstein, gros Krottens-
stein

C

Cadmia fossilis, calmei, laqis calaminaris

Cadmia metallica, Kobelt

N 4

Cadmia

Cadmia fornacum, Miltlere vnd obere offena
bruche

Cementum, maurstein.

Ceruleum, lasur

Ceruleum fossile, berg lasur

Ceruleum facticium, Gemein lasur, vnd vltima
marin

Calx, Kalch

Calx uiua, vngelochter Kalch

Canales uenarum, genge

Caput fodinarum, fund grube

Carbones bituminosi, steinkohlen

Carbunculus amethystizon, rubin

Carbunculus candidus, Ballas

Carbunculus rubes paruus, spinel

Carbunculus Carchedonius, granat

Carbunculus Alabandicus, almandin

Carbunculus Træxenius, amandin.

Carrus, Karren

Carris quod extractum est, euehere, mit dem
Karn lauffen vnd drecken.

Casa, Kaw

Cataracta, Swasserfall, ader am lauffen

Catilli quibus utuntur qui uenas uel metalla in
fornaculis excoquunt, Schirbel

Catini trianguli, quibus fabri qui cudunt argen-
tum utuntur, Gistigel

Ceraus

Ceraunia, der glatte donnerstein, oder der glatte
 Wetterstein, oder der glatte gros krottenstein
Cerussa, pleyweis
Cerussa cinerea, pleyasch
Cerussa ex plumbo candido facta spanisch weis
Chalcitis, rot atrament
Charadra, wasserris
Chelidonia, schwalbensteine
Chelonitides, kleine Krötensteine
Chrysoberyllus, ein Chrysolithos
Chrysocolla, berggrün und schifergrün
Chrysocolla, ex nitro confecta, Borras
Chrysolithus, ein iacint
Cimolia, uulgo terra saponaria. Hanc iſſdem no-
 minibus appellant Germani, quibus aliorum
 colorum terras fullonum.
Cinaberis, siue minium facticium, cinober
Cos, wetzstein
Cotricula, goldstein
Creta, Kreide,
Creta uiridis, grüne Kreide
Creta nigra, schwartze Kreide
Crystallus, Crystall
Crystallus luteo citri colore fulgens, citrin
Crystalli duæ conglutinatæ & cinabari tinæ
 ein Meilendisck duplet
Cryptæ, strecken.

Ctenites, Kampstein

Kvavop, lasur

Cyanos, sapphir

Cyanos mas, ein blauer sapphir

Cyanos foemina, ein weisser sapphir

Cuniculus, stoltz

Cuniculum in montem agere, ein stoltz treiben

D

Dæmon metallicus, das bergmenlein

Declive montis, das gehenge des gebirgs

Demensum, mas

Diphryges, vudere offenbrüche, sonderlich in
den öfen da man Kupffer macht

Duumiuri iurati, zwene geschwornen die ein ge-
birge besähen

E

Ebenum, Erdstöcklein

Encrinor, Lilgestein

Enhydros, schwitterstein

Enostos, Knochenstein.

Enorchis, hodenstein

Eristalis, wese. Germani hoc suo uocabulo plu-
res gemmas nominant.

Excoquere, schmeltzen

Exhalatio, ausbredung, auch dunst

Expiratio, idem

Exhalatio ardens, Zwitterung

Ferrum

Ferrum, eisen

Ferrum purum, gedigen eisen

Ferri squama, eisen hammerschlag

Ferri uena, eisen ertz

Ferri uena iecoris colore, leber ertz

Ferrugo, rust

Fibra, Kluffte

Fibra transuersa, Kreutzkluffte

Fibra obliqua, querkluffte

Fibra que se uenis paulatim iungit, scherkluffte

Fibra que uenis incumbit, hengkluffte

Figulus, töpffer, oder haffner

Figlina opera, töpfferwerck

Flos æris, Kupfferbraun

Fluores, flusse

Fluuus, ein gros fließent wasser

Fluuus ubi toti conduntur, erdsal
ubi partim strudel, oder zwirbel

Fluuus fons, das gesprenge

Fons, born, oder bron

Fontes ubi se condunt, erdsal

Fodina, grube, oder zech

Fodinam colere, ein zech bauen

Descendere in fodinam, einfaren

Fodinam, quantumuis argento foecundam pro
pter dæmonem metallicum deferere, Ein funde

dige

dige zech des Bergmenleins 'halben ligen laß
sen

Fornacula, in qua excoquitur uena uel metallum
ein probierofen

Fossa, schorff.

Fossam agere, schorffen

G

GAgates, schwarzzer agatstein oder aidstein
Gangitis, idem.

Galactites, milchstein

Geodes, adlerstein.

Nam Germani non distinguunt ab aetite, ut
nec Græci omnes distinxerunt.

Galena, glantz vnd bley erz

Galena inanis, blende

Gemmae, edelgestein

Glacies, eis

Glacies indurata, gletscher, wie man in Alpibus
vff den schneebergen findet

Glarea, steinbrück

Glossopetra nigricans, natterzünglein

Gypsum, gips, ader sparkalck

H

Hæmitates, blutstein

Halcyonium, spuma marina, rotundum
tamen pila marina

Hali-

Halinitrum, salpeter.

Halitus, feuchter dunst.

Hieracites, habichtstein.

Humores, beide die zweifrichte und safftige feuchtigkeit.

Hyacinthus, ein Äthiopischer, Meisnischer, oder Behemischer amethyst.

I

I Aecus, das ligende.

I Iaspis, iaspis.

I Iaspis borca, Turckis.

I Ignis subterraneus, erdfeur.

I Imber. regen.

I Inaurare, vbergülden.

I Incoquere, vbersilbern, oberwercken, vberzinnen.

I Insulae natantes schwarten.

I Iurati, die geschwornen.

L

L Acuna, Lache plerung.

L Lacus, see.

L Lapidēs qui igni liqueſcunt primi generis, ſchöne flusse: ſecundi flusse zum ſchmelzen ſtock quertz: tertij querne. oder Kiſelſtein.

L Lapis ſiue ſimplex, ſiue miſtus, ſiue compoſitus fuerit, ſtein.

L Lapis ſalfus, ſaltziger ſtein.

Lapis

Lapis nitrosus, nitrisch stein
 Lapis halinitri refertus, salpetrisch stein
 Lapis aluminosus, alaunisch stein
 Lapis atramenti sutorij plenus, Kupfferweiss
 Lapis Metallicus, ertz (gerstein)
 Lapis metallicus aurarius, gold ertz
 aurarius Kupffer ertz
 argentarius, silber ertz
 ferrarius, eisen ertz
 Lapis sulfureus, schwefelichter stein
 Lapis bituminosus, bergwechlichtiger stein.
 Lapis Iudaicus, Iuden stein.
 Lapis Obsidianus, schwarzer agat stein, oder
 Lapis Thracius, idem (aidstein)
 Lapis plumbarius, glantz
 Lapis specularis, vnser lieben frawen eis, spat
 Itali lumen de scaiola
 Lapis ex pyrite conflatus, stein
 Lapilli nigri ex quibus conflatur plumbum cano
 didum, zwitter.
 Lateres, ziegel
 qui Lateres ducunt, ziegelstreicher
 Ligo, Keil haw
 Lythargyrum, glet
 Lychuis, ein gilbichter rubin

M M
 Machina seu instrumentum tractorium
 Hassel Magi

Magister Metallicorum, Bergmeister

Magnes, siegelstein, oder magnet

Magnetis, silberweis, alibi appellatur Katzenfieber, alibi glimer, alibi talck

Malleus. berghammer, oder feustel

Maltha, rôte Marga mergell

Marga in saxis inclusa, steinmarck

si liquida fuerit, fließende steinmarck

Maris flos, Græce ἄλως ἄνθος, dwolracm, oder sperma ceti

Marmor, marmelstein

Marmora non habent singularia nomina, sed uel ex coloribus, qui eis insident, uel ex regionibus in quibus nascuntur, nominantur.

Marmor in metallis repertum, spat

Marmor Alabastrites, alabaster.

Medulla saxi, steinmarck

Melauteria, grau und schwarz atrament

Melitites, honigstein

Metallum, metall und bergwerck

Metallum gigni, ertz wachsen

Metallum inuenire, ertz treffen

Metallum fodere, effodere, eruere, ertz haben

Metallum aliquod perfectum in suis uenis reperire, gedigen ertz treffen.

Metallum aliquod sub summo cespite inuenire, ertz am tage treffen.

Metale

Metallum torrere, rosten
urere, brennen
tundere, pochen
molere, malen.
lauare, waschen.

Metallici, bergleute

Metallici hi auri pestilenti perierunt, diese berg-
leut hat der schwaden getödtet

Metallici huiusmodi interierunt, diese hat der berg
versellet und erschlagen

Metallice rei operam dare, bergwerck bawen

Metallice rei gnarus, metallice rei intelligentis
præstans, ein vorstendiger bergman

Mica glimmer, oder Katzen Silber.

Minium nativum, bergzinnober

Minium secundarium, mennig, quo nomine etiam
appellatur sandix.

Misy, gelatrament

Modulus, Kobel

Molibdæna, idem quod plumbago

Molochites, molochit

Morion, Germani appellant communi nomine
flus.

Murrhina, chalcædonius

Myites, muschelstein.

Nitrum, Tincar, oder niter.

Obsidianus lapis, schwarzer aidstein
 Ochra nativa, siue Silbergeel, oder ochrageel

Ochra facticia, siue plumbaria, pleigeel
 Officinæ in quibus metalla excoquuntur, hütten
 Officinæ in quibus argentum ab ære separatur.
 seiger hütten.

Ollæ effossæ, erd töpffe.

Ombria, zweiterstein, donnerstein, gros Krotten

Onyx, onychel, vnd auch Chalcedonius (stein

Opalus, wese

nam Germani, ut dixi, hoc nomine plures
 gemmas adpellant.

Orgya, lachter

Orichalcum, meeßing

Ostracias altera, luxsaphir.

Ostracites, töpffstein

P

Pæderos, wese,

Germani enim non unam Gemmam sic no-
 Palus, moes oder mör (minane

Inter Visurgim autem & Rhenum paludes
 nobiles illæ sunt, ad quas Varus cum duabus
 legionibus est cæsus, quorum militum ossa
 alio translata sunt iussu Germanici Caesaris,
 quod indicat hæc inscriptio nuper in Hispani-

nia Hellenena inuenta, & ab amico quodam ad
me missa.

OSSA MIL. V. ET XX. LEG.
CV. M. QVINTIL. INTERFECT.
IVSSV GERMANICI IMP. HVC
COLLATA QVIESCVNT.

Panes æris, stücke scheiben

Panes ex pyrite conflat, stein

Pangonius, ein z welfschichter crystall

Parietes fornacei, dreckmauren

Partes, Kuckes oder teil

Pendens, das hangende

Plastes, der bild werck aus than macht

πλαταῖνες & πλακες, bette

Plumbago metallica, pley erzpleisch weis

Plumbago fornacum, herd bley

Plumbarius lapis, glantz

Plumbum candidum, album argentarium, zin

Plumbum cinereum, bismut

Plumbum nigrum, bley

Pnigitis, schwarze Kreid

Pompholyx fornacum, zweisser hüttenrauch, als
rber dem garherde und rber dem Kupffer=
ofen, nil album

Pompholyx subterranea uel fossilis, zweisser erd,
oder zechen rauch

Pontis

Pontica, nennet man auch Achaten.

Præses fodina, steiger oder hütman

Præfectus rationibus, schichtmeister

Prasius, pras

Pumex, pims oder Kraustein

attamen lapides ex saxo arenario facti, quibus affricamus pedes, etiam adpellantur.

Kraustein.

Puteus siue specus, schacht

Puteum aliquem inchoare, ein schacht anfahren

Puteum fodere, ein schacht sincken

Puteum ueterem instaurare, ein alte pinge geweldigen

Puteus hic multum aquæ habet, diese zech ist
Wasser nötig

Puteus hic in maxima altitudine aridus est, diese
zeche hat in grosser tieffe nicht Wasser

Pyramis, edificium super puteum extructum, ein
Keppel

Pyrites, Kyß

Pyrites argenteo colore, wasser oder zweisserkys

Pyrites aurco colore, geelkis, oder Kupfferkis

Pyrites prorsus aurei coloris, ein kis der ein farb
hat wie fein gold

Pyrites colore galena similis, ein glantziger kis

Pyrites cineraceus, ein grawerkis

Pyrites atramenti sutorij parens, atramentstein.

R

Recrementum metalli, schlacken
 Recrementum auri, goldschlacken
 Recrementum argenti, silberschlacken
 Recrementum eris, Kuppferschlacken
 Recrementum plumbi candidi, zinschlacken
 Recrementum plumbi nigri, bleischlacken
 Recrementum blumbi cinerei, safferfarb
 Recrementum ferri, sinder
 Recrementum vitri, glaßgallen
 Riuis, bach
 Riuis ubi se condit, erdfal
 Rubrica fabrilis natia, bergrotel.
 Rubrica fabrilis facticia, rottel

S

Sabulum, Gris
 Sal, saltz
 Sal fossilis, berg saltz
 Sal fossilis pellucens, salgemma
 Sal marinus, baifaltz, oder meerfaltz
 Sal lacustris, schfaltz
 Sal excoctus, gesotten saltz
 Sal ammoniacus, salarmoniac
 Sandaraca uera, reusch geel, oder roßgeel
 nam Itali colorem rubrum appellant rossum.
 Sic Fridericus Impetor dictus est ab eis
 Barbarossa, quia rubram haberet barbam

Sana

Sandaraca non uera in metallis reperta, bergroß

Sandaraca facticia apud Vitruuium idem quod
sandix, menning

Sandaistros, ein iacint darin viel funcken leuchten

Sandyx, menning

non colore, sed conficiendi ratione differt à
minio secundario.

Sapphirus, ein gold sapphir

Sarda, Carneol

Sardonyx, partim carneol, partim onychel

Saxum, Zwerckstücke

Saxum arenarium, sandstein, rogenstein

Saxum molare, mülstein, duorum generum

Saxi alterum genus, Zwerckstein, schlemstein

Saxum fissile, Schifer

Saxum culcarium, Kalckstein

Schistos, blutstein

nam Germani non distinguunt eum ab hæmatite.

Sil, ochrageel

Silex, hornstein, feurstein

Smaragdus, Smarag, oder smaral

Smyris, smirgel

Sory grax und schwarz atrament

Specus, schacht, auch gruffe

Speculæ fornacæ, dreckwarten

Spelunca. gruffe
 Spodos cinerea, grauer hüttenrauch, nil griseum
 Spodos lutea, geeler hüttenrauch als vber dem
 treibe herde
 Spodos subterranea cinerea, geeler zechenrauch
 Spodos subterranea nigra, schwartzer zechen
 rauch, auff dem Altenberge nennet man in
 Kis
 Spodos subterranea uiridis, grauer zechenrauch
 Spodos subterranea lutea, geeler hüttenrauch
 Spongites, lapis spongi.e, schwammenstein
 Squama eris, Kupfferhammerschlag vnd Kessel-
 braun
 Squama ferri, eisenhammerschlag
 Squama stomomatis, stahel hammerschlag
 Stannum, werck
 Stibi, spiesglas
 Στήλαι, bencke auch seulen, Latine pile & co-
 lumne
 Stomoma, stahel
 Strombites, schneckenstein
 Structure subterranea, berg gobende
 Succinum candidum, weisser aidstein
 Succinum cerei coloris, geeler aidstein
 quo nomine appellantur reliquorum colorum
 succina, præter cinereum, grauer aidstein
 Succu liquidus, fließender safft

Succus concretus, harter saßſſe
Succus lapideſcens, ſteinsaffſe
Symbolum, zupus
Symbolum dare, zupus geben

T

Tegula quibus utuntur qui uenas uel metalla
in fornacibus excoquunt, müßel

Terminus, lochſtein

Terra lutoſa, lette

Terra lutoſa candida, zweißer lette

cinerea, grauerlette

nigra, ſchwarzerlette

lutea, geclerlette

cærulea, blauerlette

uiridis, grüner lette

Terra ſicca cinerea, greus

nigra, ſchwertze

lutea, gilbe

Purpurea, braune

Terra ſalfa, ſaltzig erdreich

Terra nitroſa, nitriſch erdreich

Terra halinitri plena, ſalpeteriſch erdreich

aluminosa, alauniſch erdreich

atramenti plena, Kupfferweſſericht erdreich

ſulfuroſa, ſchwefelicht erdrich

bituminosa, bergwechſig erdrich

Terra arenosa, sandig erdreich
fabulosa, grüßig erdreich
glareosa, steinbrüchicht erdreich
lapidosa, steinricht erdreich
calculosa

metallica, metallisch erdreich, ertz
metallica auraria, gold ertz

argentaria, silber ertz
cupraria, Kupffer ertz
ferraria, eisen ertz

Terra fullonum, ful erd
id est terra fullonum, ut nomen partim ex latino duxerit, oder zwisch erde, oder zwalkelet, oder seifferde, oder seiffgang

Terra singularis, than

Terra Alana, geeler bolus

Terræ motus, erdbidem

Theophrastes, das theil des magneten das das eisen
von sich bleib

Topazius, topas

Tophus, toffstein, oder topstein

Thracius lapis, schwarzer aidstein

Tripela, tripel

Trochites, spangen oder redeytein

Tumulus ē sodina egestus, halde

Vapor

Vapor, truckener dunst
Vapores ardentes, erbische Zwitterung

Vena, gang

Vena diues argenti, argenti fertilis, ein silber-
reicher gang

sic etiam de alijs metallis dicitur.

Vena minij, quecksilber erz

Venas scrutari & perquirere, gong ausrichten

Vene extensio, das streichen des ganges

Vene caput, das ausgehen des ganges

Venarum fibræ, Klüffte

Venarum canales, genge

Vena que aliam per transversum secat, ein
creutzgang

Vena obliqua, ein querchgang

Venula idem quod fibræ, Klüffte

Virgula diuina, rut

Virgula diuina uenas quærere & perquirere,
mit der rut gehen

Vitrum quo tingitur argentum, schmelz glas

Vitrum quo tingitur aurum rubro colore, rit-
kle

Non inanis curiositas est, ut multi in-
epti existimant, discere antiquitatis ponde-
ra, mensuras, precia, nomismatum, et multas alias

rerum appellationes, Sed cum sæpe in doctrina
Ecclesiæ, in arte medica, in historijs, in legibus,
uera interpretatio talium uocabulorum lectioni
magnam lucem adferat, manifestum est, hanc in-
quisitionem utilem esse, & nequaquam negli-
gendam. Ideo hic exiguus Libellus sæpe editus
est, ut tanquam parua Tabella multis familiaris
esset, & à iunioribus inspicere mox posset, cum pon-
dera ueterum aut mensuras ignotas legunt.

Nequaquam contemnendum est præceptum
in capite Exodi tricesimo, ut singuli Israëlita
nati annos uiginti quotannis penderent taber-
naculo dimidium Sicli argentei, id est, duas ar-
genti drachmas.

Hic dicit aliquis agrestis & literarum ho-
stis, Nihil plus refert me hæc Iudaica pondera
nosse, quam scire, cur Æginetæ insculpserint no-
mismati testudinem, unde in ueteri uersu dictum
est.

τὰ βάρη τῶν καὶ τὰ σοφιστικὰν χελώναι,

Imo uero, & si politiam Iudaicam ad nos
non pertinere Deus eo ostendit, quòd non solum
euerfa & deleta sunt oppida, quæ politie illius
domicilia fuerunt, Sed etiam cunis eorum. & ru-
dera

dera ante multa secula in auras dissipata sunt, tamen extare libros Deus uoluit, & exempla inde utilia, si dextre intelligantur, multa sumi possunt. Ac ut de illa pensione loquamur. Sicut uoluit Deus singulos conferre didrachmum ad conseruationem tabernaculi seu templi, ita postulat non ab illis tantum, sed ab omnibus in toto genere humano, omnibus temporibus, ut Ecclesie & ministerij conseruationem suo quisq; loco, & profacultatum modo adiuuet. Ad hanc commonescitionem necessariam Ecclesie exemplum illud de siclo referatur.

Deinde pensionis mediocritatem considera, quod ad singulos attinet. Exiguam esse stipem, quam facile pendere etiam inopes poterant, intellecto uocabulo, intelliges. Duæ enim drachmæ argenti ualent quarta aurei rhenani parte. Nec quero nunc exactissimam estimationem. Tantum ad hunc usum comparcere etiam tenuis pauperfamilias toto anno sine magna difficultate potuit. Ita sit modus in constituenda stipite, Et tamen quantum aceruum faciebat multitudinis collatio.

Quadringenta millia hominum pendebant centum millia nostrorum aureorum. Erat autem numerus ciuium in Israël multo maior.

Vole.

Volebat igitur Deus hac tanta pecunia conseruari templum, alij doctores & discentes, in serui libris & alijs necessarijs monumentis totum illud collegium, iuuari egenos, etate & morbis confectos sacerdotes, & orphanos. Sæpe etiam inde opem ferri uniuersæ Reipub. in bellis & fame. Nam in qualibet seu magna, seu parua gubernatione ad multiplices usus pecunia opus est.

Cum autem Romani postea metuerent hos thesauros tumultuum & seditionum nervos fore, & uiderent inde commodissime præsidia in illis regionibus ali posse, hanc pecuniam templo ademptam ad se transtulerunt. Hinc illæ quæstiones de didrachmo ortæ sunt, quarum mentio fit in historia Euangelica, fuitq; plena eruditio nis disputatio, non de priuatis iacturis seu de priuatis iniurijs, sed de templi defensione, An necesse esset hanc à templo iniuriam armis depellere, & an hac de causa piè & foeliciter arma sumpturi essent, cum quidem Deus promississet, se hoc secundum templum defensuram esse, ut in eo Messie uox publice sonaret.

Hæ spes multos inquietos homines ad bellum incitabant. Harum disputationum fontes certe sine cogitatione appellationum ueterum cerni non
poteo

poterunt. Et monstratis fontibus, doctrinam de multis magnis rebus cogitatione dignissimis proponi animaduerti potest.

Alia multa exempla recitari possent, in quibus ponderum & mensurarum cognitio magnam lucem narrationibus addit. In secundo libro Esdræ seu libro Nehemiæ capite quinto. Nehemias de usuris loquens, iubet reddi centesimas. Hunc locum quis intelligit ignarus, quæ fuerint usuræ centesimæ, & cur ita nominentur? Iam & erudito gratum est uidere, unde leges Atticæ & Romanæ, quæ cum moderari usuras conarentur, sanxerunt, ne maiores centesimæ soluerentur, orate sint. Ibi enim adparet & Babylonicis legibus eandem moderationem sancitam fuisse, quas credibile est Græcis antiquiores esse.

Sed non addam plura exempla, Nam bona ingenia hac antiquitatis cognitione ualde delectari existimo. Addidimus & uolucrum appellationes, magna ex parte collectas à uiro doctissimo Anglo, amico nostro, qui utinam, cum & mari & fecundioribus fluminibus propior sit, etiam piscium nomina colligat. Nos pauca addidimus, ut studiosos ad hanc inquisitionem inuitaremus.

Nea

Nec ualde predicare hanc nostram piscinam
ut ita dicam, possumus, Nam de multis uocabulis
dubitamus, an Græca & Latina recte accommo-
data sint ad germanica. Sed lectores omnes ora-
mus, ut uoluntatem candidè probent, quia sciunt
eruditi, magnam fuisse multis seculis negligentia
am in rerum adpellationibus rectè enarrandis.
cum tamen ad naturæ agnitionem uere interpre-
tationes necessarie sint. Quare multi docti uiri
in multis materijs elaborarunt. Multi planta-
rum, stirpium, herbarum & fruticum appella-
tiones singulari solertia inuestigatas sceleriter
illustrarunt, ut Ruellius, Leonardus Fuchsius,
Cordus & alij.

Georgius Agricola metallorum nomina &
naturas monstrat. Deniq; alij alias partes dele-
gerunt, simul ut linguas restituerent, & natu-
ram rerum patefacere. Nam inscitia lingua-
rum magna caligine & rerum naturam inuola-
uit. Valerius Cordus in Italia piscium nomina &
naturas studiose inquisiuit, cuius immatura mors
cum propter alias multas causas, tum propter
hanc etiam deploranda est, quòd ingenio & sa-
gacitate eius multe partes naturæ melius illu-
strate fuissent, si uitam ei longiorem Deus tri-
buisset.

Sperda

Speramus autem alibi alios esse, qui etiam
hanc naturæ partem inquirunt, et ut studia alio-
rum iuuent, & quia ipsa naturæ consideratio
per sese bonis mentibus iucunda est, & non con-
temnenda commensuratio est de Deo opifice, qui
miranda arte totam hanc mundi machinam con-
didit, & partes ordine distribuit & collocavit,
& formas, vires, usus omnium rerum nascentium
sapientissimo consilio distinxit. Et quidem aman-
da est naturæ consideratio, cum ut rebus condi-
tis ad nostrum usum recte fruamur, tum uero ut
conditorem agnoscamus, & gratis pectoribus
celebremus & hanc eius agnitionem, quæ adhuc
obscura est nobis insitam esse cogitemus, ut sta-
tuamus nos ad ipsius æternum conspe-
ctum conditos esse, & ad hunc nos
omni studio præpare-
mus.

FINIS.



